

LISTA LJEKOVA

Osnovna lista

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
A	LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM									
A01	STOMATOLOŠKI LJEKOVI, LJEKOVI ZA LJEČENJE BOLESTI USNE ŠUPLJINE									
A01AB09	mikonazol	oralni gel	Belupo	Rojazol	2% (40g)	1x40g		R; SZ		1.53 €
A01AB12	heksedin	rastvor za usnu sluzokožu			1mg/ml (200ml)		IA01	SZ		
A02	LJEKOVI ZA LJEČENJE POREMEĆAJA ACIDITETA, ULKUSNE BOLESTI I SA DJELOVANJEM NA PERISTALTIKU									
A02BA02	ranitidin	tableta	Hemofarm	Ranitidin	150mg	20x150mg	IA01/1	R; SZ		0.65 €
A02BA02	ranitidin	rastvor za injekcije	Alkaloid	Ulcodin	50mg/2ml	5x2ml	IA01/1	Z; SZ		0.92 €
A02BA03	famotidin	tableta	Hemofarm	Famotidin	20mg	30x20mg	IA01/1	R; SZ		0.56 €
A02BA03	famotidin	film tableta	Alkaloid	Famotidin Alkaloid	20mg	20x20mg	IA01/1	R; SZ		0.37 €
A02BA03	famotidin	tableta	Hemofarm	Famotidin	40mg	30x40mg	IA01/1	R; SZ		1.34 €
A02BC01	omeprazol	gastrorezistentna kapsula	Lek	Ortanol	20mg	14x20mg	IA02	RS; SZ	0.070 €	1.30 €
A02BC01	omeprazol	gastrorezistentna kapsula	Alkaloid	Omezol	20mg	14x20mg	IA02	RS; SZ		1.30 €
A02BC01	omeprazol	gastrorezistentna kapsula	Zdravlje AD Leskovac	Omepral	20mg	15x20mg	IA02	RS; SZ	0.100 €	1.47 €
A02BC02	pantoprazol	prašak za rastvor za injekciju	Lek	Pantoprazol	40mg	1x40mg	IA03	SZ	1.000 €	1.00 €
A02BC02	pantoprazol	prašak za rastvor za injekciju	Takeda GmbH	Controloc I.V.	40mg	1x40mg	IA03	SZ		4.27 €*
A02BC02	pantoprazol	gastrorezistentna tableta	Takeda GmbH	Controloc	20mg	14x20mg	IA02	RZ; SZ		1.80 €*
A02BC02	pantoprazol	gastrorezistentna tableta	Pliva	Zipantola	20mg	28x20mg	IA02	RZ; SZ	0.095 €	1.34 €
A02BC02	pantoprazol	gastrorezistentna tableta	Nobel Ilac	Pulcet	40mg	14x40mg	IA02	RZ; SZ	0.046 €	0.65 €
A02BC02	pantoprazol	gastrorezistentna tableta	Pliva	Zipantola	40mg	28x40mg	IA02	RZ; SZ	0.046 €	1.30 €
A02BC05	esomeprazol	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	Astra Zeneca	Nexium	40mg	10x40mg	IA03/1	SZ		44.90 €*
A03	LJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE									
A03B	ALKALOIDI BELADONE I DERIVATI, MONOKOMPONENTNI									
A03BA01	atropin	rastvor za injekciju, ampula			1mg/1ml			Z; SZ		
A03BB01	hioscin butilbromid (skopolamin)	rastvor za injekciju	Sanofi Aventis	Buscopan	20mg/ml	6x(20mg/ml)		Z; SZ	0.810 €	1.62 €
A03F	PROPULZIVI									
A03FA01	metoklopramid	oralni rastvor			5mg/5ml (100ml)			R; SZ		
A03FA01	metoklopramid	tableta	Galenika	Klometol	10mg	30x10mg		R; SZ	0.060 €	0.60 €
A03FA01	metoklopramid	rastvor za injekciju			10mg/2ml			Z; SZ		
A04	ANTIEMETICI I LJEKOVI ZA SUZBIJANJE NAUZEJE									
A04AA02	granisetron	film tableta			1mg		IA04/2	RS; SZ		
A04AA02	granisetron	film tableta	Salutas Pharma	Granisetron Sandoz	2mg	5x2mg	IA04/2	RS; SZ	2.100 €	10.50 €
A04AA02	granisetron	koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Kytril	1mg/ml	5x(1mg/ml)	IA04/1	SZ	6.000 €	7.50 €
A04AA02	granisetron	koncentrat za rastvor za infuziju			3mg/3ml		IA04/1	SZ		
A04AA05	palonosetron hidrid	rastvor za injekciju	Pharma Swiss	Aloxi	250mcg/5ml	1x(250mcg/5ml)	IA05	SZ	45.540 €	45.54 €
A05	LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA BOLESTI ŽUČNIH PUTEVA I JETRE									
A05AA02	urzodeoksiholna kiselina	kapsula	Dr Falk Pharma GmbH	Ursofalk	250mg	50x250mg	IA06	RS; SZ	0.650 €	10.87 €
A05BA...	L-ornitin, L-aspartat	granule			3g		IA07	RS; SZ		
A05BA...	L-ornitin, L-aspartat	koncentrat za rastvor za infuziju			5g/10ml		IA07	SZ		
A06	LAKSATIVI									
A06AB02	bisakodil	gastrorezistentna obložena tableta; dražeja			5mg			SZ		
A06AB02	bisakodil	supozitorija			10mg			SZ		
A06AD11	laktuloza	sirup	Chephasaar Chemische	Lactulose-MIP	65g/100ml (200ml)	1x200ml	IA07/1	RS; SZ	0.343 €	1.40 €
A06AD11	laktuloza	sirup	Chephasaar Chemische	Lactulose-MIP	65g/100ml (500ml)	1x500ml	IA07/1	RS; SZ	0.140 €	3.43 €
A07	ANTIIDIJAROICI I LJEKOVI SA ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM									
A07AA02	nistatin	prašak za oralnu suspenziju	Hemofarm	Nystatin	100.000 U/ml (24ml)	1x24ml		R; SZ	0.600 €	0.96 €
A07DA03	loperamid	tableta	Zdravlje AD Leskovac	Loperamid	2mg	20x2mg		R; SZ	0.470 €	1.87 €
A07EA06	budesonid	gastrorezistentna kapsula, tvrda			3mg		IA08	RS; SZ		
A07EA06	budesonid	gastrorezistentna tableta			10mg		IA08	RS; SZ		
A07EC01	sulfasalazin	gastrorezistentna tableta	Pfizer	Salazopyrin	500mg	100x500mg	IA09	RS; SZ	0.030 €	8.39 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
A07EC02	mesalazin	gastrorezistentna tableta			400mg		IA09	RS; SZ		
A07EC02	mesalazin	gastrorezistentna tableta	Dr Falk Pharma GmbH	Salofalk	500mg	50x500mg	IA09	RS; SZ	0.750 €	12.50 €
A07EC02	mesalazin	supozitorija			500mg		IA09	RS; SZ		
A07EC02	mesalazin	rektalna suspenzija	Dr Falk Pharma GmbH	Salofalk	4.000mg/60ml	7x(4.000mg/60ml)	IA09	RS; SZ	1.500 €	28.00 €
A07EC02	mesalazin	granule sa produženim oslobađanjem			1000mg		IA09	RS; SZ		
A07EC02	mesalazin	tableta sa produženim oslobađanjem	Ferring International Center SA	Pentasa	500mg	100x500mg	IA09	RS; SZ	0.873 €	26.61 €
A07FA01	bacilus subtilis IP 5832	kapsula	Galenika	Flonivin BS	35mg	16x35mg		R; SZ	0.750 €	2.00 €
A09	LJEKOWI ZA OLAŠAVANJE PROBAVE (ENZIMI)									
A09AA02	enzimi pankreasa (visoko dozirani)	gastrorezistentna kapsula, tvrda	Abbott	Kreon 10.000	10.000 U lipaze + 8.000 U amilaze + 600 U proteaze (150mg)	100x150mg	IA11	RS; SZ		9.69 €
A09AA02	enzimi pankreasa (visoko dozirani)	gastrorezistentna kapsula, tvrda	Abbott	Kreon 25.000	25.000 U lipaze + 18.000 U amilaze + 1.000 U proteaze (300mg)	100x300mg	IA11	RS; SZ		20.47 €
A10	LJEKOWI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU U DIJABETESU (ANTIDIJABETICI)									
A10AB	INSULINI I ANALOZI BRZOG DEJSTVA									
A10AB01	humani insulini	rastvor za injekciju u ulošku	Novo Nordisk	Actrapid Penfill	100 U/ml (3ml)	5x3ml		RS; Z; SZ	0.570 €	21.44 €
A10AB01	humani insulini	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Sanofi Aventis	Insuman Rapid Solostar	100 U/ml (3ml)	5x3ml		RS; Z; SZ	0.330 €	18.69 €
A10AB05	insulin aspart	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Novo Nordisk	Novorapid Flexpen	100 U/ml (3ml)	5x3ml	IA12	RS; Z; SZ	0.830 €	32.90 €
A10AB06	insulin glulizin	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Sanofi Aventis	Apidra Solostar	100 U/ml (3ml)	5x3ml	IA12	RS; Z; SZ	0.730 €	27.22 €
A10AC	INSULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DEJSTVA									
A10AC01	humani izofan insulin	suspencija za injekciju u penu sa uloškom	Novo Nordisk	Insulatard Penfill	100 U/ml (3ml)	5x3ml		RS; SZ		22.14 €
A10AC01	humani izofan insulin	suspencija za injekciju u penu sa uloškom	Sanofi Aventis	Insuman Basal Solostar	100 U/ml (3ml)	5x3ml		RS; SZ	0.320 €	23.81 €
A10AD	INSULINI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DEJSTVA U KOMBINACIJI SA INSULINIMA BRZOG DEJSTVA									
A10AD01	humani insulini brzog dejstva sa izofan insulinom (25%+75%)	suspencija za injekciju u penu sa uloškom	Sanofi Aventis	Insuman Comb 25 Solostar	100 U/ml (3ml)	5x3ml		RS; SZ	0.330 €	20.10 €
A10AD05	insulin aspart sa protamin insulinom (30%+70%)	suspencija za injekciju u penu sa uloškom	Novo Nordisk	Novomix 30 Flexpen	100 U/ml (3ml)	5x3ml	IA13	RS; SZ	0.830 €	31.08 €
A10AE	INSULINI I ANALOZI DUGOG DEJSTVA									
A10AE04	insulin glargine	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Sanofi Aventis	Lantus Solostar	100 U/ml (3ml)	5x3ml	IA14	RS; SZ	1.040 €	44.38 €
A10AE04	insulin glargine	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Sanofi Aventis	Toujeo	300 U/ml (1.5ml)	3x1.5ml	IA14/1	RS; SZ	1.040 €	42.19 €
A10AE05	insulin detemir	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Novo Nordisk	Levemir Flexpen	100 U/ml (3ml)	5x3ml	IA14	RS; SZ	1.290 €	48.41 €
A10AE06	insulin degludek	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Novo Nordisk	Tresiba	100 U/ml (3ml)	5x3ml	IA14/1	RS; SZ		87.69 €
A10B	ORALNI ANTIDIJABETICI									
A10BA02	metformin	film tableta	Berlin-Chemie AG	Siofor 500	500mg	30x500mg		R; SZ	0.093 €	0.70 €
A10BA02	metformin	film tableta	Berlin-Chemie AG	Siofor 850	850mg	30x850mg		R; SZ	0.061 €	0.78 €
A10BA02	metformin	film tableta	Berlin-Chemie AG	Siofor 1000	1.000mg	30x1.000mg		R; SZ	0.072 €	1.08 €
A10BA02	metformin	film tableta	Merck	Glucophage	1.000mg	30x1.000mg		R; SZ	0.100 €	1.08 €
A10BB09	gliklazid	tableta sa modifikovanim oslobađanjem	Les Laboratoires Servier Industrie	Diaprel MR	60mg	30x60mg		R; SZ	0.159 €	4.76 €
A10BB09	gliklazid	tableta	Galenika	Glioral	80mg	30x80mg		R; SZ	0.034 €	1.36 €
A10BB12	glimpirid	tablete	Sanofi Aventis	Amaryl	2mg	30x2mg		R; SZ	0.023 €	0.68 €
A10BB12	glimpirid	tablete	Sanofi Aventis	Amaryl	3mg	30x3mg		R; SZ		1.14 €
A10BD07	metformin, sitagliptin	film tableta	Merck Sharp & Dohme BV	Janumet	1000mg+50mg	56x(1000mg+50mg)	IA17	RS; SZ		33.66 €
A10BD07	metformin, sitagliptin	film tableta	Merck Sharp & Dohme BV	Janumet	850mg+50mg	56x(850mg+50mg)	IA17	RS; SZ		36.73 €
A10BH01	sitagliptin	film tableta	Merck Sharp & Dohme BV	Januvia	100mg	28x100mg	IA17	RS; SZ	1.070 €	31.83 €
A10BH02	vildagliptin	tableta	Novartis Pharma	Galvus	50mg	28x50mg	IA17	RS		15.89 €
A10BH03	saksagliptin	film tableta	Bristol Myers	Onglyza	5mg	28x5mg	IA17/1	RS	1.070 €	29.99 €
A10BH04	alogliptin	film tableta	Takeda GmbH	Vipidia	25mg	28x25mg	IA17/1	RS; SZ	0.960 €	26.85 €
A10BX07	liraglutid	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Novo Nordisk	Victoza	6mg/ml	2x3ml	IA18/1	RS; SZ	3.030 €	90.81 €
A10BX09	dapagliflozin	film tableta	Bristol Myers	Forxiga	10mg	30x10mg	IA18	RS		36.60 €
A10BX10	liksisenatid	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Sanofi Aventis	Lyxumia	10mcg/0.2ml	1x3ml	IA18/1	RS; SZ	4.640 €	34.77 €
A10BX10	liksisenatid	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Sanofi Aventis	Lyxumia	20mcg/0.2ml	2x3ml	IA18/1	RS; SZ	2.320 €	69.55 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
A11	VITAMINI									
A11C	VITAMINI A I D, UKLJUČUJUĆI NJIHOVE KOMBINACIJE									
A11CB...	retinol + ergokalciferol	oralne kapi, rastvor	Hemofarm	Vitamin AD	238.733,2 U + 5.000 U (10ml)	1x10ml		R; SZ		0.90 €
A11CC03	alfakalcidol	kapsula meka	Teva	Alpha D3	0,25mcg	50x0,25mcg	IA19	RS; SZ	0.422 €	5.27 €
A11CC03	alfakalcidol	kapsula meka	Teva	Alpha D3	0,5mcg	30x0,5mcg	IA19	RS; SZ	0.290 €	4.48 €
A11CC03	alfakalcidol	kapsula meka	Teva	Alpha D4	1mcg	30x1mcg	IA19	RS; SZ	0.272 €	8.16 €
A11CC04	kalcitriol	kapsula meka			0,25mcg		IA20	RS; SZ		
A11CC04	kalcitriol	kapsula, meka			0,5mcg		IA20	RS; SZ		
A11CC05	holekalciferol	rastvor, oralne kapi			4.000 U/ml (10ml)			RS; SZ		
A11CC05	holekalciferol	rastvor, oralne kapi			20.000 U/ml (10ml)			RS; SZ		
A11D	VITAMIN B1 MONOKOMPONENTNI I U KOMBINACJI SA VITAMINIMA B6 I VITAMINOM B12									
A11DA01	tiamin	rastvor za injekciju			100mg/ml			Z; SZ		
A11H	OSTALI MONOKOMPONENTNI VITAMINSKI PREPARATI									
A11HA02	piridoksin	rastvor za injekciju	Alkaloid	Vitamin B6 Alkaloid	50mg/2ml	50x(50mg/2ml)		Z; SZ		5.41 €
A12	MINERALI									
A12AA02	kalcijum glubionat (glukonat)	ampula			10% (10ml)			Z; SZ		
A12AA04	kalcijum karbonat	tableta			1g			R; SZ		
A12BA01	kalijum hlorid	tableta			1g		IA22	R; SZ		
A12BA01	kalijum hlorid	prašak			1g		IA22	R; SZ		
A12CC02	magnezijum sulfat	ampula			10% (10ml)			SZ		
A12CC02	magnezijum sulfat	ampula			20% (10ml)			SZ		
A12CC02	magnezijum sulfat	ampula			50% (10ml)			SZ		
B	LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KRVI I KRVOTVORNIH ORGANA									
B01	ANTITROMBOTIČKA SREDSTVA (ANTIKOAGULANSI)									
B01AA03	varfarin	tableta			5mg			RS; SZ		
B01AA07	acenokumarol	tableta			4mg			RS; SZ		
B01AB	HEPARINI									
B01AB01	heparin	rastvor za injekciju			5.000 U/ml			Z; SZ		
B01AB01	heparin	rastvor za injekciju	Galenika	Heparin	25.000 U/5ml	10x(25.000 U/5ml)		Z; SZ	0.834 €	20.99 €
B01AB02	antitrombin III	prašak za injekciju			500 U		IB01/1	SZ		
B01AB04	dalteparin	špric			2.500 U		IB01	Z; SZ		
B01AB04	dalteparin	špric			5.000 U		IB01	Z; SZ		
B01AB04	dalteparin	špric			10.000 U		IB01	Z; SZ		
B01AB05	enoksaparin	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Sanofi Aventis	Clexane	2.000 U/0,2ml	10x(2.000 U/0,2ml)	IB01	Z; SZ		17.72 €*
B01AB05	enoksaparin	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Sanofi Aventis	Clexane	4.000 U/0,4ml	10x(4.000 U/0,4ml)	IB01	Z; SZ		32.22 €*
B01AB05	enoksaparin	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Sanofi Aventis	Clexane	6.000 U/0,6ml	10x(6.000 U/0,6ml)	IB01	Z; SZ		44.35 €*
B01AB05	enoksaparin	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Sanofi Aventis	Clexane	8.000 U/0,8ml	10x(8.000 U/0,8ml)	IB01	Z; SZ		51.81 €*
B01AB06	nadroparin	rastvor za injekciju	Glaxo Smith Kline	Fraxiparine	2.850 U	10x2.850 U	IB01	Z; SZ		16.00 €
B01AB06	nadroparin	rastvor za injekciju	Glaxo Smith Kline	Fraxiparine	3.800 U	10x3.800 U	IB01	Z; SZ		16.52 €
B01AB06	nadroparin	rastvor za injekciju	Glaxo Smith Kline	Fraxiparine	5.700 U	10x5.700 U	IB01	Z; SZ		28.19 €
B01AC	INHIBITORI AGREGACIJE TROMBOCITA (IZUZEV HEPARINA)									
B01AC04	klopidogrel	film tableta	Hemofarm	Clopidix	75mg	28x75mg	IB02	RZ; SZ		2.59 €
B01AC04	klopidogrel	film tableta	Krka	Zylt	75mg	28x75mg	IB02	RZ; SZ	0.093 €	2.59 €
B01AC05	tiklopidin	film tableta	Hemofarm	Ticlofix	250mg	30x250mg	IB03	RZ; SZ		3.06 €
B01AC06	acetilsalicilna kiselina	tableta		Pliva	100mg	20x100mg		SZ	0.035 €	0.70 €
B01AC24	tikagrelor	film tableta	Astra Zeneca	Brilique	90mg	56x90mg	IB04	RZ; SZ		55.51 €*
B01AD	ENZIMI									
B01AD02	alteplaza	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	Boehringer Ingelheim	Actilyse	50mg	1x50mg	IB05	SZ		405.61 €
B01AD11	tenekteplaza	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Boehringer Ingelheim	Metalyse	50mg (10.000 U)/10ml (10ml)	1x10ml	IB06	SZ		968.91 €
B01AE07	dabigatraneteksilat	kapsula tvrda	Boehringer Ingelheim	Pradaxa	75mg	30x75mg	IB07	RS; SZ		29.67 €*
B01AE07	dabigatraneteksilat	kapsula tvrda	Boehringer Ingelheim	Pradaxa	110mg	60x110mg	IB07/2	RS; SZ		61.68 €*
B01AE07	dabigatraneteksilat	kapsula tvrda	Boehringer Ingelheim	Pradaxa	150mg	60x150mg	IB07/1	RS; SZ		62.62 €*
B01AF01	rivaroksaban	film tableta			10mg		IB07	RS; SZ		
B01AF01	rivaroksaban	film tableta	Bayer Pharma AG	Xarelto	15mg	28x15mg	IB07/1	RS; SZ	2.100 €	55.19 €*

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
B01AF01	rivaroksaban	film tableta	Bayer Pharma AG	Xarelto	20mg	28x20mg	IB07/1	RS; SZ	1.570 €	56.35 €*
B01AF02	apiksaban	film tableta	Bristol Myers	Eliquis	2,5mg	10x2,5mg	IB07/2	RS; SZ	3.750 €	9.38 €*
B01AF02	apiksaban	film tableta	Bristol Myers	Eliquis	5mg	60x5mg	IB07/1	RS; SZ	1.600 €	56.69 €*
B01AX05	fondaparinuks	rastvor za injekciju	Glaxo Smith Kiine	Arixtra	2,5mg/0,5ml	10x(2,5mg/0,5ml)	IB09	SZ		39.44 €
B02	ANTIHEMORAGICI (LJEKOVI KOJI POSPJEŠUJU MEHANIZAM ZGRUŠAVANJA KRVI)									
B02AA02	traneksaminska kiselina	rastvor za injekciju			500mg/5ml		IB10	SZ		
B02BA01	fitomenadion	rastvor za injekciju			2mg/0,2ml			SZ		
B02BA01	fitomenadion	rastvor za injekciju/infuziju			10mg/ml			SZ		
B02BC30	fibrinogen, koagulacioni faktor XIII, humani, aprotinin, trombin, kalcijum hlorid	prašak i rastvarač za fibrinsko ljepilo za tkivo			3ml			SZ		
B02BC30	humani fibrinogen, humani trombin	ljekoviti sunder			3cmx2,5cm (5,5mg/cm ² +2,0 i.j./cm ²)			SZ		
B02BC30	humani fibrinogen, humani trombin	ljekoviti sunder			4,8cm x 4,8cm (5,5mg/cm ² +2,0 i.j./cm ²)			SZ		
B02BC30	humani fibrinogen, humani trombin	ljekoviti sunder	Takeda GmbH	TachoSil	9,5cmx4,8cm (5,5mg/cm ² +2,0 i.j./cm ²)	1x(9,5cmx4,8cm)		SZ		268.50 €
B02BD01	koagulacioni faktori II,VII,IX,X	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju			500 U			SZ		
B02BD02	koagulacioni faktor VIII	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Octapharma	Octanate 250	250 U/5ml	1x(250 U/5ml)		RK; SZK		48.38 €
B02BD02	koagulacioni faktor VIII	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Octapharma	Octanate 500	500 U/10ml	1x(500 U/10ml)		RK; SZK		96.75 €
B02BD02	koagulacioni faktor VIII	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Kedrion	Emoclot	500 U/10ml	1x(500 U/10ml)		RK; SZK		96.75 €
B02BD02	koagulacioni faktor VIII	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Octapharma	Octanate 1000	1000 U/10ml	1x(1000 U/10ml)		RK; SZK		193.50 €
B02BD04	koagulacioni faktor IX	prašak i rastvarač za rastvor za infuziju	Kedrion	Aimafix	500 U/10ml	1x(500 U/10ml)		RK; SZK		147.50 €
B02BD04	koagulacioni faktor IX	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Octapharma	Octanine F	500 U/5ml	1x(500 U/5ml)		RK; SZK		147.50 €
B02BD07	koagulacioni faktor XIII	lio bočica			250 U			SZ		
B03	ANTIANEMICI									
B03AA02	gvožđe II - fumarat	kapsula, tvrda	Alkaloid	Heferol	350mg	30x350mg		R; SZ		1.80 €
B03AB05	gvožđe III hidroksid polimaltoza	sirop			50mg/5ml (100ml)			R; SZ		
B03AB05	gvožđe III hidroksid polimaltoza	tableta za žvakanje	Lek	Ferrum Sandoz	100mg	30x100mg		R; SZ	0.200 €	3.12 €
B03AB09	gvožđe III protein sukcinilat	oralni rastvor	Alkaloid	Legofer	800mg(40mg Fe ³⁺)/15ml (150ml)	1x150ml	IB12	R; SZ		2.39 €
B03AC..	gvožđe (III) hidroksid,saharozna kompleks	rastvor za injekciju/infuziju	Rafarm S.A.	Ferrovin	100mg/5ml	5x(100mg/5ml)	IB13	Z; SZ	4.614 €	23.07 €
B03BA03	hidroksikobalamin	rastvor za injekciju	Galenika	OHB12	2,5mg/2ml	5x(2,5mg/2ml)	IB14	Z; SZ	0.004 €	2.20 €
B03BB01	folna kiselina	tableta	Jadran galenski laboratorij	Folacin	5mg	30x5mg		R; SZ	0.133 €	1.99 €
B03XA01	epoetin alfa - biološki lijek	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Cilag AG	Eprex	2.000 U/0,5 ml	6x(2.000 U/0,5 ml)	IB15	Z; SZ	5.310 €	63.76 €*
B03XA01	epoetin alfa - biološki lijek	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Cilag AG	Eprex	10.000 U/ml	6x(10.000 U/ml)	IB15/1	Z; SZ	5.110 €	306.88 €*
B03XA01	epoetin alfa - biološki sličan lijek	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Sandoz	Binocrit	2.000 U/ml	6x(2.000 U/1 ml)	IB15	Z; SZ	3.560 €	42.79 €
B03XA01	epoetin alfa - biološki sličan lijek	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Sandoz	Binocrit	10.000 U/ml	6x(10.000 U/1ml)	IB15/1	Z; SZ	4.000 €	240.00 €
B03XA01	epoetin beta - biološki lijek	ampula; rastvor za injekciju; rastvor za inj u napunjenom injek.špricu	Roche	Neorecormon	2.000 U/0,3ml	6x0,3ml	IB15	Z; SZ	10.620 €	61.12 €
B03XA01	epoetin beta - biološki lijek	ampula; rastvor za injekciju; rastvor za inj u napunjenom injek.špricu	Roche	Neorecormon	10.000 U/0,6ml	6x0,6ml	IB15/1	Z; SZ	54.310 €	321.43 €
B03XA02	darbepoetin alfa	rastvor za injekciju	Pharma Swiss	Aranesp (darbepoetin alfa)	10mcg/0,4ml	1x(10mcg/0,4ml)	IB15	Z; SZ	5.090 €	11.32 €
B03XA02	darbepoetin alfa	rastvor za injekciju	Pharma Swiss	Aranesp (darbepoetin alfa)	20mcg/0,5ml	1x(20mcg/0,5ml)	IB15	Z; SZ	5.100 €	22.67 €
B03XA02	darbepoetin alfa	rastvor za injekciju	Pharma Swiss	Aranesp (darbepoetin alfa)	30mcg/0,3ml	1x(30mcg/0,3ml)	IB15	Z; SZ	5.090 €	33.96 €
B03XA02	darbepoetin alfa	rastvor za injekciju			40 mcg/0,4ml		IB15	Z; SZ		
B03XA02	darbepoetin alfa	rastvor za injekciju	Pharma Swiss	Aranesp (darbepoetin alfa)	50mcg/0,5ml	1x(50mcg/0,5ml)	IB15	Z; SZ	5.090 €	56.60 €
B03XA03	metoksi polietilenglikol-epoetin beta	rastvor za injekciju	Roche	Mircera	50mcg/0,3ml	1x(50mcg/0,3ml)	IB15	Z; SZ	5.870 €	73.40 €
B03XA03	metoksi polietilenglikol-epoetin beta	rastvor za injekciju	Roche	Mircera	75mcg/0,3ml	1x(75mcg/0,3ml)	IB15	Z; SZ	5.860 €	109.94 €
B03XA03	metoksi polietilenglikol-epoetin beta	rastvor za injekciju	Roche	Mircera	100mcg/0,3ml	1x(100mcg/0,3ml)	IB15	Z; SZ	5.860 €	146.48 €
B03XA03	metoksi polietilenglikol-epoetin beta	rastvor za injekciju	Roche	Mircera	120mcg/0,3ml	1x(120mcg/0,3ml)	IB15	Z; SZ	5.860 €	175.70 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
B03XA03	metoksi polietilenglikol-epoetin beta	rastvor za injekciju	Roche	Mircera	200mcg/0,3ml	1x(200mcg/0,3ml)	IB15	Z; SZ	5.850 €	292.63 €
B05 SREDSTVA ZA ZAMJENU KRVI I PERFUZIONI RASTVORI										
B05AA01	humani albumin	rastvor za infuziju	Octapharma	Albunorm 5%	5% (250ml)	1x250ml	IB16	SZ		27.00 €
B05AA01	humani albumin	rastvor za infuziju	Octapharma	Albunorm 20%	20% (50ml)	1x50ml	IB16/1	SZ		21.49 €
B05AA07	hidroksietilskrob, natrijum hlorid	rastvor za infuziju	Hemofarm	Hetasorb 6%	6% + 0,9% (500ml)	1x500ml	IB17	SZ		4.65 €
B05AA07	hidroksietilskrob, natrijum hlorid	rastvor za infuziju			100 g/l + 9 g/l (500ml)		IB17/1	SZ		
B05BA01	alanin, arginin, cistein, fenilalanin, glicin, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, prolin, serin, glacialna siročetna kiselina, treonin, triptofan, valin	rastvor za infuziju	Hemomont	Hepasol 8%	4.64 g/l + 10.72 g/l + 0.52 g/l + 0.88 g/l + 5.82 g/l + 2.8 g/l + 10.4 g/l + 13.09 g/l + 6.88 g/l + 1.1 g/l + 5.73 g/l + 2.24 g/l + 4.4 g/l + 0.7 g/l + 10.08 g/l	1x500ml		SZ		4.00 €
B05BA02	ulje soje, fosfolipidi jajeta, glicerol	infuzija			20% + 1,2% + 2,25% (100ml)			SZ		
B05BA02	ulje soje, fosfolipidi jajeta, glicerol	infuzija			20% + 1,2% + 2,25% (250ml)			SZ		
B05BA02	ulje soje, fosfolipidi jajeta, glicerol	infuzija			20% + 1,2% + 2,25% (500ml)			SZ		
B05BA03	glukoza	rastvor za infuziju	Hemomont	Glucosi Infundibile	5% (250ml)	1x250ml		Z; SZ		0.71 €
B05BA03	glukoza	rastvor za infuziju	Hemomont	Glucosi Infundibile	5% (500ml)	1x500ml		Z; SZ		0.78 €
B05BA03	glukoza	rastvor za infuziju			10% (500ml)			Z; SZ		
B05BA10	aminokiseline (i kombinacija sa vitaminima i mineralima i dr.)	rastvor za infuziju	Hemomont	Aminosol 10% E	10% (500ml)	1x500ml		SZ		4.18 €
B05BA10	aminokiseline (i kombinacija sa vitaminima i mineralima i dr.)	rastvor za infuziju	Hemomont	Aminosol 15% E	15% (500ml)	1x500ml		SZ		4.18 €
B05BB01	natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid	rastvor za infuziju	Hemomont	Natrii Chloridi Infundibile Compositum	8.6 g/l + 0.3 g/l + 0.33 g/l (500ml)	1x500ml		Z; SZ		0.88 €
B05BB01	natrijum hlorid + kalijum hlorid + kalcijum hlorid + natrijum laktat	rastvor za infuziju	Hemofarm	Hartmanov rastvor	3,010g + 0,1865g + 0,147g + 3,138g (500ml)	1x500ml		Z; SZ		0.47 €
B05BB01	kalcijum hlorid + kalijum hlorid + magnezijum hlorid + natrijum hlorid + natrijum laktat	rastvor za infuziju	Hemomont	Jonolactat	0.134 g/l + 0.4 g/l + 0.203 g/l + 6 g/l + 3.05 g/l (500ml)	1x500ml		Z; SZ		1.04 €
B05BB02	natrijum hlorid + glukoza	rastvor za infuziju	Hemomont	Natrii Chloridi Infundibile cum Glucoso 5%	50 g/l + 9 g/l (500ml)	1x500ml		Z; SZ		0.84 €
B05BC01	manitol	rastvor za infuziju	Hemomont	Manitol	10% (500ml)	1x500ml		Z; SZ		1.32 €
B05BC01	manitol	rastvor za infuziju	Hemomont	Manitol	20% (250ml)	1x250ml		Z; SZ		1.32 €
B05CX10	manitol, sorbitol	rastvor za ispiranje bešike	Hemofarm	Ispirol	5,4g/l + 27g/l (5.000ml)	1x5000ml		SZ		9.48 €
B05D RASTVORI ZA PERITONEALNU DIJALIZU										
B05DB HIPERTONIČNI RASTVORI										
B05DB..	natrijum hlorid, natrijum laktat, kalcijum hlorid, magnezijum hlorid, glukoza	rastvor za peritonealnu dijalizu			5.64 g/l + 3.925 g/l + 0.2573 g/l + 0.1017 g/l + 15 g/l (2000ml)			Z; SZ		
B05DB..	natrijum hlorid, natrijum laktat, kalcijum hlorid, magnezijum hlorid, glukoza	rastvor za peritonealnu dijalizu			5.64 g/l + 3.925 g/l + 0.2573 g/l + 0.1017 g/l + 22.73 g/l (2000ml)			Z; SZ		
B05DB..	natrijum hlorid, natrijum laktat, kalcijum hlorid, magnezijum hlorid, glukoza	rastvor za peritonealnu dijalizu			5.64 g/l + 3.925 g/l + 0.2573 g/l + 0.1017 g/l + 42.5 g/l (2000ml)			Z; SZ		

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
B05DB..	natrijum hlorid, natrijum laktat, kalcijum hlorid, magnezijum hlorid, glukoza	rastvor za peritonealnu dijalizu			5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573 g/l + 0.1017 g/l + 15 g/l (5000ml)			Z; SZ		
B05DB..	natrijum hlorid, natrijum laktat, kalcijum hlorid, magnezijum hlorid, glukoza	rastvor za peritonealnu dijalizu			5.786 g/l + 7.847 g/l + 0.2573 g/l + 0.1017 g/l + 22.73 g/l (5000ml)			Z; SZ		
B05X	RASTVORI ZA INTRAVENSKU PRIMJENU, KAO DOPUNSKA TERAPIJSKA SREDSTVA									
B05XA01	kalcijum hlorid	koncentrat za rastvor za infuziju			7.4% (74,5 mg/ml)			Z; SZ		
B05XA02	natrijum hidrogenkarbonat	rastvor za infuziju			8.40%			Z; SZ		
B05XA03	natrijum hlorid	rastvor za infuziju	Hemomont	Natrii Chloridi Infundibile	0,9% (250ml)	1x250ml		Z; SZ		0.76 €
B05XA03	natrijum hlorid	rastvor za infuziju	Hemomont	Natrii Chloridi Infundibile	0,9% (500ml)	1x500ml		Z; SZ		0.92 €
C	LJEKOVİ KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM									
C01	TERAPIJA BOLESTI SRCA									
C01A	KARDIOTONICI									
C01AA05	digoksin	tableta	Bosna Lijek	Lanibos	0,25mg	20x0,25mg		RS; SZ	0.019 €	0.38 €
C01AA05	digoksin	rastvor za inj/inf			0,25mg/2ml			Z; SZ		
C01B	ANTIARITMICI									
C01BB01	lidokain-hlorid 2%	rastvor za injekciju			40mg/2ml			Z; SZ		
C01BC03	propafenon	film tableta	Alkaloid	Propafenon Alkaloid	150mg	50x150mg		RS; SZ		1.98 €
C01BC03	propafenon	film tableta	Hemofarm	Propafen	300mg	50x300mg		RS; SZ		4.62 €
C01BC03	propafenon	ampula; injekcija			35mg/10ml			Z; SZ		
C01BD01	amjodaron	ampula			150mg/3ml			SZ		
C01BD01	amjodaron	tableta	Zdravlje AD Leskovac	Amiodaron	200mg	60x200mg		RS; SZ	0.080 €	4.74 €
C01C	LJEKOVİ KOJI DJELUJU NA STIMULACIJU RADA SRCA									
C01CA01	etilefrin	injekcija			10mg/1ml			SZ		
C01CA02	noradrenalin	ampula			1mg/1ml			SZ		
C01CA02	noradrenalin	ampula			2mg/2ml			SZ		
C01CA04	dopamin	koncentrat za infuziju			50mg/5ml			SZ		
C01CA06	fenilefrin	ampula			10mg/1ml			SZ		
C01CA07	dobutamin	koncentrat za rastvor za infuziju			250mg/20ml			SZ		
C01CA19	fenoldopam	ampula			20mg/2ml			SZ		
C01CA24	adrenalin (epinefrin)	rastvor za injekciju			1mg/1ml			Z; SZ		
C01CE02	milrinon	ampula			10mg/10ml			SZ		
C01D	VAZODILATORI- LJEKOVİ ZA LJEČENJE ANGINE PEKTORIS									
C01DA02	gliceriltrinitrat	sublingvalna tableta			0,5mg			R; Z; SZ		
C01DA02	gliceriltrinitrat	koncentrat za rastvor za infuziju	Hemofarm	Nirmin	5mg/1,6ml	50x(5mg/1,6ml)		SZ		15.48 €
C01DA02	gliceriltrinitrat	sublingvalni sprej			12,2ml/200 doza (1 doza=0,4mg)			RS; SZ		
C01DA14	izosorbid-5-mononitrat	tableta	Hemofarm	Monizol	20mg	30x20mg		R; SZ	0.063 €	0.95 €
C01DA14	izosorbid-5-mononitrat	tableta	Hemofarm	Monizol	40mg	30x40mg		R; SZ		0.94 €
C01DA14	izosorbid-5-mononitrat	tableta sa produženim oslobađanjem	Belupo	Isocard	40mg	50x40mg		R; SZ		2.95 €
C01E	OSTALI LJEKOVİ SA DJELOVANJEM NA SRCE									
C01EA01	alprostadil	ampula			0,5 mg/ml		IC02	SZ		
C01EB10	adenozin	rastvor za injekciju			6mg/2ml			SZ		
C02	ANTIHIPERTENZIVI									
C02AB01	metildopa	film tableta	Hemofarm	Methyldopa	250mg	20x250mg		RS; SZ		1.14 €
C02CA04	doksazosin	tableta	Bosna Lijek	Doxat	2mg	20x2mg		RS; SZ	0.074 €	0.74 €
C02CA04	doksazosin	tableta	Bosna Lijek	Doxat	4mg	20x4mg		RS; SZ	0.048 €	0.95 €
C02CA06	urapidil	rastvor za injekciju/infuziju			25mg/5ml			SZ		
C02CA06	urapidil	rastvor za injekciju/infuziju			50mg/10ml			SZ		
C03	DIURETICI									
C03AA03	hidrohloriazid	tableta			25mg			R; SZ		
C03BA11	indapamid	film tableta	Hemofarm	Indapres	2,5mg	30x2,5mg		R; SZ		0.73 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
C03CA01	furosemid	tableta	Belupo	Furosemid	40mg	20x40mg		R; SZ	0.023 €	0.45 €
C03CA01	furosemid	rastvor za injekciju	Alkaloid	Fursemid Alkaloid	20mg/2ml	50x(20mg/2ml)		Z; SZ		8.00 €
C03CA01	furosemid	rastvor za infuziju			250mg/10ml			Z; SZ		
C03DA01	spironolakton	tableta			25mg			R; SZ		
C03DA01	spironolakton	tableta			100mg			R; SZ		
C03EA12	amilorid, metiklotiazid	tableta	Galenika	Lometazid	10mg+5mg	30x(10mg+5mg)		R; SZ	0.030 €	0.90 €
C07 BLOKATORI BETAADRENERGIČKIH RECEPTORA										
C07AA05	propranolol	film tableta	Remedica Ltd	Propranolol	40mg	50x40mg		R; SZ	0.077 €	0.97 €
C07AA05	propranolol	film tableta	Galenika	Propranolol	40mg	50x40mg		R; SZ	0.076 €	0.95 €
C07AB02	metoprolol	rastvor za injekciju	Hemofarm	Presolol	5mg/5ml	5x(5mg/5ml)		Z; SZ	11.040 €	1.84 €
C07AB02	metoprolol	film tableta	Hemofarm	Presolol	50mg	28x50mg		R; SZ		0.50 €
C07AB02	metoprolol	film tableta	Hemofarm	Presolol	100mg	30x100mg		R; SZ		0.88 €
C07AB03	atenolol	film tableta	Belupo	Ormidol	100mg	28x100mg		R; SZ		1.00 €
C07AB07	bisoprolol	film tableta	Merck	Concor Cor	2.5 mg	30x2,5mg		RS; SZ		2.63 €
C07AB07	bisoprolol	film tableta	Merck	Concor	5mg	30x5mg		RS; SZ		3.39 €
C07AB12	nebivolol	tableta			5mg			RS; SZ		
C07AG02	karvedilol	tableta	Krka	Coryol	6.25mg	28x6,25mg		RS; SZ	0.083 €	0.38 €
C07AG02	karvedilol	tableta	Krka	Coryol	12.5mg	28x12,5mg		RS; SZ	0.165 €	1.54 €
C07AG02	karvedilol	tableta	Krka	Coryol	25mg	28x25mg		RS; SZ	0.051 €	0.95 €
C08 BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA										
C08CA01	amlodipin	tableta	Galenika	Amlotal	5mg	20x5mg		R; SZ	0.030 €	0.60 €
C08CA01	amlodipin	tableta	Galenika	Amlotal	10mg	20x10mg		R; SZ	0.060 €	0.90 €
C08CA05	nifedipin	tableta sa produženim oslobađanjem			20mg			R; Z; SZ		
C08CA06	nimodipin	rastvor za infuziju	Bayer Pharma AG	Nimotop S	10mg/50ml	1x50ml	IC09	SZ		11.57 €*
C08DA01	verapamil	rastvor za injekciju			5mg/2ml			Z; SZ		
C08DA01	verapamil	film tableta	Hemofarm	Verapamil	40mg	30x40mg		R; SZ		0.63 €
C08DA01	verapamil	obložena tableta	Alkaloid	Verapamil Alkaloid	80mg	30x80mg		R; SZ		1.00 €
C08DB01	diltiazem	tableta sa produženim oslobađanjem	Hemofarm	Cortiazem R	90mg	30x90mg		R; SZ		1.28 €
C09 LJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN – ANGIOTENZIN SISTEM										
C09A BLOKATORI KONVERTAZE (ACE- INHIBITORI), MONOKOMPONENTNI										
C09AA01	kaptopril	tableta			12.5mg			R; Z; SZ		
C09AA01	kaptopril	tableta	Hemofarm	Zorkaptil	25mg	40x25mg		R; Z; SZ		0.57 €
C09AA01	kaptopril	tableta	Hemofarm	Zorkaptil	50mg	40x50mg		R; Z; SZ		1.04 €
C09AA02	enalapril	tableta	Hemofarm	Prilenap	10mg	20x10mg		R; SZ		0.52 €
C09AA02	enalapril	tableta			20mg			R; SZ		
C09AA02	enalapril	tableta	Krka	Enap	20mg	20x20mg		R; SZ	0.029 €	1.15 €
C09AA03	lizinopril	tableta	Belupo	Irumed	5mg	30x5mg		R; SZ		0.55 €
C09AA03	lizinopril	tableta	Belupo	Irumed	10mg	30x10mg		R; SZ	0.019 €	0.57 €
C09AA03	lizinopril	tableta	Belupo	Irumed	20mg	30x20mg		R; SZ		0.78 €
C09AA05	ramipril	tableta	Lek	Piramil	2.5mg	28x2,5mg		R; SZ	0.030 €	0.89 €
C09AA05	ramipril	tableta	Lek	Piramil	5mg	28x5mg		R; SZ	0.050 €	1.56 €
C09AA06	kvinapril	film tableta	Hemofarm	Hemokvin	10mg	20x10mg		RS; SZ		1.99 €
C09AA06	kvinapril	film tableta	Hemofarm	Hemokvin	20mg	20x20mg		RS; SZ		2.41 €
C09AA09	fosinopril	tableta	Pharma Swiss	Monopril	10mg	28x10mg		RS; SZ	0.130 €	2.40 €
C09AA09	fosinopril	tableta	Pharma Swiss	Monopril	20mg	28x20mg		RS; SZ	0.080 €	2.90 €
C09B ACE - INHIBITORI, KOMBINACIJE										
C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	tableta	Hemofarm	Prilenap H	10mg + 25mg	20x(10mg+25mg)		R; SZ		0.51 €
C09BA02	enalapril, hidrohlorotiazid	tableta	Hemofarm	Prilenap HL	10mg + 12.5mg	20x(10mg+12,5mg)		R; SZ		1.25 €
C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	tableta	Belupo	Iruzid	20mg + 12.5mg	30x(20mg+12,5mg)		R; SZ		0.80 €
C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	tableta	Bosna Lijek	Lopril H	10mg + 12.5mg	20x(10mg+12,5mg)		R; SZ		0.55 €
C09BA03	lizinopril, hidrohlorotiazid	tableta	Belupo	Iruzid	10mg + 12.5mg	30x(10mg+12,5mg)		R; SZ		0.78 €
C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	tableta	Zdravlje AD Leskovac	Vivace plus L	2.5mg + 12.5mg	28x(2,5mg+12,5mg)		R; SZ	0.030 €	0.97 €
C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	tableta	Zdravlje AD Leskovac	Vivace plus	5mg + 25mg	28x(5mg+25mg)		R; SZ	0.060 €	1.31 €
C09BA05	ramipril, hidrohlorotiazid	tableta	Sanofi Aventis	Tritace Comp	5mg + 25mg	28x(5mg+25mg)		R; SZ		1.31 €
C09BA06	kvinapril, hidrohlorotiazid	film tableta	Hemofarm	Hemokvin Plus	20mg + 12.5mg	20x(20mg+12,5mg)		RS; SZ		2.24 €
C09BA09	fosinopril, hidrohlorotiazid	tableta	Pharma Swiss	Monopril Plus	20mg + 12.5mg	28x(20mg+12,5mg)		RS; SZ	0.130 €	3.56 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
C09C	ANTAGONISTI RECEPTORA ANGIOTENZINA II, MONOKOMPONENTNI									
C09CA01	losartan	film tableta	Krka	Lorista	50mg	28x50mg	IC05	RS; SZ	0.026 €	0.73 €
C09CA01	losartan	film tableta	Alkaloid	Lotar	100mg	30x100mg	IC05	RS; SZ		1.50 €
C09D	ANTAGONISTI RECEPTORA ANGIOTENZINA II, KOMBINACIJE									
C09DA01	losartan, hidrohlorotiazid	film tableta	Krka	Lorista H	50mg + 12.5mg	28x(50mg+12.5mg)	IC05	RS; SZ	0.090 €	2.51 €
C10	SREDSTVA KOJA SMANJUJU LIPIDE U SERUMU (HIPOLIPEMICI)									
C10A	LJEKOVİ KOJI SMANJUJU NIVO HOLESTEROLA I TRIGLICERIDA									
C10AA01	simvastatin	film tableta	Hemofarm	Cholipam	10mg	20x10mg	IC06	RS; SZ		0.51 €
C10AA01	simvastatin	film tableta	Hemofarm	Cholipam	20mg	20x20mg	IC06	RS; SZ		0.62 €
C10AA03	pravastatin	tableta	Pharma Swiss	Pravacor	20mg	30x20mg	IC06	RS; SZ	0.120 €	2.41 €
C10AA03	pravastatin	tableta	Lek	Pralip	20mg	30x20mg	IC06	RS; SZ	0.080 €	2.51 €
C10AA03	pravastatin	tableta	Pharma Swiss	Pravacor	40mg	30x40mg	IC06	RS; SZ	0.080 €	3.38 €
C10AA03	pravastatin	tableta	Lek	Pralip	40mg	30x40mg	IC06	RS; SZ	0.110 €	3.38 €
C10AA05	atorvastatin	film tableta	Nobel Ilac	Lipidra	10mg	30x10mg	IC06	RS; SZ	0.083 €	1.25 €
C10AA05	atorvastatin	film tableta	Hemofarm	Hipolip	10mg	30x10mg	IC06	RS; SZ		1.25 €
C10AA05	atorvastatin	film tableta	Alkaloid	Etora	10mg	30x10mg	IC06	RS; SZ		1.25 €
C10AA05	atorvastatin	film tableta	Alkaloid	Etora	20mg	30x20mg	IC06	RS; SZ		1.80 €
C10AA05	atorvastatin	film tableta	Hemofarm	Hipolip	20mg	30x20mg	IC06	RS; SZ		1.80 €
C10AA05	atorvastatin	film tableta	Nobel Ilac	Lipidra	20mg	30x20mg	IC06	RS; SZ	0.060 €	1.80 €
C10AB	FIBRATI									
C10AB08	ciprofibrat	kapsula, tvrda	Sanofi Aventis	Lipanor	100mg	30x100mg		R; SZ		2.83 €
D	DERMATOLOGICI-LJEKOVİ ZA LJEČENJE BOLESTI KOŽE I POTKOŽNOG TKIVA									
D01	ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU									
D01AA01	nistatin	mast	Hemofarm	Nystatin	100.000 U/g (5g)	1x5g		R; SZ		0.85 €
D01AA01	nistatin	mast	Hemofarm	Nystatin	100.000 U/g (20g)	1x20g		R; SZ		1.90 €
D01AC	DERIVATI IMIDAZOLA I TRIAZOLA									
D01AC01	klotrimazol	krem			1%			R; SZ		
D01AC02	mikonazol	krem	Belupo	Rojazol	2% (30g)	1x30g		R; SZ		0.90 €
D06	ANTIBIOTICI I HEMIOTERAPEUTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU									
D06AX30	bacitracin, neomicin	sprej			150ml			Z; SZ		
D06AX30	bacitracin, neomicin	mast			30g			R; SZ		
D06AX30	bacitracin, neomicin	prašak			5g			R; SZ		
D06AX30	bacitracin, neomicin	prašak			50g			R; SZ		
D06BA01	sulfadiazin srebro	krem			1% (50g)			Z; SZ		
D06BA01	sulfadiazin srebro	krem			1% (50g)			Z; SZ		
D06BB03	aciklovir	krem	Belupo	Herplex	5% (5g)	1x5g		R; SZ		0.75 €
D07	KORTIKOSTEROIDI ZA PRIMJENU U LJEČENJU KOŽNIH BOLESTI									
D07AB10	alklometazon	krem	Belupo	Afloderm	0.5mg/g (20g)	1x20g		R; SZ		2.57 €
D07AC04	fluocinolon acetonid	krem			0.025% (15g)			R; SZ		
D07AC04	fluocinolon acetonid	mast			0.025% (15g)			R; SZ		
D07AC04	fluocinolon acetonid	gel	Galenika	Sinoderm	0.025% (30g)	1x30g		R; SZ		0.84 €
D08	ANTISEPTICI I DEZIFICIJENSI									
D08AG02	povidon jod	rastvor za kožu			7.5% (1000ml)			Z; SZ		
D08AG02	povidon jod	rastvor za kožu	Hemofarm	Povidon jod	10% (500ml)	1x500ml		Z; SZ		3.27 €
D08AG02	povidon jod	pjena za kožu			7.5% (500ml)			Z; SZ		
G	LJEKOVİ ZA LJEČENJE GENITO-URINARNOG SISTEMA I POLNI HORMONI									
G01	LJEKOVİ SA ANTINFektivIM I ANTISEPTIČKIM DJELOVANJEM ZA GINEKOLOŠKU PRIMJENU									
G01AA51	nistatin, neomicin, polimiksin	vaginalna kapsula, meka	Innothera Chouzy	Polygynax	100.000 U + 35.000 U + 35.000 U	12x(100.000 U + 35.000 U + 35.000 U)		RS; SZ	0.420 €	5.81 €
G01AF01	metronidazol	vaginalna tableta	Belupo	Medazol	500mg	10x500mg		RS; SZ		1.30 €
G01AF02	klotrimazol	vaginalna tableta			200mg			RS; SZ		
G01AX11	povidon jod	vaginaleta	Hemofarm	Povidon jod	200mg	14x200mg		RS; SZ	0.150 €	2.10 €
G02	OSTALI GINEKOLOŠKI PREPARATI									
G02A	UTEROSTIPTICI I PROSTAGLANDINI									
G02AB01	metilergometrin	rastvor za injekciju			0.1mg/ml			Z; SZ		

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
G02AB01	metilergometrin	rastvor za injekciju			0,2mg/ml			Z; SZ		
G02AB01	metilergometrin	oralne kapi	Hemofarm	Methylergometrin	0,25mg/ml (10ml)	1x10ml		RS; SZ	0.054 €	0.67 €
G02AD02	dinoprost	gel			0,5mg/3g			SZ		
G02AD02	dinoprost	vaginalna tableta			3mg			SZ		
G02AD04	karboprost	rastvor za injekciju			0,25mg/ml			SZ		
G02C	BETAADRENERGIČNI AGONISTI									
G02CB01	bromokriptin	tableta			2,5mg			RS; SZ		
G03	POLNI HORMONI I OSTALI LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA POLNI SISTEM									
G03AA07	etinilestradiol, levonorgestrel	obložena tableta	Bayer Pharma AG	Microgynon 30	0,03mg + 0,15mg	21x(0,03mg + 0,15mg)		RS; SZ		2.77 €*
G03BA03	testosteron	rastvor za injekciju	Galenika	Testosteron Depo	250mg/ml	5x(250mg/ml)		Z; SZ	0.086 €	6.00 €
G03BA03	testosteron	rastvor za injekciju	Bayer Pharma AG	Nebido	1000mg/4ml	1x4ml		Z; SZ		91.68 €*
G03CA03	estradiol	injekcija			10mg/ml			Z; SZ		
G03DA03	hidroksiprogesteron	rastvor za injekciju			250mg/ml			Z; SZ		
G03DA04	progesteron	kapsula meka	Besins Manufacturing	Utrogestan	100mg	30x100mg	IG01	RS; SZ	0.550 €	5.50 €
G03DA04	progesteron	kapsula meka	Besins Manufacturing	Utrogestan	200mg	14x200mg	IG01	RS; SZ	0.575 €	5.37 €
G03DC03	linestrenol	tableta			5mg			RS; SZ		
G03GA01	horiogonadotropin	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju			1.500 U			SZ		
G03GA01	horiogonadotropin	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju			5.000 U			SZ		
G03GA02	menotropin - biološki lijek	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Ferring International Center SA	Menopur	75 U + 75 U	10x(75U+75U)	IG02	SZ		169.63 €*
G03GA05	folitropin alfa	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Merck	Gonal-F	75 U/1ml	1x1ml	IG02	SZ	22.610 €	22.61 €
G03GA05	folitropin alfa	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Merck	Gonal-F	300 U/0,5ml	1x(300 U/0,5ml)	IG02	SZ	23.440 €	90.86 €
G03GA05	folitropin alfa	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Merck	Gonal-F	900 U/1,5ml	1x(900 U/1,5ml)	IG02	SZ	23.210 €	274.55 €
G03GA06	folitropin beta	rastvor za injekciju	NV Organon	Puregon	50 U/0,5ml	1x(50U/0,5ml)	IG02	SZ	22.850 €	13.82 €
G03GA06	folitropin beta	rastvor za injekciju	NV Organon	Puregon	100 U/0,5ml	1x(100 U/0,5ml)	IG02	SZ	21.860 €	29.15 €
G03GA06	folitropin beta	rastvor za injekciju	NV Organon	Puregon	300 U/0,36ml	1x(300 U/0,36ml)	IG02	SZ	21.870 €	87.48 €
G03GA06	folitropin beta	rastvor za injekciju	NV Organon	Puregon	600 U/0,72ml	1x(600 U/0,72ml)	IG02	SZ	21.870 €	174.96 €
G03GA06	folitropin beta	rastvor za injekciju	NV Organon	Puregon	900 U/1,08ml	1x(900 U/1,08ml)	IG02	SZ	21.870 €	262.44 €
G03HA01	ciproteron	tableta	Delpharm Lille SAS	Androcur	50mg	50x50mg		RS; SZ	0.610 €	16.95 €*
G03XB02	ulipristal acetat	tableta	Gedeon Richter	Esmya	5mg	28x5mg	IG04	RS; SZ	4.690 €	127.72 €*
G04	UROLOŠKI LJEKOVI									
G04B	OSTALI UROLOŠKI LJEKOVI UKLJUČUJUĆI ANTISPASZMOTIKE									
G04BE03	sildenafil	film tableta			20mg		IG03	RK; SZK		
G04BD09	tropijum	rastvor za injekciju			0,2mg/5ml			Z; SZ		
G04BD09	tropijum	tableta	Lek	Spasmex Forte	5mg	20x5mg		R; SZ	1.000 €	2.50 €
G04C	LJEKOVI U TERAPIJI BENIGNE HIPERTROFIJE PROSTATE									
G04CB01	finasterid	film tableta	Pliva	Mostrafin	5mg	28x5mg		RS; SZ	0.115 €	3.21 €
H	HORMONI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE									
H01	HORMONI HIPOFIZE, HIPOTALAMUSA I ANALOZI									
H01A	HORMONI PREDNJEG REZŃJA HIPOFIZE									
H01AC01	somatropin - biološki lijek	rastvor za injekciju u penu sa uloškom			5mg/1,5ml		IH01	RK; SZK		
H01AC01	somatropin - biološki lijek	rastvor za injekciju u penu sa uloškom			5.3mg/ml		IH01	RK; SZK		
H01AC01	somatropin - biološki lijek	rastvor za injekciju u penu sa uloškom			6mg/3ml		IH01	RK; SZK		
H01AC01	somatropin - biološki lijek	rastvor za injekciju u penu sa uloškom			10mg/1,5ml		IH01	RK; SZK		
H01AC01	somatropin - biološki lijek	rastvor za injekciju u penu sa uloškom			12mg/ml		IH01	RK; SZK		
H01AC01	somatropin - biološki lijek	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Novo Nordisk	Norditropin Nordilet	15mg/1,5ml	1x15mg/1,5ml	IH01	RK; SZK	15.590 €	350.84 €*
H01AC01	somatropin - biološki sličan lijek	rastvor za injekciju u ulošku	Sandoz	Omnitrope	10mg/1,5ml	1x(10mg/1,5ml)	IH01/1	RK; SZK	8.380 €	125.09 €
H01AC01	somatropin - biološki sličan lijek	rastvor za injekciju u ulošku	Sandoz	Omnitrope	15mg/1,5ml	1x(15mg/1,5ml)	IH01/1	RK; SZK	7.340 €	164.38 €
H01B	HORMONI ZADNJEG REZŃJA HIPOFIZE									
H01BA02	dezmpresin	tableta	Ferring International Center SA	Minirin	0,2mg	30x0,2mg	IH05/1	RS; SZ	2.676 €	32.27 €
H01BA02	dezmpresin	sprej za nos, rastvor	Ferring International Center SA	Minirin	0,1mg/ml (5ml)	1x5ml	IH05/2	RS; SZ	1.630 €	32.62 €*
H01BA02	dezmpresin	rastvor za injekciju	Kedrion - Biologici Italia Laboratories	Emosint	4mcg/0,5ml	10x(4mcg/0,5ml)	IH05/3	SZ		20.42 €
H01BA02	dezmpresin	rastvor za injekciju	Kedrion - Biologici Italia Laboratories	Emosint	20mcg/ml	10x(20mcg/ml)	IH05/3	SZ		69.39 €
H01BB02	oksitocin	rastvor za injekciju/infuziju			5 U/ml			SZ		

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
H01BB02	oksitocin	rastvor za injekciju/infuziju			10 U/ml			SZ		
H01C	HORMONI HIPOTALAMUSA									
H01CA01	gonadorelin	injekcija					IH02	SZ		
H01CB02	oktreotid	rastvor za injekciju/infuziju	Novartis Pharma	Sandostatin	0,1mg/ml	5x(0,1mg/ml)	IH03	Z; SZ		36.10 €*
H01CB02	oktreotid	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	Novartis Pharma	Sandostatin LAR	10mg	1x10mg	IH04	Z; SZ		601.82 €*
H01CB02	oktreotid	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	Novartis Pharma	Sandostatin LAR	20mg	1x20mg	IH04	Z; SZ		893.12 €*
H01CB02	oktreotid	prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju	Novartis Pharma	Sandostatin LAR	30mg	1x30mg	IH04	Z; SZ		1,101.74 €*
H01CB03	lanreotid	rastvor za injekciju	Ipsen Pharma Biotech	Somatuline Autogel	90mg	1x90mg	IH04	Z; SZ	24.020 €	883.81 €*
H01CB03	lanreotid	rastvor za injekciju	Ipsen Pharma Biotech	Somatuline Autogel	120mg	1x120mg	IH04	Z; SZ	24.640 €	1,132.59 €*
H01CC01	ganireliks	rastvor za injekciju, napunjeni injekcioni špric	Organon	Orgalutran	0,25mg/0,5ml	1x0,5ml	IG02	SZ	32.170 €	32.17 €
H01CC02	cetoreliks	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, bočica i napunjeni injekcioni špric	Baxter Oncology	Cetrotide	0,25mg/1ml	1x1ml	IG02	SZ		28.66 €
H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU									
H02AB01	betametazon	suspenzija za injekciju			7mg/ml			Z; SZ		
H02AB02	deksametazon	tableta	Galenika	Dexazon	0,5mg	50x0,5mg		R; SZ		3.00 €
H02AB02	deksametazon	rastvor za injekciju	Krka	Dexamethason Krka	4mg/ml	25x4mg/ml		Z; SZ	0.073 €	4.84 €
H02AB04	metilprednizolon	tableta	Pfizer	Medrol	4mg	30x4mg		R; SZ	0.080 €	2.42 €
H02AB04	metilprednizolon	prašak i rastvarač za rastvor za inj/inf			20mg			Z; SZ		
H02AB04	metilprednizolon	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Pfizer	Solu - Medrol	40mg/1ml	1x(40mg/1ml)		Z; SZ	0.770 €	1.530 €
H02AB04	metilprednizolon	suspenzija za injekciju	Hemofarm	Lemod-depo	40mg/ml	10x1ml		Z; SZ		7.70 €
H02AB04	metilprednizolon	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Pfizer	Solu - Medrol	125mg/2ml	1x(125mg/2ml)		Z; SZ	0.960 €	5.99 €
H02AB04	metilprednizolon	prašak i rastvarač za rastvor za inj/inf	Hemofarm	Lemod-solu	500mg	1x500mg		Z; SZ	0.182 €	4.54 €
H02AB07	prednizon	tableta			5mg			R; SZ		
H02AB07	prednizon	tableta	Galenika	Pronison	20mg	20x20mg		R; SZ	0.040 €	1.60 €
H02AB09	hidrokortizon	tableta			5mg			R; SZ		
H02AB09	hidrokortizon	tableta			10mg			R; SZ		
H02AB09	hidrokortizon	ampula			100mg/2ml			R; SZ		
H03	LJEKOVI ZA LJEČENJE TIROIDEJE									
H03A	PREPARATI TIROIDEJE									
H03AA01	levotiroksin	tableta	Merck	Euthyrox	0,025mg	50x0,025mg		RS; SZ	0.110 €	0.94 €
H03AA01	levotiroksin	tableta	Merck	Euthyrox	0,05mg	50x0,05mg		RS; SZ	0.080 €	1.29 €
H03AA01	levotiroksin	tableta	Merck	Euthyrox	0,075mg	50x0,075mg		RS; SZ	0.050 €	1.32 €
H03AA01	levotiroksin	tableta	Merck	Euthyrox	0,125mg	50x0,125mg		RS; SZ	0.040 €	1.66 €
H03AA01	levotiroksin	tableta	Merck	Euthyrox	0,15mg	50x0,15mg		RS; SZ	0.040 €	1.82 €
H03AA01	levotiroksin	tableta	Merck	Euthyrox	0,1mg	50x0,1mg		RS; SZ	0.060 €	1.90 €
H03AA01	levotiroksin	tableta			0,1mg			RS; SZ		
H03B	ANTITIREOIDNI PREPARATI									
H03BA02	propiltiouracil	tableta	Alkaloid	PTU	50mg	20x50mg		R; SZ		2.70 €
H03BA02	propiltiouracil	tableta			100mg			R; SZ		
H03BB02	tiamazol	film tableta	Merck	Thyrozol	20mg	20x20mg		R; SZ		1.66 €
H04	LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA LUČENJE HORMONA PANKREASA									
H04AA01	glukagon	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Novo Nordisk	Glucagen Hypokit	1mg/ml	1x(1mg/ml)		RS; Z; SZ		14.33 €
H05	LJEKOVI A ODRŽAVANJE HOMEOSTAZE KALCIJUMA									
H05BX01	sinakalset	film tableta	Amgen	Mimpara	30mg	28x30mg	IH06	RS; SZ	10.580 €	148.13 €
J										
J01	ANTIBAKTERIJSKI LJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU									
J01A	TETRACIKLINI									
J01AA02	doksiciklin	kapsula tvrda	Galenika	Dovicin	100mg	5x100mg		R; SZ		0.45 €
J01AA12	tigeciklin #	prašak za rastvor za infuziju			50mg		IJ01/1	SZ		
J01B	HLORAMFENIKOLI									
J01BA01	hloramfenikol #	prašak za injekciju			1.000mg		IJ01	SZ		
J01C	BETA - LAKTAMSKI PENICILINI									
J01CA01	ampicilin	prašak za injekciju			1.000mg			Z; SZ		
J01CA04	amoksicilin	kapsula tvrda	Remedica Ltd	Amoxicilin	250mg	20x250mg		R; SZ	0.116 €	0.58 €
J01CA04	amoksicilin	kapsula	Hemofarm	Amoksicilin	500mg	16x500mg		R; SZ		0.67 €
J01CA04	amoksicilin	kapsula	Remedica Ltd	Amoxicilin	500mg	16x500mg		R; SZ	0.083 €	0.67 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
J01CA04	amoksisicilin	prašak za oralnu suspenziju	Alkaloid	Almacin	250mg/5ml (100ml)	1x100ml		R; SZ		0.72 €
J01CA04	amoksisicilin	prašak za oralnu suspenziju	Sandoz	Ospamox	500mg/5ml (60ml)	1x60ml		R; SZ	0.020 €	1.19 €
J01CA04	amoksisicilin	tableta za oralnu suspenziju			500mg			R; SZ		
J01CA04	amoksisicilin	tableta za oralnu suspenziju	Sandoz	Ospamox DT	1.000mg	14x1.000mg		R; SZ	0.270 €	1.90 €
J01CE02	fenoksimetilpenicilin	peroralna suspenzija			750.000 U/5ml (60ml)			R; SZ		
J01CE02	fenoksimetilpenicilin	film tableta			1.000.000 U			R; SZ		
J01CE02	fenoksimetilpenicilin	film tableta			1.500.000 U			R; SZ		
J01CE08	benzatin-benzilpenicilin	injekcija; lio bočica			600.000 U			Z; SZ		
J01CE08	benzatin-benzilpenicilin	injekcija;			1.200.000 U			Z; SZ		
J01CE08	benzatin-benzilpenicilin	injekcija; lio bočica			2.400.000 U			Z; SZ		
J01CE30	benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin	prašak za suspenziju za injekciju	Hemofarm	Pancillin	800.000 U	50x800.000 U		Z; SZ		15.67 €
J01CF02	kloksacilin #	sirup			125mg/5ml		IJ02	RS; SZ		
J01CF02	kloksacilin #	kapsula			500mg		IJ02	RS; SZ		
J01CF02	kloksacilin #	ampula			1.000mg		IJ02	SZ		
J01CR02	amoksisicilin, klavulonska kiselina	prašak za oralnu suspenziju	Hemofarm	Panklav	(125mg + 31,25mg)/5ml (100ml)	1x100ml	IJ03	R; SZ		1.60 €
J01CR02	amoksisicilin, klavulonska kiselina	prašak za oralnu suspenziju	Hemofarm	Panklav	(250mg + 62,5mg)/5ml (100ml)	1x100ml	IJ03	R; SZ		2.60 €
J01CR02	amoksisicilin, klavulonska kiselina	granule za oralnu suspenziju	Hemofarm	Panklav	(400mg + 57mg)/5ml (140ml)	1x140ml	IJ03	R; SZ		4.55 €
J01CR02	amoksisicilin, klavulonska kiselina	prašak za rastvor za injekciju			500mg + 100mg		IJ03	Z; SZ		
J01CR02	amoksisicilin, klavulonska kiselina	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	Lek	Amoksiklav	1.000mg + 200mg	5x(1.000mg + 200mg)	IJ03	Z; SZ	5.320 €	10.64 €
J01CR02	amoksisicilin, klavulonska kiselina	film tableta	Hemofarm	Panklav	250mg+125mg	15x(250mg+125mg)	IJ03	R; SZ		2.20 €
J01CR02	amoksisicilin, klavulonska kiselina	film tableta	Lek	Amoksiklav	500mg + 125mg	15x(500mg+125mg)	IJ03	R; SZ	0.690 €	3.45 €
J01CR02	amoksisicilin, klavulonska kiselina	film tableta	Hemofarm	Panklav	500mg + 125mg	20x(500mg+125mg)	IJ03	R; SZ		4.50 €
J01CR02	amoksisicilin, klavulonska kiselina	film tableta	Hemofarm	Panklav	875mg + 125mg	14x(875mg+125mg)	IJ03	R; SZ		2.70 €
J01CR05	piperacilin, tazobaktam #	prašak za rastvor za infuziju			4.000mg + 500mg		IJ01/3	SZ		
J01D	CEFALOSPORINI									
J01DB01	cefaleksin	granule za oralnu suspenziju			250mg/5ml (100ml)			R; SZ		
J01DB01	cefaleksin	kapsula tvrda	Remedica Ltd	Cefalexin	250mg	20x250mg		R; SZ	0.324 €	0.81 €
J01DB01	cefaleksin	kapsula	Remedica Ltd	Cefalexin	500mg	16x500mg		R; SZ	0.205 €	0.82 €
J01DB01	cefaleksin	prašak za oralnu suspenziju	Alkaloid	Cefalexin Alkaloid	250mg/5ml (100ml)	1x100ml		R; SZ		1.35 €
J01DB04	cefazolin	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	Pharma Swiss	Primaceph	1.000mg	50x1.000mg		Z; SZ	3.360 €	56.00 €
J01DC02	cefuroksim	prašak za rastvor za injekciju	Chephasaar Chemische	Cefuroxim-MIP	750mg	10x750mg	IJ04	SZ	2.692 €	6.73 €
J01DC02	cefuroksim	prašak za rastvor za injekciju	Chephasaar Chemische	Cefuroxim-MIP	1.500mg	10x1.500mg	IJ04	SZ	2.282 €	11.41 €
J01DC02	cefuroksim	obložena tableta			250mg		IJ04	R; SZ		
J01DC02	cefuroksim	obložena tableta	Sandoz	Xorimax	500mg	10x500mg	IJ04	R; SZ	0.690 €	3.46 €
J01DD02	ceftazidim #	prašak za rastvor za injekciju			500mg		IJ01	SZ		
J01DD02	ceftazidim #	prašak za rastvor za injekciju	Alkaloid	Cefaz	1.000mg	5x1.000mg	IJ01	SZ		8.75 €
J01DD02	ceftazidim #	prašak za rastvor za injekciju	Sandoz	Ceftazidim Sandoz	1.000mg	1x1.000mg	IJ01	SZ		1.75 €
J01DD04	ceftriakson #	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju	Sandoz	Lendacin	1.000mg	10x1.000mg	IJ05	Z; SZ	0.990 €	9.99 €
J01DD08	cefiksim	granule za oralnu suspenziju	Alkaloid	Pancef	100mg/5ml (100ml)	1x100ml	IJ06	RS; SZ		6.37 €
J01DD08	cefiksim	film tableta	Alkaloid	Pancef	400 mg	10x400mg	IJ06	RS; SZ		8.80 €
J01DE01	cefepim #	prašak rastvor za inf./inj.			500mg		IJ01	SZ		
J01DE01	cefepim #	prašak rastvor za inf/inj			1.000mg		IJ01	SZ		
J01DH	KARBAPENEMI									
J01DH02	meropenem #	prašak za rastvor za injekciju/infuziju			500mg		IJ01/4	SZ		
J01DH02	meropenem #	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	Pharma Swiss	Merocid	1.000mg	10x1.000mg	IJ01/4	SZ	11.080 €	55.40 €
J01DH03	ertapenem #	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	Merck Sharp & Dohme BV	Invanz	1.000mg	1x1.000mg	IJ01/5	SZ	42.090 €	42.09 €
J01DH51	imipenem, cilastatin #	prašak za rastvor za infuziju	Pharma Swiss	Mipecid	500mg + 500mg	10x(500mg + 500mg)	IJ01/6	SZ	17.530 €	43.83 €
J01DH51	imipenem, cilastatin #	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju			500mg + 500mg		IJ01/6	SZ		
J01E	SULFONAMIDI I TRIMETOPRIM									
J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	sirup			(200mg + 40mg)/5ml (100ml)			R; SZ		

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	sirup			(200mg + 40mg)/5ml (100ml)			R; SZ		
J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	koncentrat za infuziju			(400mg + 80mg)/5ml			SZ		
J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	tableta	Bosna Lijek	Esbetul	400mg + 80mg	20x(400mg + 80mg)		R; SZ	0.170 €	1.00 €
J01F	MAKROLIDI I LINKOZAMIDI									
J01FA01	eritromicin	prašak za oralnu suspenziju			250mg/5ml (100ml)			R; SZ		
J01FA01	eritromicin	film tableta	Hemofarm	Eritromicin	250mg	20x250mg		R; SZ		1.55 €
J01FA01	eritromicin	film tableta	Hemofarm	Eritromicin	500mg	20x500mg		R; SZ		2.68 €
J01FA09	klaritromicin	prašak za oralnu suspenziju			125mg/5ml		IJ07	RS; SZ		
J01FA09	klaritromicin	film tableta	Hemofarm	Zymbaktar	250mg	14x250mg	IJ07	RS; SZ		2.27 €
J01FA09	klaritromicin	film tableta	Hemofarm	Zymbaktar	500mg	14x500mg	IJ07	RS; SZ		3.93 €
J01FA09	klaritromicin	film tableta	Krka	Fromilid	500mg	14x500mg	IJ07	RS; SZ	0.281 €	3.93 €
J01FA10	azitromicin	prašak za oralnu suspenziju	Pliva	Sumamed	100mg/5ml (20ml)	20x100mg/5ml (20ml)	IJ08	RS; SZ	1.550 €	2.06 €
J01FA10	azitromicin	prašak za oralnu suspenziju	Pliva	Sumamed Forte	200mg/5ml (50ml)	1x15ml	IJ08	RS; SZ	1.630 €	3.25 €
J01FA10	azitromicin	granule za oralnu suspenziju	Hemofarm	Hemomycin	200mg/5ml (20ml)	1x20ml	IJ08	RS; SZ		1.08 €
J01FA10	azitromicin	prašak za rastvor za infuziju	Hemofarm	Hemomycin	500mg	1x500mg	IJ08/1	SZ		2.81 €
J01FA10	azitromicin	film tableta	Hemofarm	Hemomycin	500mg	3x500mg	IJ08	RS; SZ		1.75 €
J01FA10	azitromicin	kapsula tvrda	Hemofarm	Hemomycin	250mg	6x250mg	IJ08	RS; SZ		1.55 €
J01FF01	klindamicin #	film tableta	Chephasaar Chemische	Clindamycin-MIP	300mg	12x300mg	IJ01/7	RS; SZ	1.280 €	2.56 €
J01FF01	klindamicin #	film tableta	Chephasaar Chemische	Clindamycin-MIP	300mg	30x300mg	IJ01/7	RS; SZ	1.280 €	6.40 €
J01FF01	klindamicin #	film tableta	Chephasaar Chemische	Clindamycin-MIP	600mg	12x600mg	IJ01/7	RS; SZ	1.058 €	4.23 €
J01FF01	klindamicin #	film tableta	Chephasaar Chemische	Clindamycin-MIP	600mg	30x600mg	IJ01/7	RS; SZ	1.042 €	10.42 €
J01FF01	klindamicin #	rastvor za injekciju	Chephasaar Chemische	Clindamycin-MIP	600mg/4ml	5x4ml	IJ01	SZ	2.610 €	4.35 €
J01FF01	klindamicin #	rastvor za injekciju	Hemofarm	Klindamicin	300mg/2ml	10x(300mg/2ml)	IJ01	SZ		4.35 €
J01G	AMINOGLIKOZIDI									
J01GA01	streptomycin	injekcija; prašak za injekciju			1.000mg			SZ		
J01GB03	gentamicin	rastvor za injekciju			40mg/2ml			Z; SZ		
J01GB03	gentamicin	rastvor za injekciju	Alkaloid	Gentamicin Alkaloid	80mg/2ml	10x(80mg/2ml)		Z; SZ		2.70 €
J01GB03	gentamicin	rastvor za injekciju	Alkaloid	Gentamicin Alkaloid	120mg/2ml	10x(120mg/2ml)		Z; SZ		3.30 €
J01GB06	amikacin #	rastvor za injekciju/infuziju	Galenika	Amikacin	100mg/2ml	10x(100mg/2ml)	IJ05	Z; SZ	3.900 €	3.90 €
J01GB06	amikacin #	rastvor za injekciju/infuziju	Galenika	Amikacin	500mg/2ml	10x(500mg/2ml)	IJ05	Z; SZ	1.800 €	9.00 €
J01M	HINOLONI									
J01MA01	ofloksacin #	tableta			200mg		IJ01/7	RS; SZ		
J01MA02	ciprofloksacin #	film tableta	Krka	Ciprinol	250mg	10x250mg	IJ12	RS; SZ	0.237 €	0.59 €
J01MA02	ciprofloksacin #	film tableta	Krka	Ciprinol	500mg	10x500mg	IJ12	RS; SZ	0.187 €	0.93 €
J01MA02	ciprofloksacin #	koncentrat za rastvor za infuziju	Krka	Ciprinol	100mg/10ml	5x(100mg/10ml)	IJ12	SZ		3.33 €
J01MA14	moksifloksacin	tableta			400mg		IJ12/1	RS; SZ		
J01MA14	moksifloksacin	rastvor za infuziju			400mg/250ml		IJ12/1	SZ		
J01MB04	pipemidna kiselina	kapsula, tvrda	Lek	Palin	200mg	20x200mg		R; SZ	0.190 €	0.99 €
J01X	OSTALI ANTIBIOTICI									
J01XA01	vankomicin #	prašak za rastvor za infuziju	Chephasaar Chemische	Vancomycin MIP	500mg	5x500mg	IJ01	SZ	6.850 €	8.57 €
J01XA01	vankomicin #	prašak za rastvor za infuziju	Chephasaar Chemische	Vancomycin MIP	1.000mg	5x1.000mg	IJ01	SZ	9.608 €	12.01 €
J01XD01	metronidazol	rastvor za infuziju	Galenika	Orvagil	500mg/100ml	1x(500mg/100ml)		SZ	5.454 €	1.80 €
J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU									
J02AC	DERIVATI TRAZOLA									
J02AC01	flukonazol	rastvor za infuziju	Hemofarm	Fluconal	2mg/ml (100ml)	1x100ml		SZ		4.30 €
J02AC01	flukonazol	kapsula tvrda	Bosna Lijek	Funzol	50mg	7x50mg		RS; SZ		0.85 €
J02AC01	flukonazol	kapsula, tvrda	Bosna Lijek	Funzol	150mg	1x150mg		RS; SZ	1.813 €	1.36 €
J02AC03	vorikonazol	tableta			200mg		IJ13	SZK		
J02AC03	vorikonazol	prašak za rastvor za infuziju	Pfizer - Fareva Amboise	Vfend	200mg	1x200mg	IJ13	SZK	230.580 €	115.29 €
J04	ANTITUBERKULOTICI									
J04A	LJEKOVI ZA TERAPIJU TUBERKULOZE									
J04AA01	para-amino salicilna kiselina	tableta			500mg			RS; SZ		
J04AB01	cikloserin	kapsula			250mg			RS; SZ		
J04AB02	rifampicin	kapsula			300mg			RS; SZ		

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
J04AB02	rifampicin	kapsula			300mg			RS; SZ		
J04AB30	kapreomicin	ampula			1.000mg			SZ		
J04AD03	etonamid	tableta			250mg			RS; SZ		
J04AC01	izoniazid	tableta			50mg			RS; SZ		
J04AC01	izoniazid	tableta			100mg			RS; SZ		
J04AC51	izoniazid +piridoksin	kapsula			400mg + 25mg			RS; SZ		
J04AK01	pirazinamid	tableta			500mg			RS; SZ		
J04AK02	etambutol	tableta			100mg			RS; SZ		
J04AK02	etambutol	tableta			400mg			RS; SZ		
J05	ANTIVIRUSNI LJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU									
J05A	LJEKOVI SA DIREKTNIM DJELOVANJEM NA VIRUSE									
J05AB01	aciclovir	prašak za rastvor za infuziju			250mg			SZ		
J05AB01	aciclovir	tableta	Zdravlje AD Leskovac	Aciclovir	200mg	25x200mg		R; SZ	2.240 €	5.65 €
J05AB14	valganciklovir	film tableta	Roche	Valcyte	450mg	60x450mg	IJ15	RK; SZK	38.050 €	744.05 €
J05AB04	ribavirin	kapsula, tvrda	Schering-Plough	Rebetol	200mg	140x200mg	IJ17	RK; SZK	7.100 €	196.00 €
J05AB06	ganciklovir	prašak za infuziju			500mg		IJ17/2	SZ		
J05AE01	sakvinavir	tableta			500mg		IJ18	RK; SZK		
J05AE03	ritonavir	film tableta	AbbVie Deutschland GmbH	Norvir	100mg	30x100mg	IJ18	RK; SZK		19.17 €
J05AF01	zidovudin	kapsula			100mg		IJ18	RK; SZK		
J05AF01	zidovudin	kapsula			250mg		IJ18	RK; SZK		
J05AF05	lamivudin	film tableta	Glaxo Smith Kline	Zeffix	100mg	28x100mg	IJ19	RK; SZK		50.43 €
J05AF05	lamivudin	film tableta	Glaxo Smith Kline	Epivir	150mg	60x150mg	IJ20	RK; SZK	3.180 €	90.92 €
J05AF06	abakavir	film tableta	Glaxo Smith Kline	Ziagen	300mg	60x300mg	IJ18	RK; SZK		210.62 €
J05AG03	efavirenz	film tableta	Merck Sharp & Dohme BV	Stocrin	600mg	30x600mg	IJ18	RK; SZK	6.950 €	208.53 €
J05AR01	lamivudin, zidovudin	film tableta	Glaxo Smith Kline	Combivir	150mg + 300mg	60x(150mg + 300mg)	IJ18	RK; SZK	6.400 €	177.91 €
J05AR02	abakavir, lamivudin	film tableta	Glaxo Smith Kline	Kivexa	600mg + 300 mg	30x(600mg + 300 mg)	IJ18	RK; SZK	10.500 €	301.54 €
J05AR03	tenofovir, emtricitabin	film tableta			245mg + 200mg		IJ18	RK; SZK		
J05AR10	lopinavir, ritonavir	film tableta	AbbVie Deutschland GmbH	Aluvia	200mg + 50mg	120x(200mg + 50mg)	IJ18	RK; SZK		120.48 €
J05AX08	raltegravir	film tableta	Merck Sharp & Dohme BV	Isentress	400mg	60x400mg	IJ22	RK; SZK	17.900 €	533.93 €
J05AX12	dolutegravir	film tableta	Glaxo Smith Kline	Tivicay	50mg	30x50mg	IJ18/1	RK; SZK	17.750 €	532.62 €
J05AX16	dasabuvir	film tableta	AbbVie Deutschland GmbH	Exviera	250mg	56x250mg	IJ23	RK; SZK		1,055.47 €* 1,055.47 €
J05AX67	ombitasvir, paritaprevir, ritonavir	film tableta	AbbVie Deutschland GmbH	Viekirax	12,5mg + 75mg + 50mg	56x(12,5mg + 75mg + 50mg)	IJ24	RK; SZK	442.230 €	12,014.72 €* 12,014.72 €
J06	SERUMI I IMUNOGLOBULINI									
J06A	IMUNOSERUMI									
J06AA01	antitoksin protiv difterije	injekcija			10.000 U			SZ		
J06AA02	antitoksin protiv tetanusa	injekcija			1.500 U			Z; SZ		
J06AA02	antitoksin protiv tetanusa	injekcija			10.000 U			Z; SZ		
J06AA02	antitoksin protiv tetanusa	injekcija			20.000 U			Z; SZ		
J06AA03	antitoksin protiv zmijskog otrova	rastvor za injekciju			170mg/ml (5ml)		IJ27	Z; SZ		
J06AA04	antitoksin protiv botulinuma	injekcija						SZ		
J06AA05	anti toksin protiv gasne gangrene	injekcija						SZ		
J06AA06	serum protiv bjesnila	injekcija						Z; SZ		
J06B	IMUNOGLOBULINI									
J06BA02	imunoglobulin,normalni,humani za intravaskularnu primenu	rastvor za infuziju	Kedrion SpA	Ig VENA	5% (50ml)	1x50ml	IJ11	SZ		126.73 €
J06BA02	imunoglobulin,normalni,humani za intravaskularnu primenu	rastvor za infuziju	Kedrion SpA	Ig VENA	5% (100ml)	1x100ml	IJ11	SZ		250.40 €
J06BB01	imunoglobulin humani anti D (Rho)	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Kedrion SpA	Immuno RHO	300mcg/2ml	1x(300mcg/2ml)	IJ14	Z; SZ		32.10 €
J06BB02	imunoglobulin antitetanusni	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu			250 U/ml			Z; SZ		
J06BB04	hiperimunoglobulin protiv hepatitisa "B"	rastvor za injekciju			180U/ml			Z; SZ		
J06BB05	imunoglobulin protiv bjesnila	rastvor za injekciju			150 U/ml (1ml)			Z; SZ		
J06BB05	imunoglobulin protiv bjesnila	rastvor za injekciju			150 U/ml (2ml)			Z; SZ		

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
J06BB05	imunoglobulin protiv bjesnila	rastvor za injekciju			150 U/ml (5ml)			Z; SZ		
J06BB05	imunoglobulin protiv bjesnila	rastvor za injekciju			150 U/ml (10ml)			Z; SZ		
J06BB16	palivizumab - biološki lijek	rastvor za injekciju	AbbVie S.r.L.	Synagis	100mg/1ml	1x0,5ml	IJ25	SZK		487.92 €
J07	VAKCINE									
J07A	BAKTERIJSKE VAKCINE									
J07AG01	vakcina protiv hemofilusa influence tip B, konjugovana	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Glaxo Smith Kline	Hiberix	10mcg/0,5ml	100x(10mcg/0,5ml)		Z; SZ		676.04 €
J07AH03	vakcina protiv meningokoknog meningitisa grupa A i C, prečišćena polisaharidna	prašak za injekciju			50mcg + 50mcg		IJ26	Z; SZ		
J07AH04	vakcina protiv meningokoknog meningitisa četvorvalentna (A+C+W135+Y), prečišćena polisaharidna	prašak za injekciju			0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07AJ51	vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja - cijelo ćelijska	ampula; suspenzija za injekciju			(30 U + 40 U + 4 U)/0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07AJ51	vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja - cijelo ćelijska	suspenzija za injekciju			(30 U + 40 U + 4 U)/0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07AJ52	vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (Di Te PerA), acelularna	ampula; suspenzija za injekciju			10mcg/0,5ml + 5mcg/0,5ml + 5mcg/0,5ml + 3mcg/0,5ml + 30 U/0,5ml + 40 U/0,5 ml (0,5ml)		IJ26	Z; SZ		
J07AJ52	vakcina protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja (Di Te PerA), acelularna	ampula; suspenzija za injekciju			(30 U + 40 U + 25mcg + 25mcg + 8mcg)/0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07AL52	vakcina protiv pneumokoka, konjugovana, polisaharidna, adsorbovana	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Glaxo Smith Kline	Synflorix	(1mcg + 3mcg + 1mcg + 1mcg + 1mcg + 1mcg + 3mcg + 3mcg + 1mcg)/0,5ml	1x0,5ml	IJ26	Z; SZ		42.76 €
J07AL52	vakcina protiv pneumokoka, konjugovana	ampula; suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu			(2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 4,4mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg)/0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07AL52	vakcina protiv pneumokoka, konjugovana	ampula; suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu			(2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 4,4mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg + 2,2mcg)/0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07AM01	vakcina protiv tetanusa, adsorbovana	suspenzija za injekciju			najmanje 40 U/0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07AM51	vakcina protiv tetanusa i difterije (Di Te A)	suspenzija za injekciju			(30 U (najmanje) + 40 U (najmanje))/0,5ml (5ml)		IJ26	Z; SZ		
J07AM51	vakcina protiv tetanusa i difterije (Di Te A)	ampula; suspenzija za injekciju			(30 U (najmanje) + 40 U (najmanje))/0,5ml (10ml)		IJ26	Z; SZ		
J07AM51	vakcina protiv tetanusa i difterije (Di Te A)	ampula; suspenzija za injekciju			(30 U (najviše) + 40 U (najmanje))/0,5ml (5ml)		IJ26	Z; SZ		
J07AM51	vakcina protiv tetanusa i difterije (Di Te A)	ampula; suspenzija za injekciju			(30 U (najviše) + 40 U (najmanje))/0,5ml (10ml)		IJ26	Z; SZ		
J07AN01	vakcina protiv tuberkuloze, živa atenuirana	ampula; prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju			(1,6-16,0 x 10 ⁶)/6(CFU)/ml (1ml)		IJ26	Z; SZ		

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
J07AN01	vakcina protiv tuberkuloze, živa atenuirana	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju			(1,6-16,0 x 10 ⁶)(6)CFU/ml (1ml)		IJ26	Z; SZ		
J07AP03	vakcina protiv trbušnog tifusa, prečišćena polisaharidna	ampula; rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu			25mcg/0,5ml (10ml)		IJ26	Z; SZ		
J07B	VIRUSNE VAKCINE									
J07BA01	vakcina protiv krpeljnog meningo-encefalitisa, inaktivisan cjelovirusna	ampula			0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07BB01	vakcina protiv gripa - inaktivisana, cjeloćelijska	ampula			0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07BB01	vakcina protiv gripa - inaktivisana, cjeloćelijska	ampula			5ml		IJ26	Z; SZ		
J07BB02	vakcina protiv gripa, inaktivisana, rascijepljena i prečišćena ("split") ili pojedinačna ("subunit")	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu			(15mcg + 15mcg + 15mcg)/0,5ml (0,5ml)		IJ26	Z; SZ		
J07BB02	vakcina protiv gripa, inaktivisana, rascijepljena i prečišćena ("split") ili pojedinačna ("subunit")	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu			(15mcg + 15mcg + 15mcg)/0,5ml (0,5ml)		IJ26	Z; SZ		
J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	suspenzija za injekciju	Glaxo Smith Kline	Engerix B	10mcg/0,5ml	100 x 10mcg/0,5 ml	IJ26	Z; SZ		529.55 €
J07BC01	vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna	suspenzija za injekciju	Glaxo Smith Kline	Engerix B	20mcg/ml	100 x 20mcg/ml	IJ26	Z; SZ		681.97 €
J07BC02	vakcina protiv žutice izazvane virusom hepatitisa A, inaktivisana cjelovirusna	ampula; suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu			160 Antigen U/0,5ml (0,5ml)		IJ26	Z; SZ		
J07BD01	vakcina protiv malih boginja, živa atenuirana	ampula			0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07BD52	vakcina protiv morbila, rubeole i parotitisa, živa atenuirana	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Glaxo Smith Kline	Priorix	10exp3 CCID 50/0,5ml + 10exp3,7 CCID 50/0,5ml + 10exp3 CCID 50/0,5ml (0,5ml)	1 x 0,5 ml plus rastvarač 1 x 0,5 ml	IJ26	Z; SZ		8.86 €
J07BD52	vakcina protiv morbila, rubeole i parotitisa, živa atenuirana	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju			10exp3 CCID 50/0,5ml + 12,5exp3,7 CCID 50/0,5ml + 10exp3 CCID 50/0,5ml (0,5ml)		IJ26	Z; SZ		
J07BF03	vakcina protiv dječije paralize, inaktivisana, tritipna	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu			40D U + 8D U + 32D U/0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07BG01	vakcina protiv bjesnila, inaktivisana	ampula; prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju			2,5 U/0,5ml (0,5ml)		IJ26	Z; SZ		
J07BL01	vakcina protiv žute groznice, živa atenuirana	prašak za injekcije; prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju			0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07CA06	vakcina protiv difterije, tetanusa, acelularna komponenta pertusisa, inaktivirana vakcina protiv dječije paralize i vakcina protiv hemofilusa influence tip b, kombinovana	prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu			(30 U + 40 U + 25mcg + 25mcg + 40D U + 8D U + 32D U + 10mcg)/0,5ml		IJ26	Z; SZ		
J07CA06	vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), dječije paralize (inaktivisana) i hemofilusa influence tip b (konjugovana, adsorbovana) kombinovana	prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Glaxo Smith Kline	Infanrix-IPV+HIB	(30 U + 40 U + 25mcg + 25mcg + 8mcg + 40D U + 8D U + 32D U + 10mcg)/0,5ml	1 x 0,5 ml	IJ26	Z; SZ		18.00 €
L	ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI									
L01	ANTINEOPLASTICI									
L01A	ALKILIRAJUĆI CITOSTATICI									
L01AA01	ciklofosfamid	tableta			50mg		IL01	RS; SZ		
L01AA01	ciklofosfamid	prašak za rastvor za injekciju			1.000mg		IL01	SZ		
L01AA01	ciklofosfamid	bočica; prašak za injekcije			200mg		IL01	SZ		
L01AA01	ciklofosfamid	bočica; prašak za injekcije			500mg		IL01	SZ		
L01AA02	hlorambucil	tableta			2mg		IL02	RS; SZ		
L01AA03	melfalan	tableta			2mg		IL02	RS; SZ		
L01AA03	melfalan	tableta			5mg		IL02	RS; SZ		

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
L01AA06	ifosfamid	prašak za rastvor za injekciju			1.000mg		IL03	SZ		
L01AA09	bendamustin	prašak za rastvor za infuziju	Astellas	Ribomustin	25mg	5x25mg	IL04	SZ; SZK		330.52 €
L01AA09	bendamustin	prašak za rastvor za infuziju	Astellas	Ribomustin	100mg	5x100mg	IL04	SZ; SZK		1,315.09 €
L01AX03	temozolomid	kapsula, tvrda			5mg		IL05	RS; SZ		
L01AX03	temozolomid	kapsula, tvrda			20mg		IL05	RS; SZ		
L01AX03	temozolomid	kapsula, tvrda			100mg		IL05	RS; SZ		
L01AX03	temozolomid	kapsula, tvrda			250mg		IL05	RS; SZ		
L01AX03	temozolomid	kapsula			140mg		IL05	RS; SZ		
L01AX03	temozolomid	kapsula			180mg		IL05	RS; SZ		
L01AX04	dakarbazin	prašak za rastvor za injekciju/infuziju	Lipomed AG	Dacin	100mg	10x100mg		SZ		133.28 €
L01AX04	dakarbazin	prašak za rastvor za injekciju/infuziju			200mg			SZ		
L01B	ANTIMETABOLITI									
L01BA01	metotreksat	tableta			2.5mg		IL06	RS; SZ		
L01BA01	metotreksat	tableta			5mg		IL06	RS; SZ		
L01BA01	metotreksat	ampula			10mg/ml		IL06	Z; SZ		
L01BA01	metotreksat	ampula			50mg/2ml		IL06	Z; SZ		
L01BA04	pemetreksed	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju			500mg		IL07	SZK		
L01BB02	merkaptopurin	tableta			50mg		IL02	RS; SZ		
L01BB03	tiogvanin	tableta			40mg		IL02	RS; SZ		
L01BB04	kladribin	rastvor za injekciju			10mg/5ml		IL08	SZ		
L01BB05	fludarabin	film tableta	Bayer Pharma AG	Fludara	10mg	20x10mg	IL09	RS; SZ		478.79 €
L01BB05	fludarabin	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju	Ebewe Pharma	Fludarabin Ebewe	50mg/2ml	1x(50mg/2ml)	IL09	SZ		54.08 €
L01BC01	citarabin	ampula			500mg/10ml			SZ		
L01BC02	fluorouracil	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju			250mg/5ml			SZ		
L01BC02	fluorouracil	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju			500mg/10ml			SZ		
L01BC02	fluorouracil	koncentrat za rastvor za injekciju/infuziju			1000mg/20ml			SZ		
L01BC05	gemcitabin	prašak za rastvor za infuziju	Ebewe Pharma	Gemcitabin Ebewe	200mg/20ml	1x20ml	IL10	SZ		3.95 €
L01BC05	gemcitabin	prašak za rastvor za infuziju	Ebewe Pharma	Gemcitabin Ebewe	1.000mg/100ml	1x100ml	IL10	SZ		11.08 €
L01BC06	kapecitabin	film tableta	Krka	Ecansya	150mg	60x150mg	IL11	RS; SZ		14.95 €
L01BC06	kapecitabin	film tableta			300mg		IL11	RS; SZ		
L01BC06	kapecitabin	film tableta	Teva	Kapecitabin Teva	500mg	120x500mg	IL11	RS; SZ		90.13 €
L01BC06	kapecitabin	film tableta	Krka	Ecansya	500mg	120x500mg	IL11	RS; SZ		90.13 €
L01BC07	azacitidin	prašak za suspenziju za injekciju	Baxter Oncology	Vidaza	100mg	1x100mg	IL14	SZK		315.57 €
L01C	PODOFILINSKI DERIVATI I BILJNI ALKALOIDI									
L01CA01	vinblastin	prašak za injekcije			10mg			SZ		
L01CA02	vinkristin	rastvor za injekciju/infuziju			1mg/ml			SZ		
L01CA04	vinorelbin	koncentrat za rastvor za infuziju			10mg/1ml		IL11/1	SZ		
L01CB01	etopozid	kapsula			50mg		IL12	RS; SZ		
L01CB01	etopozid	koncentrat za rastvor za infuziju	Ebewe Pharma	Etoposid	100mg/5ml	1x(100mg/5ml)	IL12	SZ		5.74 €
L01CD01	paklitaksel	koncentrat za rastvor za infuziju	Vianex	Pataxel	30mg/5ml	1x(30mg/5ml)	IL13	SZ		22.22 €
L01CD01	paklitaksel	koncentrat za rastvor za infuziju	Vianex	Pataxel	100mg/16.7ml	1x100mg/16.7ml	IL13	SZ		70.37 €
L01CD02	docetaksel	koncentrat za rastvor za infuziju			20mg/0.5ml		IL13	SZ		
L01CD02	docetaksel	koncentrat za rastvor za infuziju			20mg/ml		IL13	SZ		
L01CD02	docetaksel	koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju	Ebewe Pharma	Docetaxel	20mg/2ml	1x(20mg/2ml)	IL13	SZ		17.25 €
L01CD02	docetaksel	koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju	Ebewe Pharma	Docetaxel	80mg/8ml	1x(80mg/8ml)	IL13	SZ		64.42 €
L01CD02	docetaksel	koncentrat za rastvor za infuziju			80mg/4ml		IL13	SZ		
L01CD04	cabazitaksel	koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju	Sanofi Aventis	Jevtana	60mg/1.5ml	1x(60mg/1.5ml)	IL70	SZK		3,922.67 €
L01D	CITOSTATSKI ANTIBIOTICI									
L01DB01	doksorubicin	koncentrat za rastvor za infuziju	Ebewe Pharma	Doxorubicin Ebewe	10mg/5ml	1x(10mg/5ml)		SZ		4.54 €
L01DB01	doksorubicin	koncentrat za rastvor za infuziju	Ebewe Pharma	Doxorubicin Ebewe	50mg/25ml	1x(50mg/25ml)		SZ		11.88 €
L01DB02	daunorubicin	prašak za infuzije			20mg			SZ		
L01DB03	epirubicin	liofilizat za rastvor za infuziju			10mg			SZ		
L01DB07	mitoksantron	koncentrat za rastvor za infuziju			10mg/5ml		IL16	SZ		
L01DB07	mitoksantron	koncentrat za rastvor za infuziju			20mg/10ml		IL16	SZ		
L01DC01	bleomicin	prašak za rastvor za inj./inf.			15mg		IL17	SZ		
L01X	OSTALI CITOSTATICI									

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
L01XA01	cisplatin	koncentrat za rastvor za infuziju	Ebewe Pharma	Cisplatin Ebewe	50mg/100ml (100ml)	1x(50mg/100ml)		SZ		10.46 €
L01XA01	cisplatin	koncentrat za rastvor za infuziju	Sindan-Pharma	Sinplatin	50mg/50ml (50ml)	1x(50mg/50ml)		SZ		9.82 €
L01XA01	cisplatin	koncentrat za rastvor za infuziju			10mg/20ml			SZ		
L01XA01	cisplatin	koncentrat za rastvor za infuziju			25mg/50ml			SZ		
L01XA02	karboplatin	koncentrat za rastvor za infuzije	Sindan-Pharma	Carboplasin	150mg/15ml (10mg/ml)	1x(150mg/15ml)		SZ		17.84 €
L01XA02	karboplatin	koncentrat za rastvor za infuzije			450mg/45ml (10mg/ml)			SZ		
L01XA03	oksaliplatin	koncentrat za rastvor za infuziju	Ebewe Pharma	Oxaliplatin Ebewe	50mg/10ml	1x(50mg/10ml)	IL18	SZ		5.97 €
L01XA03	oksaliplatin	koncentrat za rastvor za infuziju	Ebewe Pharma	Oxaliplatin Ebewe	100mg/20ml	1x(100mg/20ml)	IL18	SZ		7.96 €
L01XC02	rituksimab - biološki lijek	koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Mabthera	100mg/10ml	2x(100mg/10ml)	IL19	SZK		427.76 €
L01XC02	rituksimab - biološki lijek	koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Mabthera	500mg/50ml	1x(500mg/50ml)	IL19	SZK		1,056.14 €
L01XC02	rituksimab - biološki lijek	rastvor za injekciju	Roche	Mabthera	1400mg/11.7ml	1x(1400mg/11.7ml)	IL19/1	SZK		1,599.09 €*
L01XC03	trastuzumab - biološki lijek	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Herceptin	150mg	1x150mg	IL20	SZK		508.45 €
L01XC03	trastuzumab - biološki lijek	rastvor za injekciju	Roche	Herceptin	600mg/5ml	1x(600mg/5ml)	IL20	SZK		1,484.65 €
L01XC06	cetuksimab - biološki lijek	rastvor za infuziju	Merck	Erbıtux	5mg/ml	1x20ml	IL21	SZK		165.45 €
L01XC07	bevacizumab - biološki lijek	koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Avastin	25mg/ml	1x(400mg/16ml)	IL22	SZK		1,055.07 €
L01XC07	bevacizumab - biološki lijek	koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Avastin	25mg/ml	1x(100mg/4ml)	IL22	SZK		263.44 €
L01XC13	pertuzumab	koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Perjeta	420mg/14ml	1x(420mg/14ml)	IL23	SZK		2,637.17 €*
L01XC14	trastuzumab emtanzin	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Kadcyla	100mg	1x100mg	IL32	SZK		1,634.27 €*
L01XC14	trastuzumab emtanzin	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Kadcyla	160mg	1x160mg	IL32	SZK		2,613.08 €*
L01XC18	pembrolizumab - biološki lijek	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	Schering-Plough Labo NV	Keytruda	50mg	1x50mg	IL24	SZK		1,740.20 €*
L01XE01	imatinib	kapsula	Novartis Pharma	Glivec	100mg	120x100mg	IL25	RK; SZK		1,900.00 €*
L01XE01	imatinib	film tableta	Pliva	Imatinib Teva	100mg	120x100mg	IL25	RK; SZK		975.41 €
L01XE02	gefitinib	tableta	Astra Zeneca	Iressa	250mg	30x250mg	IL27	RK; SZK		1,857.27 €*
L01XE03	erlotinib	film tableta	Roche	Tarceva	150mg	30x150mg	IL28	RK; SZK		1,641.94 €
L01XE04	sunitinib	kapsula tvrda	Pfizer	Sutent	12.5mg	28x12.5mg	IL29	RK; SZK	34.380 €	962.54 €
L01XE04	sunitinib	kapsula tvrda	Pfizer	Sutent	25mg	28x25mg	IL29	RK; SZK	68.530 €	1,918.93 €
L01XE04	sunitinib	kapsula tvrda	Pfizer	Sutent	50mg	28x50mg	IL29	RK; SZK	136.550 €	3,824.64 €
L01XE07	lapatinib	film tableta	Novartis Pharma	Tyverb	250mg	70x250mg	IL30	RK; SZK		1,067.11 €*
L01XE08	nilotinib	kapsula tvrda	Novartis Pharma	Tasigna	150mg	112x150mg	IL31	RK; SZK		2,515.86 €*
L01XE08	nilotinib	kapsula tvrda	Novartis Pharma	Tasigna	200mg	112x200mg	IL31	RK; SZK		3,327.71 €*
L01XE10	everolimus	tableta	Novartis Pharma	Afinitor	10mg	30x10mg	IL71	RK; SZK		3,233.91 €*
L01XE11	pazopanib	film tableta	Novartis Pharma	Votrient	400mg	60x400mg	IL73	RK; SZK		2,718.47 €*
L01XE15	vemurafenib	tableta	Roche	Zelboraf	240mg	56x240mg	IL33	RK; SZK		2,087.97 €*
L01XE38	kobimetinib	film tableta	Roche	Cotellic	20mg	63x20mg	IL33/1	RK; SZK		4,990.45 €*
L01XX02	l- asparaginaza	prašak za injekciju			10.000 U			SZ		
L01XX05	hidroksikarbamid	kapsula			500mg			IL34	RS; SZ	
L01XX11	estramustin	kapsula tvrda	Pfizer	Estracyt	140mg	100x140mg	IL35	RS; SZ		104.48 €
L01XX14	tretinoin	kapsula			10mg			IL36	R; SZ	
L01XX19	irinotekan	koncentrat za rastvor za infuziju	Vianex	Iritec	40mg/2ml	1x(40mg/2ml)	IL37	SZ		11.84 €
L01XX19	irinotekan	koncentrat za rastvor za infuziju	Vianex	Iritec	100mg/5ml	1x(100mg/5ml)	IL37	SZ		27.10 €
L01XX19	irinotekan	koncentrat za rastvor za infuziju			500mg/25ml			IL37	SZ	
L01XX23	mitotan	tableta			500mg			IL38	RK; SZK	
L01XX32	bortezomib	prašak za rastvor za injekciju	Pliva	Bortezomib Pliva	1mg	1x5ml	IL39	SZK		91.40 €
L01XX32	bortezomib	prašak za rastvor za injekciju	Pliva	Bortezomib Pliva	3.5mg	1x5ml	IL39	SZK		470.55 €
L02	ENDOKRINOLOŠKA TERAPIJA									
L02A	HORMONI I SRODNI LJEKOVI									
L02AE03	goserelin	implantat (1 napunjeni špric)	Astra Zeneca	Zoladex	3,6mg	1x3,6mg	IL40	SZ	3.430 €	95.85 €
L02AE03	goserelin	implantat (1 napunjeni špric)	Astra Zeneca	Zoladex LA	10,8mg	1x10,8mg	IL40	SZ	3.300 €	281.97 €
L02AE04	triptorelin	prašak i rastvarač za suspenziju za injekcije sa produženim oslobađanjem; prašak za injekcije			0,1mg		IL41	SZ		
L02AE04	triptorelin	prašak i rastvarač za suspenziju za injekcije sa produženim oslobađanjem	Pharma Swiss	Diphereline 3,75	3,75mg	1x3,75mg	IL41/1	SZ	3.070 €	85.82 €
L02AE04	triptorelin	prašak i rastvarač za suspenziju za injekcije sa produženim oslobađanjem	Pharma Swiss	Diphereline 11,25	11,25mg	1x11,25mg	IL41/2	SZ	3.070 €	257.47 €
L02B	ANTAGONISTI HORMONA									
L02BA01	tamoksifen	film tableta	Astra Zeneca	Nolvadex	10mg	30x10mg	IL42	RS; SZ		3.01 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
L02BA03	fulvestrant	rastvor za injekciju	Astra Zeneca	Faslodex	250mg/5ml	2x(250mg/5ml)	IL43	SZ		530.02 €*
L02BB	ANTI - ANDROGENI									
L02BB03	bikalutamid	film tablete	Pharma Swiss	Bicadex	50mg	28x50mg	IL44	RS; SZ	0.610 €	16.99 €
L02BB04	enzalutamid	kapsula meka	Astellas	Xtandi	40mg	112x40mg	IL44/1	RK; SZK		3,154.38 €*
L02BG	INHIBITORI ENZIMA									
L02BG03	anastrozol	film tableta	Remedica Ltd	Aremed	1mg	28x1mg	IL45	RS; SZ	0.165 €	4.63 €
L02BG04	letrozol	film tableta	Pliva	Avomit	2,5mg	30x2,5mg	IL45	RS; SZ	0.223 €	6.99 €
L02BG06	eksemestan	obložena tableta	Pfizer	Aromasin	25mg	30x25mg	IL46	RS; SZ		34.28 €*
L02BX03	abirateron	tableta	Janssen Cilag S.p.A.	Zytiga	250mg	120x250mg	IL47	RK; SZK		3,134.64 €*
L03	IMUNOSTIMULATORI									
L03A	CITOKINI I IMUNOMODULATORI									
L03AA02	filgrastim - biološki lijek	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	Roche	Neopogen	48 MU (0,48mg)/0,5ml (0,5ml)	1x0,5ml	IL66	SZ	32.080 €	43.99 €
L03AA02	filgrastim - biološki sličan lijek	rastvor za injekciju/infuziju u napunjenom injekcionom špricu	Sandoz	Zarzio	48 MU (0,48mg)/0,5ml (0,5ml)	1x0,5ml	IL66/1	SZ	12.390 €	17.00 €
L03AB04	interferon alfa 2a	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Roche	Roferon-A	3 MU/0,5ml	1x0,5ml	IL48	Z; SZ	9.326 €	12.17 €
L03AB07	interferon beta 1a	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Merck	Rebif	22mcg (6 MU)/0,5ml (0,5ml)	12x22mcg (6MU)/0,5ml (0,5ml)	IL49	SZK		660.59 €
L03AB07	interferon beta 1a	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Merck	Rebif	44mcg (12 MU)/0,5ml (0,5ml)	12x0,5ml	IL49	SZK		685.00 €
L03AB07	interferon beta 1a	rastvor za injekciju	Biogen Idec Denmark	Avonex	30mcg (6 MU)/0,5ml (0,5ml)	4x0,5ml	IL49	SZK		634.31 €*
L03AB08	interferon beta 1b	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Bayer Pharma AG	Betaferon	0,25mg/ml (8 MU) (1,2ml)	15x1,2ml	IL49	SZK	18.030 €	708.76 €*
L03AB11	peginterferon alfa 2a	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Roche	Pegasys	180mcg/0,5ml	1x(180mcg/0,5ml)	IL51	SZK	20.460 €	134.27 €
L03AX03	živi atenuirani bacili M. bovis-soj BCG	prašak za intravezikalni rastvor			81mg		IL52	SZ		
L03AX03	živi atenuirani bacili M. bovis-soj BCG	prašak za intravezikalni rastvor			12,5mg		IL52	SZ		
L04	IMUNOSUPRESIVI									
L04AA06	mikofenolna kiselina	kapsula, tvrda	Roche	CellCept	250mg	100x250mg		RS; SZ	3.860 €	31.04 €
L04AA06	mikofenolna kiselina	film tableta	Roche	CellCept	500mg	50x500mg		RS; SZ	3.460 €	31.04 €
L04AA06	mikofenolna kiselina	gastrorezistentna tableta	Novartis Pharma	Myfortic	360mg	120x360mg		RS; SZ		214.71 €
L04AA06	mikofenolna kiselina-generička paralela	kapsula, tvrda			250mg			RS; SZ		
L04AA06	mikofenolna kiselina-generička paralela	film tableta			500mg			RS; SZ		
L04AA27	fingolimod	kapsula, tvrda	Novartis Pharma	Gilenya	0,5mg	28x0,5mg	IL58	RK; SZK		1,688.00 €*
L04AA33	vedolizumab - biološki lijek	prašak za infuzije	Takeda Italija	Entyvio	300mg	1x300mg	IL59	SZK		2,071.04 €*
L04AB01	etanercept - biološki lijek	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	Wyeth Pharmaceuticals	Enbrel	25mg	4x25mg	IL60	SZK	12.130 €	363.93 €
L04AB01	etanercept - biološki lijek	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Wyeth Pharmaceuticals	Enbrel	50mg/1ml	4x(50mg/1ml)	IL60	RK; SZK	22.540 €	676.26 €
L04AB02	infliksimab - biološki lijek	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	Janssen Biologics	Remicade	100mg	1x100mg	IL61	SZK	18.090 €	482.35 €*
L04AB02	infliksimab - biološki sličan lijek	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju			100mg		IL61	SZK		
L04AB04	adalimumab - biološki lijek	rastvor za injekciju	AbbVie Biotechnology Deutschland GmbH	Humira	40mg/0,8ml	2x(40mg/0,8ml)	IL62/1	RK; SZK		835.51 €*
L04AB04	adalimumab - biološki lijek	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	AbbVie Biotechnology Deutschland GmbH	Humira	40mg/0,4ml	2x(40mg/0,4ml)	IL62	RK; SZK		835.51 €*
L04AB04	adalimumab - biološki lijek	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	AbbVie Biotechnology Deutschland GmbH	Humira	40mg/0,8ml	2x(40mg/0,8ml)	IL62	SZK		835.51 €*
L04AB06	golimumab	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	Janssen Biologics	Simponi	50mg	1x0,5ml	IL63/2	RK; SZK	27.990 €	843.21 €*
L04AB06	golimumab	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	Janssen Biologics	Simponi	50mg	1x0,5ml	IL63/2	SZK	27.990 €	843.21 €*
L04AC07	tocilizumab - biološki lijek	koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Actemra	80mg/4ml	1x(80mg/4ml)	IL63/1	SZK		123.05 €
L04AC07	tocilizumab - biološki lijek	koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Actemra	200mg/10ml	1x(200mg/10ml)	IL63/1	SZK		307.57 €
L04AC07	tocilizumab - biološki lijek	koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Actemra	400mg/20ml	1x(400mg/20ml)	IL63/1	SZK		621.12 €
L04AC07	tocilizumab - biološki lijek	koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	RoActemra	162mg/0,9ml	4x0,9ml	IL63/3	SZK		823.77 €
L04AD01	ciklosporin A	oralni rastvor	Novartis Pharma	Sandimmun Neoral	5.000mg/50ml	1x(5.000mg/50ml)		RS; SZ		102.28 €
L04AD01	ciklosporin A	kapsula, meka	Novartis Pharma	Sandimmun Neoral	25mg	50x25mg		RS; SZ		26.84 €
L04AD01	ciklosporin A	kapsula meka	Novartis Pharma	Sandimmun Neoral	50mg	50x50mg		RS; SZ		54.18 €
L04AD01	ciklosporin A	kapsula meka	Novartis Pharma	Sandimmun Neoral	100mg	50x100mg		RS; SZ		102.14 €
L04AD01	ciklosporin A	koncentrat za infuzije			250mg/5ml			SZ		

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
L04AD01	ciklosporin A - generička paralela	oralni rastvor			5.000mg/50ml			RS; SZ		
L04AD01	ciklosporin A - generička paralela	kapsula, meka			25mg			RS; SZ		
L04AD01	ciklosporin A - generička paralela	kapsula meka			50mg			RS; SZ		
L04AD01	ciklosporin A - generička paralela	kapsula meka			100mg			RS; SZ		
L04AD02	takrolimus	kapsula, tvrda	Astellas	Prograf	0,5mg	30x0,5mg		RS; SZ		14.51 €
L04AD02	takrolimus	kapsula, tvrda	Astellas	Prograf	1mg	60x1mg		RS; SZ		53.15 €
L04AD02	takrolimus	kapsula, tvrda	Astellas	Prograf	5mg	30x5mg		RS; SZ		123.21 €
L04AD02	takrolimus	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	Astellas	Advagraf	0,5mg	30x0,5mg		RS; SZ		20.72 €
L04AD02	takrolimus	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	Astellas	Advagraf	1mg	60x1mg		RS; SZ		75.94 €
L04AD02	takrolimus	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	Astellas	Advagraf	3mg	30x3mg		RS; SZ		120.17 €
L04AD02	takrolimus	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	Astellas	Advagraf	5mg	30x5mg		RS; SZ		176.02 €
L04AD02	takrolimus - generička paralela	kapsula tvrda			0,5mg			RS; SZ		
L04AD02	takrolimus - generička paralela	kapsula tvrda			1mg			RS; SZ		
L04AD02	takrolimus - generička paralela	kapsula tvrda			5mg			RS; SZ		
L04AX01	azatioprin	tableta			50mg			RS; SZ		
L04AX02	talidomid	obložena tableta			100mg		IL65	RS; SZ		
M	LJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOŠTANO-MIŠIČNOG SISTEMA									
M01	ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LJEKOVI									
M01A	NESTEROIDNI ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LJEKOVI									
M01AB05	diklofenak	rastvor za injekciju	Hemofarm	Diklofenak	75mg/3ml	5x(75mg/3ml)		Z; SZ		0.50 €
M01AB05	diklofenak	tableta, kapsula	Hemofarm	Rapten Duo	75mg	30x75mg		R; SZ		0.96 €
M01AB05	diklofenak	tableta sa produženim oslobađanjem	Hemofarm	Rapten Forte	100mg	20x100mg		R; SZ		0.44 €
M01AB05	diklofenak	supozitorija			50mg			R; SZ		
M01AB15	ketorolak	rastvor za injekciju	Hemofarm	Zodol	30mg/ml	5x1ml		Z; SZ		2.96 €
M01AB16	aceklofenak	film tableta	Gedeon Richter	Añamil	100mg	20x100mg		R; SZ		3.03 €
M01AC01	piroksikam	kapsula			20mg			R; SZ		
M01AE01	ibuprofen	oralna suspenzija	Abbvie	Brufen	100mg/5ml (100ml)	1x100ml		R; SZ		1.01 €
M01AE01	ibuprofen	film tableta	Hemofarm	Ibuprofen	400mg	30x400mg		R; SZ		1.27 €
M01AE01	ibuprofen	film tableta	Pharma Swiss	Rapidol	600mg	30x600mg		R; SZ	0.070 €	0.98 €
M01AE02	naproksen	film tableta	Hemofarm	Naproksen	375mg	20x375mg		R; SZ		1.24 €
M01C	SPECIFIČNA ANTIREUMATSKA SREDSTVA									
M01CC01	penicilamin	tableta			250mg			RS; SZ		
M03	MIŠIČNI RELAKSANSI									
M03A	MIORELAKSANSI SA PERIFERNIM DJELOVANJEM									
M03AB01	suksametonijum	rastvor za injekciju/infuziju			100mg/2ml			SZ		
M03AC01	pankuronijum bromid	injekcija			4mg/2ml			SZ		
M03AC03	vekuronijum bromid	prašak za injekciju			4mg			SZ		
M03AC09	rokuronijum bromid	rastvor za injekciju	Organon	Esmeron	50mg/5ml	10x(50mg/5ml)		SZ		40.34 €
M03AC11	cisatrakurijum	rastvor za injekciju/infuziju	Glaxo Smith Kiine	Nimbex	2mg/ml	5x5ml		SZ		16.27 €
M03AX01	klostridium botulinum tip A toksin	prašak za injekciju			500 U		IM01	SZK		
M04	LJEKOVI ZA LIJEČENJE GIHTA									
M04AA01	alopurinol	tableta	Hemofarm	Alopinolol	100mg	40x100mg		RS; SZ		0.78 €
M04AA01	alopurinol	tableta	Belupo	Alopinolol Belupo	100mg	100x100mg		RS; SZ		1.97 €
M05	LJEKOVI U TERAPIJI OBOLJENJA KOSTIJU									
M05B	LJEKOVI KOJI DJELUJU NA STRUKTURU KOSTI I MINERALIZACIJU									
M05BA	BISFOSFANATI									
M05BA04	alendronat	tableta; film tableta			70mg		IM03	RS; SZ		
M05BA06	ibandronska kiselina	film tableta			50mg		IM04	RS; SZ		
M05BA06	ibandronska kiselina	film tableta	Pliva	Bonedra	150mg	1x150mg	IM03/1	RS; SZ	0.099 €	2.99 €
M05BA06	ibandronska kiselina	koncentrat za rastvor za infuziju			2mg/2ml		IM05	SZ		
M05BA06	ibandronska kiselina	rastvor za injekciju	Roche	Bonviva	3mg/3ml	1x(3mg/3ml)	IM05/1	SZ	76.470 €	25.49 €
M05BA08	zoledronska kiselina	koncentrat za rastvor za infuziju	Novartis Pharma	Zometa	4mg/5ml	1x(4mg/5ml)	IM06	SZ		34.98 €
M05BB03	alendronska kiselina, holkalciferol	tableta	Merck Sharp & Dohme BV	Fosavance	70mg + 5.600 U	4x(70mg + 5.600 U)	IM03	RS; SZ	0.440 €	9.83 €
M05BX04	denosumab	rastvor za injekciju	Amgen	Prolia	60mg/ml	1x1ml	IM07	SZK	0.880 €	159.56 €
N	LJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM									

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
N01	ANESTETICI									
N01A	OPŠTI ANESTETICI									
N01AB08	sevofluran	para za inhalaciju, tečnost (100%)	Aesica Queenborough Limited	Sevorane	250ml	1x250ml		SZ		151.23 €
N01AF03	tiopental natrijum	prašak za rastvor inf/inj			500mg			SZ		
N01AF03	tiopental natrijum	prašak za rastvor inf/inj			1.000mg			SZ		
N01AH01	fentanil §	rastvor za injekciju			0,1mg/2ml			SZ		
N01AH01	fentanil §	rastvor za injekciju			0,5mg/10ml			SZ		
N01AH02	alfentanil §	rastvor za injekciju			1mg/2ml			SZ		
N01AH02	alfentanil §	rastvor za injekciju			5mg/10ml			SZ		
N01AH06	remifentanil §	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	Glaxo Smith Kline	Ultiva	1mg/3ml	5x(1mg/3ml)		SZ		17.28 €
N01AH06	remifentanil §	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	Glaxo Smith Kline	Ultiva	2mg/5ml	5x(2mg/5ml)		SZ		36.86 €
N01AX03	ketamin	rastvor za injekciju			50mg/10ml			SZ		
N01AX07	etomidat	rastvor za injekciju			20mg/10ml			SZ		
N01AX10	propofol	emulzija za injekciju/infuziju	Astra Zeneca	Diprivan	10mg/ml (20ml)	5x20ml		SZ		8.90 €
N01B	LOKALNI ANESTETICI									
N01BB01	bupivakain	rastvor za injekciju	Recipharm Monts	Marcaïne 0,5%	5mg/ml (20ml)	5x20ml		SZ		11.87 €
N01BB01	bupivakain	rastvor za injekciju	Cenexi	Marcaïne Spinal 0,5%	5mg/ml (4ml)	5x4ml		SZ		21.18 €
N01BB02	lidokain	rastvor za injekciju			10mg/ml (3,5ml)			Z; SZ		
N01BB02	lidokain	rastvor za injekciju	Galenika	Lidokain Hlorid 2%	20mg/ml (2ml)	50x2ml		Z; SZ		7.00 €
N01BB02	lidokain	sprej			100mg/ml (50ml)			SZ		
N01BB02	lidokain	gel			2% (30g)			SZ		
N01BB52	lidokain, adrenalín	rastvor za injekciju			(40mg + 0,025mg)/2ml			Z; SZ		
N02	ANALGETICI									
N02A	OPIOIDI									
N02AA01	morfin §	oralni rastvor	L. Molteni & C. DEI F. LLI	Oramorph	10mg/5ml	20x(10mg/5ml)	IN11	RS; SZ	1.660 €	9.94 €
N02AA01	morfin §	oralni rastvor	L. Molteni & C. DEI F. LLI	Oramorph	30mg/5ml	20x(30mg/5ml)	IN11	RS; SZ	1.660 €	9.94 €
N02AA01	morfin §	tableta			10mg		IN11	RS; SZ		
N02AA01	morfin §	tableta			30mg		IN11	RS; SZ		
N02AA01	morfin §	tableta			60mg		IN11	RS; SZ		
N02AA01	morfin §	tableta			100mg		IN11	RS; SZ		
N02AA01	morfin §	rastvor za injekciju			20mg/ml			SZ		
N02AB02	petidin §	rastvor za injekciju			100mg/2ml			SZ		
N02AB03	fentanil §	transdermalni flasteri			25mcg/h		IN01	RS; SZ		
N02AB03	fentanil §	transdermalni flasteri			50mcg/h		IN01	RS; SZ		
N02AB03	fentanil §	transdermalni flasteri			100mcg/h		IN01	RS; SZ		
N02AX02	tramadol §	tableta sa produženim oslobađanjem	Hemofarm	Trodon	100mg	10x100mg	IN02	RS; SZ	0.180 €	0.60 €
N02AX02	tramadol §	tableta sa produženim oslobađanjem			200mg		IN02	RS; SZ		
N02AX02	tramadol §	rastvor za injekciju	Krka	Tramadol Krka	50mg/ml	5x(50mg/ml)	IN02	SZ	1.225 €	1.02 €
N02AX02	tramadol §	rastvor za injekciju	Krka	Tramadol Krka	100mg/2ml	5x(100mg/ml)	IN02	SZ	0.828 €	1.38 €
N02B	OSTALI ANALGETICI I ANTIPIRETIČKI									
N02BA01	acetil salicilna kiselina	tableta	Pliva	Andol	300mg	20x300mg		SZ	0.455 €	0.91 €
N02BA01	acetil salicilna kiselina	tableta			500mg			SZ		
N02BB02	metamizol	rastvor za injekciju	Alkaloid	Analgin	2.500mg/5ml	50x(2.500mg/5ml)		Z; SZ		10.50 €
N02BE01	paracetamol	sirup	Hemofarm	Febričet	120mg/5ml (100ml)	1x100ml		R; SZ		0.95 €
N02BE01	paracetamol	tableta	Bosna Lijek	Paracetamol	500mg	20x500mg		SZ	0.270 €	0.90 €
N02BE01	paracetamol	supozitorija			80mg			SZ		
N02BE01	paracetamol	supozitorija			150mg			SZ		
N02BE01	paracetamol	rastvor za infuziju	Pharma Swiss	Paracetamol PharmaSwiss	10mg/100ml	10x100ml	IN12	SZ	4.010 €	13.37 €
N03	LJEKOVI ZA LJEČENJE EPILEPSIJE									
N03A	ANTIPILEPTICI									
N03AA02	fenobarbiton §	tableta			15mg			RS; SZ		
N03AA02	fenobarbiton §	tableta	Hemofarm	Phenobarbiton	100mg	30x100mg		RS; SZ	0.044 €	1.32 €
N03AA02	fenobarbiton §	prašak i rastvarac za rastvor za injekciju			220mg/2ml			SZ		
N03AE01	klonazepam	tableta			2mg			RS; SZ		
N03AF01	karbamazepin	tableta	Hemofarm	Karbapin	200mg	50x200mg		RS; SZ		1.76 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
N03AF01	karbamazepin	tableta sa modifikovanim oslobađanjem			400mg			RS; SZ		
N03AG01	valproinska kiselina	sirup	Sanofi Aventis	Eftil	50mg/ml (150ml)	1x150ml		RS; SZ		3.22 €
N03AG01	valproinska kiselina sa natrijum valproatom	tableta sa produženim oslobađanjem	Sanofi Aventis	Eftil	145mg + 333mg	30x(145mg + 333mg)		RS; SZ		3.23 €
N03AX09	lamotrigin - originator	tableta	Glaxo Smith Kline	Lamictal	25mg	30x25mg	IN13	RS; SZ		1.16 €
N03AX09	lamotrigin - originator	tableta	Glaxo Smith Kline	Lamictal	50mg	30x50mg	IN13	RS; SZ		2.48 €
N03AX09	lamotrigin - originator	tableta	Glaxo Smith Kline	Lamictal	100mg	30x100mg	IN13	RS; SZ		4.57 €
N03AX09	lamotrigin - generička paralela	tableta			25mg		IN13	RS; SZ		
N03AX09	lamotrigin - generička paralela	tableta			50mg		IN13	RS; SZ		
N03AX09	lamotrigin - generička paralela	tableta			100mg		IN13	RS; SZ		
N03AX11	topiram - originator	film tableta			25mg		IN14	RS; SZ		
N03AX11	topiram - originator	film tableta			50mg		IN14	RS; SZ		
N03AX11	topiram - originator	film tableta			100mg		IN14	RS; SZ		
N03AX11	topiram - generička paralela	film tableta	Pliva	Epiramat	25mg	60x25mg	IN14	RS; SZ	0.714 €	3.57 €
N03AX11	topiram - generička paralela	film tableta	Pliva	Epiramat	50mg	60x50mg	IN14	RS; SZ	0.905 €	9.05 €
N03AX11	topiram - generička paralela	film tableta	Pliva	Epiramat	100mg	60x100mg	IN14	RS; SZ	0.690 €	13.79 €
N03AX11	topiram - generička paralela	film tableta			200mg		IN14	RS; SZ		
N03AX12	gabapentin - originator	kapsula tvrda			100mg		IN15	RS; SZ		
N03AX12	gabapentin - originator	kapsula tvrda	Pfizer	Neurontin	300mg	50x300mg	IN15	RS; SZ	0.570 €	4.78 €
N03AX12	gabapentin - generička paralela	kapsula tvrda			100mg		IN15	RS; SZ		
N03AX12	gabapentin - generička paralela	kapsula tvrda			300mg		IN15	RS; SZ		
N03AX14	levetiracetam - originator	oralni rastvor			100mg/ml (300ml)		IN14	RS; SZ		
N03AX14	levetiracetam - originator	film tableta	UCB Pharma	Keppra	250mg	60x250mg	IN14	RS; SZ		7.48 €
N03AX14	levetiracetam - originator	film tableta	UCB Pharma	Keppra	500mg	60x500mg	IN14	RS; SZ		13.70 €
N03AX14	levetiracetam - originator	film tableta	UCB Pharma	Keppra	1000mg	60x1000mg	IN14	RS; SZ		26.48 €
N03AX14	levetiracetam - generička paralela	film tableta			250mg		IN14	RS; SZ		
N03AX14	levetiracetam - generička paralela	film tableta	Pharma Swiss	Epilev	500mg	60x500mg	IN14	RS; SZ	0.530 €	10.54 €
N03AX14	levetiracetam - generička paralela	film tableta	Pharma Swiss	Epilev	1000mg	60x1000mg	IN14	RS; SZ	0.510 €	20.37 €
N03AX16	pregabalin - originator	kapsula, tvrda	Pfizer	Lyrica	75mg	56x75mg	IN15	RS; SZ	0.850 €	11.89 €
N03AX16	pregabalin - originator	kapsula, tvrda	Pfizer	Lyrica	150mg	56x150mg	IN15	RS; SZ	0.830 €	23.20 €
N03AX16	pregabalin - originator	kapsula, tvrda	Pfizer	Lyrica	300mg	56x300mg	IN15	RS; SZ	0.660 €	37.07 €
N04	LJEKOVI ZA LJEČENJE PARKINSONOVE BOLESTI									
N04A	ANTHOLINERGIČKI LJEKOVI									
N04AA01	trihexifenidil §	tableta			2mg			RS; SZ		
N04AA01	trihexifenidil §	tableta			5mg			RS; SZ		
N04AA02	biperiden	tableta	Alkaloid	Mendilex	2mg	50x2mg		RS; SZ		1.14 €
N04AA02	biperiden	ampula; injekcija			5mg/ml			Z; SZ		
N04B	DOPAMINERGIČKI LJEKOVI									
N04BA02	levodopa, benzerazid	tableta	Roche	Madopar	200mg + 50mg	100x(200mg + 50mg)	IN16	RS; SZ	0.620 €	12.50 €
N04BC04	ropinirol	tableta sa produženim oslobađanjem	Glaxo Smith Kline	Requip Modutab	2mg	28x2mg	IN16	RS; SZ		5.45 €
N04BC04	ropinirol	tableta sa produženim oslobađanjem	Glaxo Smith Kline	Requip Modutab	4mg	28x4mg	IN16	RS; SZ		10.61 €
N04BC04	ropinirol	tableta sa produženim oslobađanjem	Glaxo Smith Kline	Requip Modutab	8mg	28x8mg	IN16	RS; SZ		18.47 €
N04BC05	pramipeksol	tableta	Boehringer Ingelheim	Mirapexin	0.25mg	300x0.25mg	IN03	RS; SZ		4.48 €
N04BC05	pramipeksol	tableta	Boehringer Ingelheim	Mirapexin	1mg	30x1mg	IN03	RS; SZ		15.64 €
N05	PSIHOLEPTICI									
N05A	ANTIPSIHOTICI									
N05AA01	hlorpromazin	film tableta			25mg			RS; SZ		
N05AA01	hlorpromazin	ampula			25mg/1ml			Z; SZ		
N05AA01	hlorpromazin	ampula			50mg/2ml			Z; SZ		
N05AA02	levomepromazin	tableta			25mg			RS; SZ		
N05AA02	levomepromazin	tableta			100mg			RS; SZ		
N05AB02	flufenazin	obložena tableta	Krka	Moditen	1mg	25x1mg		RS; SZ	0.343 €	0.86 €
N05AB02	flufenazin	obložena tableta	Krka	Moditen	2.5mg	100x2.5mg		RS; SZ	0.282 €	7.04 €
N05AB02	flufenazin	obložena tableta	Krka	Moditen	5mg	100x5mg		RS; SZ	0.169 €	8.44 €
N05AB02	flufenazin	rastvor za injekciju	Krka	Moditen Depo	25mg/ml	5x1ml		Z; SZ	0.088 €	11.01 €
N05AD01	haloperidol	tableta	Zdravlje AD Leskovac	Haloperidol	2mg	25x2mg		RS; SZ	0.150 €	0.92 €
N05AD01	haloperidol	tableta	Zdravlje AD Leskovac	Haloperidol	10mg	30x10mg		RS; SZ	0.320 €	1.98 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
N05AD01	haloperidol	rastvor za injekciju			5mg/ml			Z; SZ		
N05AD01	haloperidol	rastvor za injekciju	Krka	Haldol Depo	50mg/ml	5x(50mg/ml)		Z; SZ	0.191 €	14.47 €
N05AH02	klozapin	tableta	Salutas Pharma GmbH	Clozapin Sandoz	25mg	50x25mg	IN17	RS; SZ		1.08 €
N05AH02	klozapin	tableta	Salutas Pharma GmbH	Clozapin	100mg	50x100mg	IN17	RS; SZ		2.89 €
N05AH03	olanzapin	tableta	Krka	Zalasta	5mg	28x5mg	IN18	RS; SZ	0.615 €	8.61 €
N05AH03	olanzapin	tableta	Krka	Zalasta	10mg	28x10mg	IN18	RS; SZ	0.628 €	17.58 €
N05AH04	kvetiapin	film tableta	Astra Zeneca	Seroquel	25mg	60x25mg	IN18	RS; SZ	2.760 €	10.33 €
N05AH04	kvetiapin	film tableta	Astra Zeneca	Seroquel	100mg	60x100mg	IN18	RS; SZ	1.330 €	19.93 €
N05AH04	kvetiapin	film tableta	Astra Zeneca	Seroquel	200mg	60x200mg	IN18	RS; SZ	1.040 €	31.17 €
N05AL01	sulpirid	kapsula tvrda	Alkaloid	Eglonyl	50mg	30x50mg		RS; SZ		2.13 €
N05AL01	sulpirid	tableta	Alkaloid	Eglonyl Forte	200mg	12x200mg		RS; SZ		2.40 €
N05AL01	sulpirid	rastvor za injekciju			100mg/2ml			SZ		
N05AN01	litijum karbonat	tableta			300mg			RS; SZ		
N05AX08	risperidon	film tableta	Krka	Torendo	1mg	20x1mg	IN05	RS; SZ	0.477 €	1.91 €
N05AX08	risperidon	film tableta	Krka	Torendo	2mg	20x2mg	IN05	RS; SZ	0.250 €	2.00 €
N05AX08	risperidon	film tableta	Krka	Torendo	3mg	20x3mg	IN05	RS; SZ	0.171 €	2.06 €
N05AX08	risperidon	film tableta			4mg		IN05	RS; SZ		
N05AX08	risperidon	prašak i rastvarač za injekciju sa produženim oslobađanjem	Cilag AG	Risperlept Consta	25mg/2ml	1x(25mg/2ml)	IN06	Z; SZ		83.86 €*
N05AX08	risperidon	prašak i rastvarač za injekciju sa produženim oslobađanjem	Cilag AG	Risperlept Consta	37,5mg/2ml	1x(37,5mg/2ml)	IN06	Z; SZ		108.82 €*
N05AX08	risperidon	prašak i rastvarač za injekciju sa produženim oslobađanjem	Cilag AG	Risperlept Consta	50mg/2ml	1x(50mg/2ml)	IN06	Z; SZ		134.48 €*
N05AX13	paliperidon	suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem	Janssen Pharmaceutica	Xeplion	50mg/0,5ml	1x0,5ml	IN06	Z; SZ		174.02 €*
N05AX13	paliperidon	suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem	Janssen Pharmaceutica	Xeplion	75mg/0,75ml	1x0,75ml	IN06	Z; SZ		221.63 €*
N05AX13	paliperidon	suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem	Janssen Pharmaceutica	Xeplion	100mg/ml	1x1ml	IN06	Z; SZ		274.30 €*
N05AX13	paliperidon	suspenzija za injekciju s produženim oslobađanjem	Janssen Pharmaceutica	Xeplion	150mg/1,5ml	1x1,5ml	IN06	Z; SZ		398.65 €*
N05B	ANKSIOLITICI									
N05BA01	diazepam	mikrokizma / rektalni rastvor			5mg/2,5ml		IN07	R; Z; SZ		
N05BA01	diazepam	tableta	Hemofarm	Diazepam	2mg	30x2mg	IN07/1	R; SZ		0.47 €
N05BA01	diazepam	tableta	Hemofarm	Diazepam	5mg	30x5mg	IN07/2	RS; SZ		0.59 €
N05BA01	diazepam	tableta	Hemofarm	Diazepam	10mg	30x10mg	IN07/3	RS; SZ		0.78 €
N05BA01	diazepam	rastvor za injekciju	Alkaloid	Diazepam Alkaloid	10mg/2ml	10x2ml		Z; SZ		1.40 €
N05BA06	lorazepam	injekcija			2mg/ml			SZ		
N05BA06	lorazepam	tableta	Hemofarm	Lorazepam	1mg	30x1mg	IN07/4	RS; SZ		0.57 €
N05BA06	lorazepam	tableta	Belupo	Lorsilan	2,5mg	20x2,5mg	IN07/4	RS; SZ		0.53 €
N05BA08	bromazepam	tableta	Hemofarm	Bromazepam	1,5mg	30x1,5mg	IN07/1	R; SZ		0.40 €
N05BA08	bromazepam	tableta	Alkaloid	Lexilium	3mg	30x3mg	IN07/2	RS; SZ		0.46 €
N05BA08	bromazepam	tableta	Krka	Lexaurin	6mg	30x6mg	IN07/3	RS; SZ	0.062 €	1.11 €
N05BA08	bromazepam	tableta	Hemofarm	Bromazepam	6mg	20x6mg	IN07/3	RS; SZ		0.74 €
N05BA12	alprazolam	tableta			0,25mg		IN07/3	RS; SZ		
N05BA12	alprazolam	tableta	Krka	Helex	0,5mg	30x0,5mg	IN07/3	RS; SZ	0.031 €	0.46 €
N05BA12	alprazolam	tableta	Galenika	Ksalol	1mg	30x1mg	IN07/3	RS; SZ	0.028 €	0.85 €
N05C	HIPNOTICI I SEDATIVI									
N05CD02	nitrazepam	tableta	Bosna Lijek	Trazem	5mg	10x5mg	IN07/3	RS; SZ	0.031 €	0.31 €
N05CD08	midazolam	rastvor za injekciju			1mg/ml			SZ		
N05CD08	midazolam	rastvor za injekciju			5mg/ml			SZ		
N05CF02	zolpidem	film tableta	Lek	Sanval	5mg	20x5mg	IN07/3	RS; SZ	0.040 €	0.80 €
N05CF02	zolpidem	film tableta	Lek	Sanval	10mg	20x10mg	IN07/3	RS; SZ	0.050 €	1.00 €
N06	PSIHOANALEPTICI									
N06A	ANTIDEPRESIVI									
N06AA04	klomipramin	obložena tableta			25mg		IN07/3	RS; SZ		
N06AA09	amitriptilin	film tableta			10mg		IN07/3	RS; SZ		
N06AA09	amitriptilin	film tableta			25mg		IN07/3	RS; SZ		
N06AA21	maprotilin	film tableta	Zdravlje AD Leskovac	Maprotilin	25mg	30x25mg	IN07/3	RS; SZ	1.320 €	0.99 €
N06AA21	maprotilin	film tableta	Zdravlje AD Leskovac	Maprotilin	50mg	30x50mg	IN07/3	RS; SZ	0.130 €	1.97 €
N06AB03	fluoksetin	tableta	Hemofarm	Flunisan	20mg	30x20mg	IN07/3	RS; SZ		0.78 €
N06AB05	paroksetin	film tableta	Glaxo Smith Kline	Seroxat	20mg	30x20mg	IN07/3	RS; SZ		2.14 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
N06AB06	sertralin	film tableta	Pfizer - Haupt Pharma	Zoloft	50mg	28x50mg	IN07/3	RS; SZ	0.140 €	3.82 €
N06AB06	sertralin	film tableta	Pfizer - Haupt Pharma	Zoloft	100mg	28x100mg	IN07/3	RS; SZ	0.950 €	26.60 €
N06AX03	mianserin	film tableta			30mg		IN07/3	RS; SZ		
N06D	LJEKOVI ZA TERAPIJU DEMENCIJE									
N06DX01	memantin	film tableta	Alkaloid	Ymana	10mg	28x10mg	IN09	RS; SZ		5.78 €
N07	OSTALI LJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM									
N07A	PARASIMPATOMIMETICI									
N07AA01	neostigmin	rastvor za injekciju			0,5mg/ml			SZ		
N07AA02	piridostigmin	obložena tableta			60mg			RS; SZ		
N07B	LJEKOVI KOJI SE UPOTREBLJAVAJU ZA BOLESTI ZAVISNOSTI									
N07BC01	buprenorfin §	sublingvalna tableta			0,4mg		IN19	Z; SZ		
N07BC01	buprenorfin §	sublingvalna tableta	Alkaloid	Buprenorfin	2mg	7x2mg	IN19	Z; SZ		2.79 €
N07BC01	buprenorfin §	sublingvalna tableta	Alkaloid	Buprenorfin	8mg	7x8mg	IN19	Z; SZ		9.39 €
N07BC02	metadon §	oralni rastvor			10mg/ml (1.000ml)			Z; SZ		
N07X	OSTALI LJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM									
N07XX02	riluzol	film tableta	Sanofi Aventis	Rilutek	50mg	56x50mg	IN10	RS; SZ		118.70 €
P	LJEKOVI ZA LJEČENJE INFEKCIJA UZROKOVANIH PARAZITIMA									
P01	ANTIPROTOZOICI									
P01AB01	metronidazol	tablete	Galenika	Orvagil	250mg	20x250mg		R; SZ	0.400 €	1.00 €
P01AB01	metronidazol	tableta	Belupo	Medazol	400mg	20x400mg		R; SZ	0.213 €	0.85 €
P01BA01	hlorokin	tableta			250mg			RS; SZ		
P01BA02	hidroksi-hlorokin	tableta			200mg			RS; SZ		
P02	ANTHELMINTICI									
P02C	LJEKOVI PROTIV NEMATODA									
P02CA01	mebendazol	oralna suspenzija			100mg/5ml (30ml)			R; SZ		
P02CA01	mebendazol	tableta za žvakanje			100mg			R; SZ		
P02CA03	albendazol	tableta			400mg		IP01	RS; SZ		
P03	LJEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA, SKABICIDI, INSEKTICIDI									
P03A	LJEKOVI PROTIV EKTOPARAZITA I SKABJESA									
P03AX01	benzil benzoat	emulzija			25%			R; SZ		
R	LJEKOVI ZA LJEČENJE BOLESTI RESPIRATORNOG SISTEMA									
R03	LJEKOVI KOJI SE PRIMJENJUJU U OPSTRUKTIVNOJ PLUĆNOJ BOLESTI									
R03A	ADRENERGICI, INHALACIONI									
R03AC	SELEKTIVNI AGONISTI BETA-2-ADRENORECEPTORA									
R03AC02	salbutamol	rastvor za inhalaciju			5mg/ml			R; SZ		
R03AC02	salbutamol	suspencija za inhalaciju pod pritiskom	Glaxo Smith Kline	Ventolin	0,1mg/dozi (200 doza)	1x200 doza		R; SZ		3.00 €
R03AC12	salmeterol	suspencija za inhalaciju pod pritiskom	Glaxo Smith Kline	Serevent inhaler CFC-Free	25mcg/dozi (120 doza)	1x120 doza	IR01	RS; SZ		16.11 €
R03AK	ADRENERGICI I DRUGI LJEKOVI ZA OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI U KOMBINACIJI									
R03AK03	fenoterol, ipratropijum bromid	rastvor za raspršivanje	Boehringer Ingelheim	Berodual	(0,5mg + 0,25mg)/ml (20ml)	1x20ml	IR01	RS; SZ		3.47 €
R03AK03	fenoterol, ipratropijum bromid	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	Boehringer Ingelheim	Berodual N	(0,05mg + 0,021mg)/dozi (200 doza)	200x(0,05mg+0,021mg)	IR01	RS; SZ		6.40 €
R03AK06	flutikazon propionat, salmeterol	prašak za inhalaciju, podijeljen	Glaxo Smith Kline	Seretide Diskus	100mcg + 50mcg	1x60 doza	IR03	RS; SZ		20.85 €
R03AK06	flutikazon propionat, salmeterol	prašak za inhalaciju, podijeljen	Glaxo Smith Kline	Seretide Diskus	250mcg + 50mcg	1x60 doza	IR03/1	RS; SZ		24.63 €
R03AK06	flutikazon propionat, salmeterol	prašak za inhalaciju, podijeljen	Glaxo Smith Kline	Seretide Diskus	500mcg + 50mcg	1x60 doza	IR03/1	RS; SZ		32.42 €
R03AK07	budesonid, formoterol	prašak za inhalaciju	Astra Zeneca	Symbicort Turbuhaler	80mcg + 4,5mcg	60x(80mcg + 4,5mcg)	IR03/2	RS; SZ	0.880 €	13.18 €
R03AK07	budesonid, formoterol	prašak za inhalaciju	Astra Zeneca	Symbicort Turbuhaler	160mcg + 4,5mcg	60x(160mcg + 4,5mcg)	IR03/1	RS; SZ	1.110 €	16.60 €
R03AK07	budesonid, formoterol	prašak za inhalaciju	Astra Zeneca	Symbicort Turbuhaler	320mcg + 9mcg	60x(320mcg + 9mcg)	IR03/1	RS; SZ	1.090 €	32.76 €
R03B	OSTALI LJEKOVI ZA OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI, INHALACIONI									
R03BA02	budesonid	suspencija za raspršivanje	Astra Zeneca	Pulmicort	0,25mg/ml (2ml)	20x2ml	IR02	SZ	0.770 €	9.64 €
R03BA02	budesonid	suspencija za raspršivanje	Astra Zeneca	Pulmicort	0,5mg/ml (2ml)	20x2ml	IR02	SZ	0.600 €	15.43 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
R03BA02	budesonid	prašak za inhalaciju	Astra Zeneca	Pulmicort Turbuhaler	400mcg/dozi (100 doza)	1x100 doza	IR09	RS; SZ		17.08 €
R03BA02	budesonid	prašak za inhalaciju	Astra Zeneca	Pulmicort Turbuhaler	200mcg/dozi (100 doza)	1x100 doza	IR09	RS; SZ	0.340 €	8.44 €
R03BA05	flutikazon	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	Glaxo Smith Kline	Flixotide	50mcg/dozi (120 doza)	1x120 doza	IR09	RS; SZ	0.660 €	6.59 €
R03BA05	flutikazon	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	Glaxo Smith Kline	Flixotide	125mcg/dozi (60 doza)	1x60 doza	IR09	RS; SZ	0.520 €	6.56 €
R03BA05	flutikazon	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	Glaxo Smith Kline	Flixotide	250mcg/dozi (60 doza)	1x60 doza	IR09	RS; SZ	0.500 €	12.48 €
R03BA08	ciklesonid	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	Takeda GmbH	Alvesco	160mcg/doza (60 doza)	1x60 doza	IR09	RS; SZ		15.50 €
R03BA08	ciklesonid	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	Takeda GmbH	Alvesco	80mcg/doza (120 doza)	1x120 doza	IR09	RS; SZ		25.98 €
R03BB04	tiotropijum bromid	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula	Boehringer Ingelheim	Spiriva	18mcg	30x18mcg	IR04	RS; SZ	0.894 €	26.83 €
R03C	ADRENERGICI, ZA SISTEMSKU PRIMJENU									
R03CC02	salbutamol	oralni rastvor	Galenika	Spalmotil	2mg/5ml (200ml)	1x200ml		R; SZ	0.315 €	2.10 €
R03CC02	salbutamol	tableta			2mg			R; SZ		
R03D	DRUGI LJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU U OPSTRUKTIVNIM BOLESTIMA PLUĆA									
R03DA04	teofilin	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda			125mg			RS; SZ		
R03DA04	teofilin	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	Zdravlje AD Leskovac	Durofilin	250mg	40x250mg		RS; SZ	0.090 €	2.31 €
R03DA05	aminofilin	rastvor za injekciju			250mg/10ml			Z; SZ		
R03DA05	aminofilin	tableta sa produženim oslobađanjem			350mg			RS; SZ		
R03DC03	montelukast	granula	Merck Sharp & Dohme BV	Singulair	4mg	28x4mg	IR05	RS; SZ	1.330 €	14.90 €
R03DC03	montelukast	tableta za žvakanje	Merck Sharp & Dohme BV	Singulair	4mg	28x4mg	IR06	RS; SZ	0.780 €	8.72 €
R03DC03	montelukast	tableta za žvakanje	Merck Sharp & Dohme BV	Singulair	5mg	28x5mg	IR06	RS; SZ	0.590 €	8.21 €
R03DC03	montelukast	film tableta	Merck Sharp & Dohme BV	Singulair	10mg	28x10mg	IR06	RS; SZ	0.270 €	7.71 €
R03DX07	rofumilast	film tableta	Takeda GmbH	Daxas	500mcg	30x500mcg	IR10	RS; SZ		36.96 €
R05	LJEKOVI PROTIV KAŠLJA I PREHLADE									
R05D	ANTITUSICI, ISKLJUČUJUĆI KOMBINACIJE SA EKSPETORANSIMA									
R05DB13	butamirat	oralni rastvor			4mg/5ml (200ml)			SZ		
R05DB13	butamirat	tableta			20mg			SZ		
R05DB13	butamirat	tableta sa produženim oslobađanjem	Hemofarm	Omnitus	50mg	10x50mg		SZ		1.72 €
R06	ANTIHIISTAMINICI ZA SISTEMSKU UPOTREBU									
R06AC03	loropiramin	rastvor za injekciju			20mg/2ml			Z; SZ		
R06AX13	loratadin	sirup	Hemofarm	Pressing	5mg/5ml (120ml)	1x120ml		RS; SZ		1.09 €
R06AX13	loratadin	tableta	Hemofarm	Pressing	10mg	10x10mg		R; SZ	0.078 €	0.78 €
R07	OSTALI LJEKOVI SA DJELOVANJEM NA DISAJNE ORGANE									
R07AA02	porakant alfa	suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje			120mg/1,5ml		IR08	SZ		
R07AA02	porakant alfa	bočica; injekcija			240mg/3ml		IR08	SZ		
S	LJEKOVI KOJI DJELUJU NA OKO I UHO									
S01	LJEKOVI ZA LJEČENJE BOLESTI OKA									
S01A	ANTIMIKROBNI I ANTIVIRUSNI LJEKOVI									
S01AA01	hloramfenikol	mast za oči	Alkaloid	Chloramphenicol Alkaloid	1% (5g)	1x5g		R; SZ		0.70 €
S01AA11	gentamicin	kapi za oči	Hemomont	Gentokulin	0,3% (10ml)	1x10ml		R; SZ		1.18 €
S01AA11	gentamicin	mast za oči			0.30%			R; SZ		
S01AA30	bacitracin, neomicin	mast za oči			5g			R; SZ		
S01AD03	aciklovir	mast za oči			3% (4,5g)			RS; SZ		
S01AX13	ciprofloksacin	kapi za oči			0,3% (5ml)		IS01	RS; SZ		
S01B	ANTIINFLAMATORNI LJEKOVI									
S01BA04	prednizolon	kapi za oči, suspenzija	Hemomont	Oftalmol	0,5% (5ml)	1x5ml		RS; SZ		1.36 €
S01BC03	diklofenak	kapi za oči			0,1% (10ml)			RS; SZ		
S01C	ANTIINFLAMATORNI LJEKOVI U KOMBINACIJI SA ANTIINFEKTIVIMA									
S01CA01	neomicin, deksametazon	kapi za oči, rastvor	Hemomont	Neodeksacin	0,35% + 0,1% (10ml)	1x10ml		RS; SZ		1.47 €
S01CA03	neomicin, deksametazon	kapi za uši/oči, rastvor	Galenika	Dexamethason-Neomycin	0,35% + 0,1% (10ml)	1x10ml		RS; SZ		1.47 €
S01E	LJEKOVI ZA LJEČENJE GLAUKOMA I MIOTICI									
S01EB01	pilocarpin	kapi za oči			2% (10ml)			RS; SZ		
S01EC01	acetazolamid	tablete			250mg			RS; SZ		
S01EC03	dorzolamid	kapi za oči, rastvor			2% (5ml)		IS01/1	RS; SZ		
S01EC03	dorzolamid	kapi za oči	Merck Sharp & Dohme	Trusopt	2% (5ml)	1x5ml	IS01/1	RS; SZ	0.290 €	4.83 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
S01ED01	timolol	kapi za oči, rastvor	Hemomont	Timadren	0,5% (5ml)	1x5ml		RS; SZ		1.00 €
S01ED51	dorzolamid, timolol	kapi za oko	Merck Sharp & Dohme	Cosopt	(20mg + 5mg/ml) (5ml)	1x5ml	IS02	RS; SZ	0.230 €	5.69 €
S01F	MIDRIJATICI I CIKLOPLEGICI									
S01FA01	atropin	kapi za oči			0.50%			RS; SZ		
S01FA01	atropin	kapi za oči			1%			RS; SZ		
S01FA06	tropikamid	kapi za oči			1% (10ml)			RS; SZ		
S01FA06	tropikamid	kapi za oči			0,5%			RS; SZ		
S01H	LOKALNI ANESTETICI									
S01HA03	tetrakain	kapi za oči			0.5%			SZ		
S01J	DIJAGNOSTICI U OFTALMOLOGIJI									
S01JA01	fluorescein	kapi za oči			0.50%			SZ		
S01JA01	fluorescein	kapi za oči			1%			SZ		
S01JA01	fluorescein	kapi za oči			2%			SZ		
S01JA01	fluorescein	ampula			10%			SZ		
S01JA01	fluorescein	ampula			20%			SZ		
S01JA01	fluorescein	štapići						SZ		
S01K	HIRURŠKA POMOĆNA SREDSTVA									
S01KA02	hipromeloza	kapi za oči			0,5% (10ml)			SZ		
S01L	LJEKOVI ZA POREMEĆAJ CIRKULACIJE U OKU									
S01LA04	ranibizumab	rastvor za injekciju	Novartis Pharma	Lucentis	10mg/ml (0,23ml)	1x0,23ml	IS03	SZK		750.00 €
S01LA05	afibercept	rastvor za injekciju	Bayer Pharma AG	Eylea	40mg/ml	1x(4mg/0,1ml)	IS03	SZK		631.90 €*
V	OSTALI LJEKOVI									
V03	OSTALI PREPARATI ZA LJEČENJE RAZNIH BOLESTI									
V03AB	ANTIDOTI									
V03AB14	protamin sulfat	rastvor za injekciju			50mg/5ml			SZ		
V03AB15	nalokson	rastvor za infuziju			400mcg/ml			Z; SZ		
V03AB23	aceticistein	injekcija			300mg/3ml		IV01	SZ		
V03AB25	flumazenil	ampula; rastvor za inj/inf			0,5mg/5ml			SZ		
V03AB25	flumazenil	ampula; rastvor za inj/inf			1mg/10ml			SZ		
V03AB35	sugamadeks	rastvor za injekciju	Organon	Bridion	100mg/ml	10x2ml	IV02	SZ		761.26 €
V03AE	LJEKOVI ZA LJEČENJE HIPERKALUEMIJE									
V03AE02	sevelamer	film tablete	Genzyme Ltd.	Renvela	800mg	180x800mg	IV03	RS; SZ	6.635 €	149.28 €
V03AF	LJEKOVI ZA DETOKSIKACIJU U TERAPIJI ANTINEOPLASTICIMA									
V03AF03	kalcijum folinat	rastvor za injekciju			50mg/5ml			SZ		
V04	DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA									
V04CF01	PPD tuberkulin	rastvor za injekciju			3 i.j./0,1ml			Z; SZ		
V06	OPŠTI NUTRIJENTI									
V06DX01	dijetetski preparat - za preosjetljivost na bjelančevine mlijeka i soje, alergiju na hranu, malapsorpciju zbog intolerancije, sindrom kratkog crijeva, malapsorpciju poslije hirurškog zahvata, izrazitu proteinsku pothranjenost, nespecifičnu tešku proteinsku pothranjenost, cističnu fibrozu i atopijski dermatitis	prašak			400g		IV04	RS; SZ		
V06DX01	dijetetski preparat - ekstenzivni hidrolizat kazeina	prašak	UP Medi-Europa SA	Novalac Allernova AR	400g	1x400g	IV06	RS; SZ		15.69 €
V06DX01	dijetetski preparat - ekstenzivni hidrolizat kazeina	prašak	SHS International LTD	Neocate LCP	400g	1x400g	IV06/1	RS; SZ		42.00 €
V06DX01	dijetetski preparat	prašak	Nutricia Cujik B.V.	Aptamil Allergy Digestive Care	400g	1x400g	IV06/2	RS; SZ		10.90 €
V06DX02	bezglutenski proizvod	prašak	Molino Rivetti Pietro	Mix for Bread Gluten Free and Milk Free	500g	1x500g	IV07	RS; SZ		1.06 €
V06DX02	bezglutenski proizvod	prašak	Dr Schar	Mix it	500g	1x500g	IV07	RS; SZ		1.07 €
V06DX02	bezglutenski proizvod	prašak	Dr Schar	Mix B	1.000g	1x1000g	IV07	RS; SZ		2.73 €
V06DX03	namirnica za enteralnu primjenu	plastična bočica	Fresemium Kabi	Frebini Energy Drink	200ml	1x200ml	IV08	RS; SZ		1.90 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
V06DX03	namirnica za enteralnu primjenu	plastična bočica	Fresemius Kabi	Supportan Drink	200ml	1x200ml	IV10	RS; SZ		3.45 €
V06DX03	namirnica za enteralnu primjenu	plastična bočica	Fresemius Kabi	Fresubin Protein Energy Drink	200ml	1x200ml	IV08	RS; SZ		1.68 €
V06DX03	namirnica za enteralnu primjenu	plastična kesa	Fresemius Kabi	Supportan	500ml	1x500ml	IV10	RS; SZ		5.95 €
V06DX03	namirnica za enteralnu primjenu	plastična kesa	Fresemius Kabi	Fresubin	500ml	1x500ml	IV08	RS; SZ		3.75 €
V06DX03	namirnica za enteralnu primjenu	plastična kesa	Nutricia Cuijk B.V.	Nutrison	500ml	1x500ml	IV12	RS; SZ		1.74 €
V07	OSTALI NETERAPUSKI PROIZVODI									
V07AB	aqua pro injectione	rastvarač za parenteralnu upotrebu	Alkaloid	Aqua ad Iniectionem Alkaloid	5ml	50x5ml		Z; SZ		5.09 €
V08	KONTRASTNA SREDSTVA									
V08A	KONTRASTNA SREDSTVA SA JODOM									
V08AA05	joksitaminska kiselina	rastvor za oralnu i rektalnu primjenu			300mg joda/ml (100 ml)			SZ		
V08AB05	jopromid	rastvor za infuziju	Bayer Pharma AG	Ultravist 300	300mg joda/ml (50ml)	10x50ml		SZ		75.19 €*
V08AB05	jopromid	rastvor za infuziju	Bayer Pharma AG	Ultravist 300	300mg joda/ml (100ml)	10x100ml		SZ		142.87 €*
V08AB05	jopromid	rastvor za infuziju	Bayer Pharma AG	Ultravist 370	370mg joda/ml (500ml)	8x500ml		SZ		817.79 €*
V08B	KONTRASTNA SREDSTVA BEZ JODA									
V08BA01	barijum sulfat	suspencija			100% (200ml)			SZ		
V08BA01	barijum sulfat	suspencija			100% (5.000ml)			SZ		
V08C	KONTRASTNA SREDSTVA ZA MAGNETNU REZONANCU									
V08CA09	gadobutrol	rastvor za injekciju; napunjeni injekcioni špric	Bayer Pharma AG	Gadovist	1mmol/ml (7,5ml)	5x7,5ml		SZ		228.77 €*
V08CA10	gadoksetinska kiselina	rastvor za injekciju; napunjeni injekcioni špric	Bayer Pharma AG	Primovist	0,25mmol/ml (10ml)	1x10ml	IV09	SZ		157.44 €*

LEGENDA:

* Cijena ovog preparata je predmet posebnog ugovora

R - lijek se izdaje na osnovu recepta propisanog od:

- izabranog doktora;
- izabranog stomatologa;
- pedijatra iz Centra za djecu sa posebnim potrebama (lijekove iz svoje specijalnosti);
- pneumofiziologa iz Centra za plućne bolesti i TBC (lijekove koji djeluju na TBC);
- psihijatra iz Centra za mentalno zdravlje (lijekove koji djeluju na nervni sistem).

RS - lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, koji je propisan na osnovu izvještaja doktora specijaliste određene grane medicine, sa sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

RZ - lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, koji je propisan na osnovu terapije predložene u otpusnoj listi.

Z - lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite.

SZ - lijek se primjenjuje u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

RK - lijek se primjenjuje na osnovu recepta izabranog doktora, propisanog na osnovu mišljenja konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore i mišljenja Komisije Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

SZK - lijek se primjenjuje u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, na osnovu mišljenja konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore i mišljenja Komisije Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

- rezervni antibiotik propisuje se u skladu sa protokolom zdravstvene ustanove.

§ - droga, snažan uticaj lijeka na psihofizičke sposobnosti.

Doplatna lista

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja koju plaća FZO	Cijena pakovanja koju plaća osiguranik	Cijena pakovanja
A01AB09	mikonazol	oralni gel	Galenika	Daktanol	2% (40g)	1x40g		R; SZ	0.425 €	1.53 €	0.17 €	1.70 €
A02BA02	ranitidin	tableta	Zdravlje AD Leskovac	Ranisan	150mg	20x150mg		R; SZ	0.230 €	0.65 €	1.65 €	2.30 €
A02BA02	ranitidin	film tableta	Alkaloid	Ulcodin	150mg	20x150mg		R; SZ		0.65 €	0.75 €	1.40 €
A02BA03	famotidin	film tableta	Alkaloid	Famotidin Alkaloid	40mg	10x40mg	IA01/1	R; SZ		0.45 €	0.05 €	0.50 €
A02BC02	pantoprazol	gastrorezistentna tableta	Lek	Pantoprazol	20mg	14x20mg		RZ; SZ	0.240 €	0.67 €	1.03 €	1.70 €
A02BC02	pantoprazol	gastrorezistentna tableta	Belupo	Zoltex	20mg	28x20mg	IA02	RZ; SZ		1.34 €	0.21 €	1.55 €
A02BC02	pantoprazol	gastrorezistentna tableta	Krka	Nolpaza	20mg	28x20mg	IA02	RZ; SZ	0.127 €	1.34 €	0.44 €	1.78 €
A02BC02	pantoprazol	gastrorezistentna tableta	Lek	Pantoprazol	40mg	14x40mg		RZ; SZ	0.170 €	0.65 €	1.85 €	2.50 €
A02BC02	pantoprazol	gastrorezistentna tableta	Belupo	Zoltex	40mg	14x40mg		RZ; SZ		0.65 €	1.35 €	2.00 €
A02BC02	pantoprazol	gastrorezistentna tableta	Krka	Nolpaza	40mg	28x40mg	IA02	RZ; SZ	0.069 €	1.30 €	0.62 €	1.92 €
A03FA01	metoklopramid	tableta	Alkaloid	Reglan	10mg	40x10mg		R; SZ		0.80 €	0.50 €	1.30 €
A06AD11	laktuloza	sirup	Belupo	Portalak	666.7g/1000ml (500ml)	1x500ml	IA07/1	RS; SZ		3.43 €	1.00 €	4.43 €
A06AD11	laktuloza	sirup	Abbott	Duphalac	666.7g/1000ml (500ml)	1x500ml	IA07/1	RS; SZ		3.43 €	0.63 €	4.06 €
A10BA02	metformin	film tableta	Merck	Glucophage	500mg	50x500mg		R; SZ	0.130 €	1.17 €	0.44 €	1.61 €
A10BA02	metformin	film tableta	Merck	Glucophage	850mg	30x850mg		R; SZ	0.120 €	0.78 €	0.80 €	1.58 €
B01AC04	klopidogrel	film tableta	Zdravlje AD Leskovac	Antiagrex	75mg	28x75mg		RZ; SZ	0.220 €	2.59 €	1.60 €	4.19 €
B01AC04	klopidogrel	film tableta	Lek	Cardogrel	75mg	30x75mg		RZ; SZ	0.060 €	2.78 €	2.23 €	5.00 €
C01BC03	propafenon	film tableta	Hemofarm	Propafen	150mg	50x150mg		RS; SZ		1.98 €	0.32 €	2.30 €
C01BD01	amjodaron	film tableta	Sanofi Aventis	Cordaron	200mg	30x200mg		RS; SZ		2.37 €	1.13 €	3.50 €
C02CA04	doksazosin	tableta	Krka	Kamiren	2mg	20x2mg		RS; SZ	0.095 €	0.74 €	0.21 €	0.95 €
C02CA04	doksazosin	tableta	Krka	Kamiren	4mg	20x4mg		RS; SZ	0.064 €	0.95 €	0.32 €	1.27 €
C03CA01	furosemid	tableta	Bosna Lijek	Lodix	40mg	10x40mg		R; SZ	0.058 €	0.23 €	0.36 €	0.58 €
C03CA01	furosemid	tableta	Sanofi Aventis	Lasix	40mg	12x40mg		R; SZ		0.27 €	0.23 €	0.50 €
C07AB02	metoprolol	film tableta	Krka	Bloxan	100mg	30x100mg		R; SZ	0.065 €	0.88 €	0.42 €	1.30 €
C07AB03	atenolol	film tableta	Galenika	Prinorm	100mg	14x100mg		R; SZ	0.043 €	0.50 €	0.30 €	0.80 €
C08CA01	amlodipin	tableta	Lek	Amlopin	5mg	20x5mg		R; SZ	0.047 €	0.60 €	0.34 €	0.94 €
C08CA01	amlodipin	tableta	Lek	Amlopin	10mg	20x10mg		R; SZ	0.026 €	0.90 €	0.14 €	1.04 €
C08DB01	diltiazem	tableta sa produženim oslobađanjem	Alkaloid	Aldizem	90mg	30x90mg		R; SZ		1.28 €	0.22 €	1.50 €
C09AA01	kaptopril	tableta	Galenika	Katopil	25mg	40x25mg		R; Z; SZ	0.080 €	0.57 €	1.03 €	1.60 €
C09AA01	kaptopril	tableta	Galenika	Katopil	50mg	40x50mg		R; Z; SZ	0.045 €	1.04 €	0.75 €	1.79 €
C09AA02	enalapril	tableta	Krka	Enap	10mg	20x10mg		R; SZ	0.029 €	0.52 €	0.06 €	0.58 €
C09AA02	enalapril	tableta	Zdravlje AD Leskovac	Enalapril	10mg	30x10mg		R; SZ	0.040 €	0.78 €	0.51 €	1.29 €
C09AA03	lizinopril	tableta	Bosna Lijek	Lopril	5mg	20x5mg		R; SZ	0.065 €	0.37 €	0.28 €	0.65 €
C09AA03	lizinopril	tableta	Bosna Lijek	Lopril	10mg	20x10mg		R; SZ	0.040 €	0.38 €	0.41 €	0.79 €
C09AA03	lizinopril	tableta	Alkaloid	Skopryl	10mg	20x10mg		R; SZ		0.38 €	0.42 €	0.80 €
C09AA03	lizinopril	tableta	Bosna Lijek	Lopril	20mg	20x20mg		R; SZ	0.024 €	0.52 €	0.43 €	0.95 €
C09AA05	ramipril	tableta	Sanofi Aventis	Tritace	2,5mg	28x2,5mg		R; SZ		0.89 €	0.43 €	1.32 €
C09AA05	ramipril	tableta	Zdravlje AD Leskovac	Vivace	2,5mg	28x2,5mg		R; SZ	0.040 €	0.89 €	0.26 €	1.15 €
C09AA05	ramipril	tableta	Krka	Ampril	2,5mg	30x2,5mg		R; SZ	0.040 €	0.95 €	0.25 €	1.20 €
C09AA05	ramipril	tableta	Zdravlje AD Leskovac	Vivace	5mg	28x5mg		R; SZ	0.030 €	1.56 €	0.18 €	1.74 €
C09AA05	ramipril	tableta	Sanofi Aventis	Tritace	5mg	28x5mg		R; SZ		1.56 €	0.75 €	2.31 €
C09AA05	ramipril	tableta	Krka	Ampril	5mg	30x5mg		R; SZ	0.033 €	1.67 €	0.30 €	1.97 €
C09BA02	enalapril, hidrohloritiazid	tableta	Krka	Enap H	10mg + 25mg	20x(10mg+25mg)		R; SZ	0.038 €	0.51 €	0.24 €	0.75 €
C09BA03	lizinopril, hidrohloritiazid	tableta	Bosna Lijek	Lopril H	20mg + 12,5mg	20x(20mg+12,5mg)		R; SZ		0.53 €	1.07 €	1.60 €
C09BA05	ramipril, hidrohloritiazid	tableta	Sanofi Aventis	Tritace	2,5mg + 12,5mg	28x(2,5mg+12,5mg)		R; SZ		0.97 €	0.47 €	1.44 €
C09BA05	ramipril, hidrohloritiazid	tableta	Krka	Ampril HL	2,5mg + 12,5mg	30x(2,5mg+12,5mg)		R; SZ	0.051 €	1.04 €	0.50 €	1.54 €
C09BA05	ramipril, hidrohloritiazid	tableta	Krka	Ampril HD	5mg + 25mg	30x(5mg+25mg)		R; SZ	0.069 €	1.40 €	0.68 €	2.08 €
C09CA01	losartan	film tableta	Hemofarm	Erynorm	50mg	28x50mg	IC05	RS; SZ		0.73 €	0.05 €	0.78 €
C09CA01	losartan	film tableta	Hemofarm	Erynorm	100mg	28x100mg		RS; SZ		1.40 €	0.82 €	2.22 €
C09CA01	losartan	film tableta	Krka	Lorista	100mg	28x100mg	IC05	RS; SZ	0.037 €	1.40 €	0.67 €	2.07 €
C10AA01	simvastatin	film tableta	Alkaloid	Hollesta	10mg	30x10mg		RS; SZ		0.77 €	0.91 €	1.67 €
C10AA01	simvastatin	film tableta	Alkaloid	Hollesta	20mg	30x20mg		RS; SZ		0.93 €	1.80 €	2.73 €
D01AC02	mikonazol	krem	Galenika	Daktanol	2% (30g)	1x30g		R; SZ		0.90 €	0.50 €	1.40 €
J01CA04	amoksicilin	kapsula	Hemofarm	Amoksicilin	250mg	16x250mg		R; SZ		0.46 €	0.17 €	0.63 €

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja koju plaća FZO	Cijena pakovanja koju plaća osiguravnik	Cijena pakovanja
J01CA04	amoksicilin	kapsula tvrda	Alkaloid	Almacin	500mg	16x500mg		R; SZ		0.67 €	0.31 €	0.98 €
J01CR02	amoksicilin, klavulonska kiselina	film tableta	Glaxo Smith Kline	Augmentin	875mg + 125mg	14x(875mg+125mg)	IJ03	R; SZ	0.330 €	2.70 €	0.98 €	3.68 €
J01DB01	cefaleksin	kapsula tvrda	Hemofarm	Cefaleksin	250mg	16x250mg		R; SZ		0.65 €	0.31 €	0.96 €
J01DB01	cefaleksin	kapsula	Hemofarm	Cefaleksin	500mg	16x500mg		R; SZ		0.82 €	0.39 €	1.21 €
J01DB01	cefaleksin	kapsula	Alkaloid	Cefalexin Alkaloid	500mg	16x500mg		R; SZ		0.82 €	0.38 €	1.20 €
J01FA10	azitromicin	film tableta	Pliva	Sumamed	500mg	3x500mg		RS; SZ	1.300 €	1.75 €	2.15 €	3.90 €
J01FA10	azitromicin	kapsula tvrda	Pliva	Sumamed	250mg	6x250mg		RS; SZ	1.010 €	1.55 €	3.50 €	5.05 €
J01MA02	ciprofloksacin #	film tableta	Zdravlje AD Leskovac	Ciproccinal	500mg	10x500mg		RS; SZ	0.660 €	0.93 €	2.37 €	3.30 €
J01MB04	pipemidna kiselina	kapsula, tvrda	Hemofarm	Pipem	200mg	20x200mg		R; SZ		0.99 €	0.41 €	1.40 €
J01MB04	pipemidna kiselina	kapsula, tvrda	Galenika	Pipegal	200mg	20x200mg		R; SZ	0.402 €	0.99 €	0.71 €	1.70 €
J02AC01	fluconazol	kapsula, tvrda	Pfizer	Diflucan	150mg	1x150mg		RS; SZ		1.36 €	1.38 €	2.74 €
L01BC06	kapicitabin	film tableta	Roche	Xeloda	500mg	120x500mg	IL11	RS; SZ		90.13 €	29.87 €	120.00 €
L02BG04	letrozol	film tableta	Pharma Swiss	Femozol	2,5mg	30x2,5mg	IL45	RS; SZ	0.300 €	6.99 €	2.01 €	9.00 €
M01AE01	ibuprofen	oralna suspenzija	Alkaloid	Blokmax	100mg/5ml (100ml)	1x100ml		R; SZ		1.01 €	0.39 €	1.40 €
N02BE01	paracetamol	sirup	Bosna Lijek	Paracetamol	120mg/5ml (100ml)	1x100ml		R; SZ	1.500 €	0.95 €	0.25 €	1.20 €
N05AD01	haloperidol	tableta	Krka	Haldol	10mg	30x10mg		RS; SZ	0.078 €	1.98 €	0.95 €	2.93 €
N05AH02	klozapin	tableta	Remedica Ltd	Clozapine	25mg	50x25mg	IN17	RS; SZ	0.305 €	1.08 €	0.19 €	1.27 €
N05AH02	klozapin	tableta	Remedica Ltd	Clozapine	100mg	50x100mg	IN17	RS; SZ	0.187 €	2.89 €	0.24 €	3.13 €
N05BA01	diazepam	tableta	Krka	Apaurin	2mg	30x2mg	IN07/1	R; SZ	0.116 €	0.48 €	0.22 €	0.70 €
N05BA01	diazepam	tableta	Galenika	Bensedin	2mg	30x2mg	IN07/1	R; SZ		0.47 €	0.05 €	0.52 €
N05BA01	diazepam	tableta	Krka	Apaurin	5mg	30x5mg	IN07/2	RS; SZ	0.058 €	0.59 €	0.28 €	0.87 €
N05BA01	diazepam	tableta	Galenika	Bensedin	5mg	30x5mg	RS; SZ		0.069 €	0.59 €	0.45 €	1.04 €
N05BA01	diazepam	tableta	Krka	Apaurin	10mg	30x10mg	IN07/3	RS; SZ	0.039 €	0.78 €	0.37 €	1.15 €
N05BA01	diazepam	tableta	Galenika	Bensedin	10mg	30x10mg	IN07/3	RS; SZ		0.78 €	0.05 €	0.83 €
N05BA06	lorazepam	tableta	Belupo	Lorsilan	1mg	20x1mg	IN07/4	RS; SZ		0.38 €	0.14 €	0.52 €
N05BA06	lorazepam	tableta	Hemofarm	Lorazepam	2,5mg	20x2,5mg	IN07/4	RS; SZ		0.53 €	0.06 €	0.59 €
N05BA08	bromazepam	tableta	Alkaloid	Lexilium	1,5mg	30x1,5mg	IN07/1	R; SZ		0.40 €	0.19 €	0.59 €
N05BA08	bromazepam	tableta	Krka	Lexaurin	1,5mg	30x1,5mg	IN07/1	R; SZ	0.132 €	0.40 €	0.19 €	0.59 €
N05BA08	bromazepam	tableta	Hemofarm	Bromazepam	3mg	30x3mg	IN07/2	RS; SZ		0.46 €	0.20 €	0.66 €
N05BA08	bromazepam	tableta	Krka	Lexaurin	3mg	30x3mg	IN07/2	RS; SZ	0.076 €	0.46 €	0.22 €	0.68 €
N05BA08	bromazepam	tableta	Alkaloid	Lexilium	6mg	30x6mg	IN07/3	RS; SZ		1.11 €	0.53 €	1.64 €
N05BA12	alprazolam	tableta	Galenika	Ksalol	0,5mg	30x0,5mg	IN07/3	RS; SZ	0.043 €	0.46 €	0.19 €	0.65 €
N06AB03	fluoksetin	tableta	Bosna Lijek	Flusetin	20mg	20x20mg		RS; SZ	0.075 €	0.52 €	0.98 €	1.50 €
P01AB01	metronidazol	tablete	Belupo	Medazol	250mg	20x250mg		R; SZ	0.440 €	1.00 €	0.11 €	1.11 €
P01AB01	metronidazol	tableta	Galenika	Orvagil	400mg	20x400mg		R; SZ	0.325 €	0.85 €	0.45 €	1.30 €
S01ED01	timolol	kapi za oči, rastvor	Galenika	Glaumul	0,5% (5ml)	1x5ml		RS; SZ	0.062 €	1.00 €	0.55 €	1.55 €

LEGENDA:

* Cijena ovog preparata je predmet posebnog ugovora

R - lijek se izdaje na osnovu recepta propisanog od:

- izabranog doktora;
- izabranog stomatologa;
- pedijatra iz Centra za djecu sa posebnim potrebama (lijekove iz svoje specijalnosti);
- pneumoftiziologa iz Centra za plućne bolesti i TBC (lijekove koji djeluju na TBC);
- psihijatra iz Centra za mentalno zdravlje (lijekove koji djeluju na nervni sistem).

RS - lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, koji je propisan na osnovu izvještaja doktora specijaliste određene grane medicine, sa sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

RZ - lijek se izdaje na osnovu recepta izabranog doktora, koji je propisan na osnovu terapije predložene u otpusnoj listi.

Z - lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite.

SZ - lijek se primjenjuje u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.

RK - lijek se primjenjuje na osnovu recepta izabranog doktora, propisanog na osnovu mišljenja konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore i mišljenja Komisije Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

SZK - lijek se primjenjuje u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi, na osnovu mišljenja konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore i mišljenja Komisije Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore.

- rezervni antibiotik propisuje se u skladu sa protokolom zdravstvene ustanove.

§ - droga, snažan uticaj lijeka na psihofizičke sposobnosti.

Lista lijekova sa posebnim režimom odobranja

ATC	INN-internacionalni nezaštićeni naziv lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Proizvođač	Zaštićeno ime lijeka	Jačina lijeka	Pakovanje	Oznaka indikacije	Oznaka režima propisivanja i primjene lijeka	Cijena 1 DDD	Cijena pakovanja
A16AB02	imigluceraza	prašak za koncentrat za rastvor za infuziju	Genzyme (Sanofi)	Cerezyme	400 i.j.	1 x 400 i.j.	IA23	K	1,097.440 €	1,463.25 €*
B02BD08	eptakog alfa (aktivirani)	prašak za rastvor za injekciju	Novo Nordisk	Novoseven	1mg (50K i.j.)	1x1mg	IB11	K	270.061 €	613.27 €*
J01GB01	tobramicin	prašak za inhalaciju; kapsula tvrda			28mg		IJ09	K		
L01XC15	obinutuzumab	koncentrat za rastvor za infuziju	Roche	Gazyvaro	1000mg/40ml	1x40ml	IL26	K		3,241.56 €*
L01XE05	sorafenib	film tableta	Bayer Pharma AG	Nexavar	200mg	112x200mg	IL15	K	98.040 €	2,973.02 €*
L01XE17	aksitinib	film tableta	Pfizer	Inlyta	1mg	56x1mg	IL74	K		584.61 €*
L01XE17	aksitinib	film tableta	Pfizer	Inlyta	5mg	56x5mg	IL74	K		2,923.05 €*
L01XE18	ruksolitinib	tableta	Novartis Pharma	Jakavi	5mg	56x5mg	IL72	K		1,847.57 €*
L01XE18	ruksolitinib	tableta	Novartis Pharma	Jakavi	15mg	56x15mg	IL72	K		3,639.24 €*
L01XE18	ruksolitinib	tableta	Novartis Pharma	Jakavi	20mg	56x20mg	IL72	K		3,639.24 €*
L01XE27	ibrutinib	kapsula tvrda	Janssen Cilag S.p.A.	Imbruvica	140mg	90x140mg	IL36/1	K		5,575.61 €*
L01XX43	vismodegib	kapsula tvrda	Roche	Erivedge	150mg	28x150mg	IL68	K		6,827.48 €*
L04AA04	antitimocitni imunoglobulin kunića	koncentrat za rastvor za infuziju			20mg/ml		IL54	K		
L04AA04	antitimocitni imunoglobulin kunića	prašak za rastvor za infuziju			25mg		IL54	K		
L04AA10	sirolimus	tablete			1mg		IL56	K		
L04AC02	baziliksimumab - biološki lijek	prašak i rastvarač za injekciju/infuziju			20mg/5ml		IL64	K		
L04AX04	lenalidomid	kapsula tvrda	Celgene	Revlimid	10mg	21x10mg	IL69	K	253.550 €	5,324.54 €*
L04AX04	lenalidomid	kapsula tvrda	Celgene	Revlimid	25mg	21x25mg	IL69	K	112.850 €	5,924.73 €*
L04AX05	pirfenidon	kapsula tvrda	Roche	Esbriet	267mg	270x267mg	IL67	K		2,083.64 €*
R05CB13	dornaze alfa	rastvor za raspršivanje			2.500 U (2,5mg)/2,5ml		IR07	K		

LEGENDA:

* Cijena ovog preparata je predmet posebnog ugovora

K - Lijek odobrava Ministarstvo zdravlja za liječenje rijetkih bolesti, sprovođenje transplantacionih programa, kod teških patoloških stanja ili kao nastavak terapije propisane pri liječenju u inostranstvu, na predlog konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore, mišljenja konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore za odobranje lijekova i mišljenja Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore o raspoloživim sredstvima.

Indikacije

Šifra	Opis indikacije
IA01	Samo u jedinicama intenzivne negle
IA01/1	Za šifre MKB- K25-K28 najduže mjesec dana tokom godine, osim za profilaksu ulkusa kod primjene kortikosteroida i citostatika terapije, kada se primjenjuje odobrava tok trajne terapija kortikosteroidima ili citostatika. Za šifru MKB: K30, terapija do 6. nedjelje u toku 12. mjeseci.
IA02	1. Zlobiger-Eisiron sindrom (E16.8, dokumentovan kada je primjena vitaminski neograničena 2. Za šifre MKB- K25-K28, najduže mjesec dana tokom godine, za analizu i liječenje pacijenta primarne terapije obvezni je mikrobiološki analiza s antibiogramom. Ulkus mora da bude gastroskopski dokumentovan. 3. Za profilaksu ulkusa kod primjene kortikosteroida i citostatika terapije C00-C97, kada se primjenjuje odobrava tok trajne terapije kortikosteroidima ili citostatika.
IA03	Najduže 3 dana u jedinicama intenzivne negle i u jedinicama koje zadržavaju akutna krvarenja iz gornjeg gastrointestinalnog trakta, u uslovima akutnog krvarenja iz ulkusa i erozija gornjeg digestivnog trakta kada nije moguća oralna primjena.
IA03/1	Sprečavanje rekuperacije nakon endoskopske hemostaze ulceroznog krvarenja gornjeg dijela digestivnog trakta sa ograničenom terapijom do 3 dana (prvog do 6 ampula, a sleduća dva dana do 4 ampule po danu).
IA04/1	Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanoog citostatima i radioterapijom, nakon neuspješne primjene metoklopramida, za MKB- C00-C97. Lijek odobrava nadležni konzilijum Kliničkog centra Cene Gore. Specijalne bolnice Brezovik.
IA04/2	Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanoog citostatima i radioterapijom, nakon neuspješne primjene metoklopramida, za MKB- C00-C97. Tablete, kao nastavak parenteralne terapije intrajugularno uzvedeno u Kliničkom centru Cene Gore. Klinika za onkologiju, Internu kliniku-Genbu za hematologiju ili Specijalno bolnicu Brezovik.
IA05	Samo za suzbijanje povraćanja uzrokovanoog visokomergotom hemioterapijom lijekovima, cisplatin, karoplatin. AUC => 5, dokosuloban => 50 mg/m2, mitoksantan => 10mg/m2, ifosfamid => 2.5 g/m2. Lijek odobrava nadležni konzilijum Kliničkog centra Cene Gore. Specijalne bolnice Brezovik.
IA06	1. Patohistološki dijagnostikovana primarna bilijarna ciroza: za MKB- K83.0 2. Primarni sklerozirajući holangitis: za MKB- K83.0 Po prijelodnu specijaliste pedijatra gastroenterologa ili interniste gastroenterologa na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
IA07	Preventivna i liječenje hepatičke encefalopatije MKB: K72. Po prijelodnu, lijekara specijaliste interniste gastroenterologa.
IA07/1	1. Preventivna i liječenje hepatičke encefalopatije MKB: K72 2. Ospješnije uzrokovane epiprijama kod onkoloških bolesnika. 3. Mib nisciprion u uzrasu do 7 godina.
IA08	Za indikacije 1, po prijelodnu lijekara specijaliste interniste gastroenterologa. Za indikacije 2, 3, primjena isključivo na na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
IA09	1. Gornjova bolesti (K50). 2. Ulcerozni kolitis (K51). Po prijelodnu, interniste - gastroenterologa.
IA10	1. Preventivni egzotične infekcije paratuberkulozom uzrokovano sifinom (MKB: E84) 2. Za bolesnike nakon paratuberkuloz uzročnik karbamid karbenaress, po p epodu specijaliste s sekundarnog nivoa bolnice Brezovik.
IA11	Za indikaciju 1, po prijelodnu lijekara specijaliste interniste gastroenterologa. Za indikaciju 2, 3, primjena isključivo na na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Specijalne bolnice Brezovik.
IA12	1. Diabetički melitus. 2. Liječenje bolesnika koji imaju česte i dokumenovane hipoglikemijske epizode tokom terapije humanim insulinima u posljednjih 6 mjeseci. 2. Izuzetno, za bolesnike sa šećernom bolešću tipa 1 i 2, koji nakon 6 mjeseci kombinovanog terapije maksimalnom dozama drugih antidiabetičkih lijekova koje nisu postigli ciljne vrijednosti: HbA1c<7%.
IA13	1. Diabetički melitus. 2. Liječenje bolesnika uzrasa od 10 do 17 godina po prijelodnu pedijatra endokrinologa. 2. Za liječenje bolesnika od 17 godina po prijelodnu, interniste endokrinologa. 3. Sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku posljednjih 6 mjeseci (glikoziliran hemoglobin veći od 7%, f1. HbA1c<7%) u koji perzistiraju ponavljane hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju.
IA14	1. Diabetički melitus. 2. Za bolesnike sa nezadovoljavajućom kontrolom glikemije na terapiji humanim insulinima u toku posljednjih 6 mjeseci (glikoziliran hemoglobin veći od 7% f1. HbA1c<7%) u koji perzistiraju ponavljane hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju.
IA17	1. Diabetički melitus. 2. Za bolesnike sa nezadovoljavajućom kontrolom glikemije na terapiji humanim insulinima u toku posljednjih 6 mjeseci (glikoziliran hemoglobin veći od 7% f1. HbA1c<7%) u koji perzistiraju ponavljane hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju.
IA17/1	1. Diabetički melitus. 2. Za bolesnike sa nezadovoljavajućom kontrolom glikemije na terapiji humanim insulinima u toku posljednjih 6 mjeseci (glikoziliran hemoglobin veći od 7% f1. HbA1c<7%) u koji perzistiraju ponavljane hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nažatom u kartonu bolesnika, odnosno specijalističkim zveštajiu na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju.
IA18	1. Diabetički melitus tip 2, u dob od 18 do 75 godina sa BMI >27, sa klasičnom kreatinina (CrCl) >60ml/min, ili procijenjenom brzinom glomerularne filtracije (eGFR) >60ml/min/1.73m² za poboljšanje glikemijske kontrole kao dopuna dijeti i fizičkoj aktivnosti. 1. Dodana terapija standardnim antihipertenzivima kod bolesnika sa neregulisanim glikemijom (HbA1c<7%), kod koji se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodana terapija insulinom (s ličnom metforminom ili bez njega) za bolesnika kod koji se uz stabilnu dozu insulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije (HbA1c<7%). 3. Dodana terapija insulinom (s ličnom metforminom ili bez njega) za bolesnika kod koji se uz stabilnu dozu insulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije (HbA1c<7%).
IA18/1	1. Diabetički melitus tip 2, za poboljšanje glikemijske kontrole kod odraslih osoba kao dopuna dijeti i fizičkoj aktivnosti. 1. Dodana terapija standardnim antihipertenzivima kod bolesnika sa neregulisanim glikemijom (HbA1c<7%), kod koji se ne postiže odgovarajuća kontrola. 2. Dodana terapija insulinom (s ličnom metforminom ili bez njega) za bolesnika kod koji se uz stabilnu dozu insulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije (HbA1c<7%). 3. Dodana terapija insulinom (s ličnom metforminom ili bez njega) za bolesnika kod koji se uz stabilnu dozu insulina ne postiže odgovarajuća kontrola glikemije (HbA1c<7%).
IA19	1. Hipokalcemija blib koje etiologija (E58). Lijek odobrava Konzilijum endokrinologa Kliničkog centra Cene Gore. 2. Renalna osteodistrofija (N25.0). 3. Osteomalacija kod vitamina D rezistentnog rahitisa (E83.3). 4. Glikokortikoidna indukovana osteoporozna (M81.4). Po prijelodnu endokrinologa za indikaciju 1., a za indikaciju 2. nefrologa. Za indikacije 3. i 4. po prijelodnu reumatologa.
IA20	1. Renalna osteodistrofija (MKB: N25.0) 2. Postmenopauzalna osteoporozna (MKB: M81) Po prijelodnu nefrologa za indikaciju 1., a za indikaciju 2. reumatologa ili endokrinologa.
IA22	Uz duvike Helicove pefitice, nakon bolničkog liječenja, na osnovu mišljenja iz odjela za dijagnozu i potvrđenom dijagnozom Gasteroheve bolesti. Dugotrajnu erizmska supstituciona terapija kod bolesnika s potvrđenom dijagnozom Gasteroheve bolesti. Po prijelodnu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cene Gore. Primjenjuje se samo u kliničkim uslovima.
IA23	Uz duvike Helicove pefitice, nakon bolničkog liječenja, na osnovu mišljenja iz odjela za dijagnozu i potvrđenom dijagnozom Gasteroheve bolesti. Dugotrajnu konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cene Gore. Primjenjuje se samo u kliničkim uslovima.

Šifra	Opis stanja
Za SZ	1. Pre i postoperacione profleksa tromboembolije kod visokozračnih bolesnika u opštoj hirurgiji i kod operacije kuka i laktine zanjene koljena u ortopediji (svi neskomplikovani i hepatici), 2. Učestanje tromboembolijskih modernata i prevencija zgrušavanja tokom hemodialize, 3. Učestanje neslabine angine pektoris i ne-Q infarkta miokarda. Za Z
IB01	1. Za ambulantne bolesnike kojima je postavljena dugoročna tromboze poklopljenih dubokih vena, a nisu hospitalizovani, s napužom primjenom do sedam dana, istovremeno s primjenom niskomolekularnih heparina započeti s primjenom peroralnih antikoagulantnih lijekova. Samo kod izmjene heparina (mreže od 70% antitrombina III). Lijek indikuje specijalista internista hematologa i transfuziologa. Primjena na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
IB01/1	1. Postupne upadne grube ili stene sa 10dnom aspiracijskom kiseline do 12 mjeseci (MKB: 295) 2. Sekundarna prevencija infarkta miokarda ili infarkta mozga (MKB: I20.9, I21, I63, G45) 3. Akutni infarkt miokarda (STEMI). Za indikaciju 1, po prijedlogu neurologa.
IB02	1. Postupne upadne grube ili stene sa 10dnom aspiracijskom kiseline do 12 mjeseci (MKB: 295) 2. Sekundarna prevencija infarkta miokarda ili infarkta mozga (MKB: I20.9, I21, I63, G45) 3. Akutni infarkt miokarda (STEMI). Za indikaciju 2, po prijedlogu kardiologa ili neurologa.
IB03	Sekundarna prevencija infarkta miokarda ili infarkta mozga (MKB: I20.9, I21, I63, G45) sa dokazanom nepodnošljivošću na acetiilsalicilnu kiselinu. Po prijedlogu kardiologa ili neurologa.
IB04	Za liječenje bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI) kod kojih je učtena primarna (unegibna) PCI s implantacijom stenta, po prijedlogu nadležnog intervencijskog kardiologa, a u trajanju do 12 mjeseci.
IB05	1. Akutni ishemijski moždani udar unutar 4.5h od početka simptoma moždanog udara ako su zadovoljeni propisani kriterijumi (inkluzioni i ekskluzioni). 2. Akutna masivna plućna embolija sa hemodinamskom nestabilnošću. 3. Akutni infarkt miokarda (STEMI). Za indikaciju 1, po prijedlogu neurologa. Za indikacije 2, 3, po prijedlogu kardiologa.
IB06	Za trombozu kod akutnog infarkta miokarda (AMI) sa elevacijom ST segmenta do 6 sati od početka simptoma AMI.
IB07	Prevencija venske tromboembolije, kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju električnom hirurškom zahvatu zanjene kuka ili koljena 1. Prevencija moždanog udara i sistemske embolije kod odraslih osoba sa nevalviranom atrijalnom fibrilacijom sa jednim ili više sjedećih faktora rizika. a) prethodni moždani udar ili sistemska embolija, b) elekciona frakcija lijevog ventrikula < 40%, c) simptomska zatajenje srca, stepen ≥ 2 prema klasifikaciji NYHA. d) starost ≥ 75 godina e) starost ≥ 65 godina povezana sa jednim od sjedećeg- dijabetskog- meliurisa, koronarna bolest srca, hipertenzija ili tranzitorni ishemijski atak, a koji ne postoji s varfarnom ciljnu vrijednost INR-a (INR 2-3)
IB07/1	1. Prevencija venske tromboembolije, kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju električnom hirurškom zahvatu zanjene kuka ili koljena 2. Prevencija moždanog udara i sistemske embolije kod odraslih osoba sa nevalviranom atrijalnom fibrilacijom sa jednim ili više sjedećih faktora rizika. a) prethodni moždani udar ili sistemska embolija, b) elekciona frakcija lijevog ventrikula < 40%, c) simptomska zatajenje srca, stepen ≥ 2 prema klasifikaciji NYHA. d) starost ≥ 75 godina e) starost ≥ 65 godina povezana sa jednim od sjedećeg- dijabetskog- meliurisa, koronarna bolest srca, hipertenzija ili tranzitorni ishemijski atak, a koji ne postoji s varfarnom ciljnu vrijednost INR-a (INR 2-3)
IB09	1. Nestabilna angina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (NSTEMI) kod pacijenata koji imaju njez, indikovano uporno, (do 120 minuta) inozivno liječenje (PCI). 3. Liječenje duboke venske tromboze napužde do 6 mjeseci i liječenje plućne embolije napužde do 12 mjeseci, te prevenciju ponovljene duboke venske tromboze i/ili plućne embolije kod odraslih bolesnika. 1. Neselektivna aspirina ili infarkt miokarda bez elevacije ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se liječe trombolitikima ili koji u početku neće primiti drugi oblik reparativne terapije. 2. Infarkt miokarda sa elevacijom ST segmenta (STEMI) kod pacijenata koji se liječe trombolitikima ili koji u početku neće primiti drugi oblik reparativne terapije. Lijek odobrava Konzilijum kardiologa Kliničkog centra Cine Gore i primjenjuje se isključivo u uslovima na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
IB10	1. Za liječenje bolesnika sa hemofilijom A i B, sa von Willebrandovom bolesti u bolesnika sa drugim nasljednim koagulopatijama. Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cine Gore. 2. Kao antiinfektivik. Po prijedlogu Konzilijuma kardiologa Kliničkog centra Cine Gore. 1. Kod bolesnika sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitora na faktore koagulacije VIII ili IX > 5 Bethesda jedinica (BU) 2. Kod bolesnika sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primjenu faktora VIII ili IX 3. Lijek indikuje nadležni konzilijum instituta za bolesti djece Kliničkog centra Cine Gore i Konzilijum hematologa Kliničkog centra Cine Gore.
IB11	1. Kod bolesnika sa nasljednom nedostatkom faktora FVII 3. Lijek indikuje nadležni konzilijum instituta za bolesti djece Kliničkog centra Cine Gore i Konzilijum hematologa Kliničkog centra Cine Gore.
IB12	Za šifru MKB: D50, kod djece do 15 godina.
IB13	Anejnja uzrokovana nedostatkom gvožđa za bolesnike na dijalizi.
IB14	Perniciozna anemija MKB: D51.
IB15	Primjenjuje se u svim centrima gdje se spruovodi dijaliza, za dubokoznu anemiju sa hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L. Uslov za početak primjene je dovoljna rezerva gvožđa (serumski feritin pacijenta minimum 100ng/L) bez kojeg je terapija entropocitnom neefikasna. 1. Anemija kod maligniteta.
IB15/1	2. Primjenjuje se u svim centrima gdje se spruovodi dijaliza, za dubokoznu anemiju sa hemoglobinom nižim od 90 g/L za početak terapije, a za održavanje 110g/L. Uslov za početak primjene je dovoljna rezerva gvožđa (serumski feritin pacijenta minimum 100ng/L) bez kojeg je terapija entropocitnom neefikasna. Nadoknada volumena kod hemoroagijskog šoka i operacija; druga linija terapije (kada je primjena antiinfektivnih antibiotika kontraindicovana ili kada je postignuta maksimalna doza za klorid); operativne; hiperhidrirubemija kod neonatusa i terapijska izmjena plazme.
IB16	Nadoknada volumena kod hemoroagijskog šoka i operacija; druga linija terapije (kada je primjena antiinfektivnih antibiotika kontraindicovana ili kada je postignuta maksimalna doza za klorid); operativne; hiperhidrirubemija kod neonatusa i terapijska izmjena plazme.
IB16/1	Hipogonadizam <20 g/L uz generalizovane efekte.
IB17	Terapija prevencija hipovolemije šoka. Normo-održavna hemodilucija.
IB17/1	Terapija i prevencija hipovolemije šoka poslije operacija, povreda, infekcija i opkoljena. 2. Za nadoknadu volumena kod postemacijske cerebralne, ventilarne i koštane cirkulacije. Preoperativno kod novorođenčadi sa urođenom srčanom manom; za održavanje profinodnosti Ductus Botalli. Primjena u Institutu za bolesti djece.
IC02	Lijek odobrava nadležni konzilijum instituta za bolesti djece Kliničkog centra Cine Gore.
IC05	Samo za bolesnike koji ne podnose ACE-inhibitore nakon 3 mjeseca primjene terapije. Sa istom snajmenom i za njegov oblik sa hidralicilazidom. 1. Akutni infarkt miokarda MKB: I21 - sekundarna prevencija infarkta miokarda. 2. Infarkt mozga MKB: I63 - sekundarna prevencija infarkta mozga. 3. TIAu MKB: G45 - sekundarna prevencija, za ultrauzvodni dokazani plak na karotidi ili intrazvodni dokazan perifernu arterijsku okluzivnu bolest ili bolju od koronarne bolesti dokazane koronarografijom ili testom opterećenje te za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti uz vrijednosti ukupnog kolesterola iznad 5 mmol/L.
IC09	Substancijalno kravanje MKB: I60 1. Prijevrneni poroci, MKB: O80. 2. Prijedlog aborus, MKB: O20.0.
IG01	3. Primarni ili sekundarni stenolet, usljed parcijalne ili totalne propagatorne insuficijencije (N97). 4. Pobora ušane taze u toku VLF kao i u programu donacije oocita (N98). Po prijedlogu specijaliste ginekologa ili urologa ili endokrinologa.
IG02	Kao terapija za do 11 postupka vanplućne opstrukcije u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.
IG03	Uznapredova plućna hipertenzija (MKB: I27), kod bolesnika sa nusjucijom srca – III stepen, a koji više ne reaguju na dotadašnju terapiju koja je uključivala biokatore kalcijumovih kanala. Po prijedlogu Konzilijuma kardiologa ili pulmologa Kliničkog centra Cine Gore 1. Prijevrneni liječenje umjerenih do teških simptoma fibroza materice, kod odraslih žena u reproduktivnom periodu. 2. Intermitentno liječenje umjerenih do teških simptoma fibroza materice, kod odraslih žena u reproduktivnom periodu. Po prijedlogu specijaliste ginekologa.
IG04	1. Nizak rast (izmjereni visina SDS<-2.5) i ginejski potencijal rasta SDS<-1) prouzokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta MKB: E23.0, samo kod djece do 18 godina starosti. 2. Turnover androm MKB: O96, samo kod djece do 18 godina starosti. 3. Suptilnorna terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficionom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti MKB: E23.0. 4. Pobora ušane taze u toku VLF kao i u programu donacije oocita (N98). Po prijedlogu Konzilijuma endokrinologa Kliničkog centra Cine Gore za indikacije 1, 2. 1. Nizak rast (izmjereni visina SDS<-2.5) i ginejski potencijal rasta SDS<-1) prouzokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta MKB: E23.0, samo kod djece do 18 godina starosti. 2. Turnover androm MKB: O96, samo kod djece do 18 godina starosti. 3. Suptilnorna terapija kod mladih osoba sa urođenim ili stečenim deficionom hormona rasta (hipopituitarizam) do 35 godina starosti MKB: E23.0. Za pacijente kojima se prvi put uvodi biološka terapija i pacijente koji se prevode na terapiju biološkim lijekovima. Po prijedlogu Konzilijuma pedijatra endokrinologa i Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Cine Gore za indikacije 1, 2. Po prijedlogu Konzilijuma endokrinologa, Kliničkog centra Cine Gore za indikaciju 3.
IH02	Repernija testisa kod djece do 3 godine. 1. Karcinomi i endokrini tumori 2. Kravanje iz gonija dijela digestivnog trakta, kod bolesnika koji ne reaguju na endoskopski hemostazu. 3. Kravanje iz gonija digestivnog trakta, kod bolesnika koji ne reaguju na endoskopski hemostazu. Po prijedlogu suspcijaliste gastroenterohepatologa, suspcijaliste endokrinologa ili specijaliste onkologa Kliničkog centra Cine Gore za indikaciju 1. Po prijedlogu suspcijaliste gastroenterohepatologa na sekundarnom i tercijarnom nivou za indikaciju 2. Nastatak biološke terapije na primarnom i sekundarnom nivou.
IH03	1. Karcinomi i endokrini tumori 2. Kravanje iz gonija dijela digestivnog trakta, kod bolesnika koji ne reaguju na endoskopski hemostazu. 3. Kravanje iz gonija digestivnog trakta, kod bolesnika koji ne reaguju na endoskopski hemostazu. Po prijedlogu suspcijaliste gastroenterohepatologa, suspcijaliste endokrinologa ili specijaliste onkologa Kliničkog centra Cine Gore za indikaciju 1. Po prijedlogu suspcijaliste gastroenterohepatologa na sekundarnom i tercijarnom nivou za indikaciju 2. Nastatak biološke terapije na primarnom i sekundarnom nivou.

Šifra	Oznaka
	1. Akromegalija
	2. Neuroendokrini tumori
H04	Ligki odobrava Konzilijum internista Kliničkog centra Crne Gore na osnovu predloga subspecialiste endokrinologa za indikaciju 1. Ligki odobrava Konzilijum za neuroendokrine tumore Kliničkog centra Crne Gore za indikaciju 2. Nastavak bolničke terapije na primarnom i sekundarnom nivou.
H05/1	Primarno noćno mokrenje F38.0 po preporuci subspecialiste pedijatra-endokrinologa.
H05/2	1. Ispitni dijabetes centranog tipa (MKB: E23.2). 2. Ispitivanje koncentracijske moći bubrega. Po prijedlogu subspecialiste endokrinologa za indikaciju 1. Po prijedlogu subspecialiste nefrologa za indikaciju 2.
H05/3	1. Baga (upijerena hemofilija A, Von Willebrand-ova bolest tip1). 2. Preoperativna priprema hemofilicara obojivih od Von Willebrand-ove bolesti.
H06	1. Terapija sekundarnog hiperparatiroidizma (HPT) kod bolesnika sa bubrešću bubrega u terminalnoj fazi (ESRD) koji su na dializnoj terapiji održavanja. 2. Redukcija hiperkalcijemije kod bolesnika sa: - Rakomom paratiroidoe. - primarnim HPT kod kojih bi na bazi nivoa kalcijuma u serumu bila indikovana paratiroidektomija (kako delmisu relevantne terapijske smernice), ali kod kojih je paratiroidektomija klinički nepodrsna ili je kontraindovana.
L01	Rezervni antibiotik-obavezan antibiogram. Primjena u stacionarnim, ustanovama, odobrava Komisija za antibiotike zdravstvene ustanove.
L01/1	Rezervni antibiotik-obavezan antibiogram. Indikacije: 1) komplikovane intra-abdominalne infekcije; 2) komplikovane infekcije kože i mekih kiva. Odobrava Komisija za antibiotike zdravstvene ustanove.
	Rezervni antibiotik-obavezan antibiogram. Odrasli i djeca uzrasta preko 2 godine: 1. Teski oblici pneumonija i pneumonije kod bolesnika na vještačkoj ventilaciji 2. Komplikovane infekcije urinarnog trakta (uključujući pijelonefritis) 3. Komplikovane intra-abdominalne infekcije 4. Komplikovane infekcije kože i mekih kiva (uključujući infekcije dijabetičnog stopala) Liječenje pacijenata sa bakterijama u krvi koje su najviše udružena sa, ili se sumnja da je udružena sa bilo kojom gore navedenom infekcijom. Djeca uzrasta 2 do 12 godina: 1. Komplikovane intra-abdominalne infekcije Može koristiti kod djece sa neurogenijom i groznicom za koju se sumnja da je uzrokovana bakterijskom infekcijom. Odobrava Komisija za antibiotike zdravstvene ustanove.
L01/14	Rezervni antibiotik-obavezan antibiogram. Odrasli i djeca starije od 3 mjeseca: 1. teška pneumonija, uključujući nozokomijalnu pneumoniju i pneumoniju povezanu sa mehaničkom ventilacijom, 2. bronho-pulmonarne infekcije kod cistične fibroze, 3. komplikovane infekcije urinarnog trakta, 4. komplikovane intra-abdominalne infekcije. 5. niza- i post-partalne infekcije. 6. komplikovane infekcije kože i mekih kiva. 7. akutni bakterijski meningitis. Odobrava Komisija za antibiotike zdravstvene ustanove.
L01/15	Rezervni antibiotik-obavezan antibiogram. 1. Intraabdominalne infekcije. 2. vanabdominalne infekcije. 3. akutne infekcije u ginekologiji. 4. infekcije kože i mekih kiva kod dijabetičnog stopala. Prevenicija. Lijek je indikovani i kod odrasli pacijenata u profilaksi infekcije operativnog mjesta nakon elektivne kolorektalne hirurške intervencije. Primjena samo u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na terminalnom nivou zdravstvene zaštite - odobrava Komisija za antibiotike zdravstvene ustanove.
	Rezervni antibiotik-obavezan antibiogram. Odrasli i djeca uzrasta od godinu dana i starija: 1. komplikovane intraabdominalna infekcije, 2. teška pneumonija, uključujući bolničku stečenu pneumoniju i pneumoniju povezanu sa mehaničkom ventilacijom, 3. infekcije nasalne tkivom i nosne potkrovnice, 4. komplikovane infekcije urinarnog trakta, 5. komplikovane infekcije kože i mekih kiva. Odobrava Komisija za antibiotike zdravstvene ustanove.
L01/17	Rezervni antibiotik-obavezan antibiogram.
L02	Rezervni antibiotik-obavezan antibiogram. Indikacije: Infekcije kože i mekih kiva, respiratorne i ostale infekcije uzrokovane osjetljivim stafilokokom koji proizvode penicilinazu.
	Primjena u stacionarnim, ustanovama, odobrava Komisija za antibiotike zdravstvene ustanove.
L03	Druge linije terapije bakterijskih infekcija nakon neuspješne primjene punih doza amoksicilina ili kod postojanja visokog procenta rezistencije bakterija na amoksicilin. Indikacije: 1) Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (L00-J08.8; J20; J32; J40; J41; J42). 2) Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39). 3) Infekcije srednjeg uha (H65; H66).
L04	Druge linije terapije bakterijskih infekcija nakon neuspješne primjene polusintetičkih penicilina u punoj dozi. 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06; J13; J14; J15; J20; J32; J41; J42. 2. Infekcije kože i mekog kiva MKB: L00-L08. 3. Infekcije urinarnog trakta MKB: N30; N34. 4. Bimista bolesti MKB: A69.2.
L05	Rezervni antibiotik. Primjena u skladu sa preporukama pripreme rezervnih antibiotika. Djeca se samo u slučajevima kada ne postige alternativni antibiotik. Primjena u stacionarnim ustanovama, izuzetno na primarnom nivou zdravstvene zaštite kao nastavak terapije i isključivo pod uslovom da je na dopustnoj listi preporučen nastavak terapije.
L06	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: H65; H66; 2. Zapaljivlje srednjeg uva MKB: H65; 3. Umerna infekcije MKB: N00; N10; N20; N24. 1. Infekcije prouzokovane atipičnim uzročnicima ili Gram+ bakterijama kod bolesnika preosjetljivih na penicilin: - infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06; J15; 7; J16; 0; J20-J32; J40; J41; J42. - infekcije kože i mekog kiva MKB: L00-L08. - infekcije srednjeg uva MKB: H65; H66. - infekcije izazvane Mycobacterium MKB: A31. 2. Infekcije želuca i dvanaesopodjednog crijeva sa Helicobacter pylori MKB: K29.
L08	Infekcije prouzokovane atipičnim bakterijama kod bolesnika preosjetljivih na penicilin: 1. infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta MKB: J00-J06; J15; 7; J16; 0; J20-J32; J40; J41; J42. 2. infekcije kože i mekog kiva MKB: L00-L08, 3. infekcije srednjeg uva MKB: H65; H66, 4. infekcije izazvane Chlamydia-na MKB: A55; A56, 5. negonokokni urethritis MKB: N34.1, 6. cervicitis MKB: N72.
L08/1	Atipična pneumonija, urugeminalne infekcije i Chlamydia trachomatis ili N. gonorrhoeae u bolesnika koji zahtijevaju intenzivno parenteralno liječenje. Odobrava Komisija za antibiotike zdravstvene ustanove.
L09	Supresivno liječenje kronične plućne infekcije uzročnika bakterijom Pseudomonas aeruginosa kod odraslih i djece uzrasta od 6 i više godina sa cističnom fibrozom. MKB: E84. Po prijedlogu neodržnog konzilijuma kliničkog centra Crne Gore.

Šifra	Opis stanja
L11	<p>1. Supstituciona terapija kod odraslih, djece i adolescenata (0 -18 godina) i/:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primarni sinocitoma imunosupresivne su osjetljivosti na ostecenom produkciji antitijela - Hgogamaglobulinemija i rekurentne bakterijske infekcije kod pacijenata sa nroničnom limfocitom leukemijom, kod kojih se profilaktička terapija antibioticima pokazala neuspješnom. - Hgogamaglobulinemija i rekurentne bakterijske infekcije kod pacijenata sa multipim mijelomom u plato fazi koji nisu uz razvili odgovor na pneumociknu imunizaciju. - Hgogamaglobulinemija kod pacijenata poslije alogene transplantacije hematopoetskih stem ćelija (HSCT) - Djeca sa kongenitalnim AIDS-om i rekurentnim bakterijskim infekcijama. - Imunomodulacija kod odraslih, djece i adolescenata (0 -18 godina): - Idiopatska trombocitopenijska purpura (ITP), kod pacijenata koji su visoko rizični za nastanak krvarenja ili prije operativnog zahvata kako bi se korigovao broj trombocita. - Gallian bare-ov sindrom. - Kawasaki bolest. <p>Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja nadležnog Konzilijuma Kliničkog centra Cme Gore uz pdpis direktora klinike, a izuzetno nastavak terapije u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu djelatnost na sekundarnom nivou.</p>
L12	<p>Rezervi antibiotik-odrežvan antibiotogam:</p> <p>Indikacije:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zarazne bolesti crijeva Typhus abdominalis i Paratyphus MKB: A01; Salmonellosis MKB: A02; Shigellosis MKB: A03 2) infekcije zezavne uzročnikom Mycobacterium tuberculosis MKB: A15-A19 3) polne infekcije izazvane Chlamydia uzročnikom MKB: A56 4) infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae MKB: J15.7 5) infekcije respiratornog trakta izazvane Chlamydia uzročnikom MKB: J16.0 6) infekcije urogenitalnog trakta MKB: N30; N34; N36; N37; N39; N41.1; N72 7) zapaljenje srednjeg uha MKB: H66 8) ostecenostis MKB: M86 <p>Per os primljena. Po preporuci bolničkog specialiste.</p> <p>Inhaluje: Isključivo kod pacijenata koji lijek ne mogu uzimati per os i dokazane infekcije osjetljivim uzročnicima.</p>
L121	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teski otkih zapaljenja puca: 2. Komplikovane infekcije kože i mekih tkiva u jedinricama intenzivne nege. <p>Per os primljena - druga linija liječenja.</p> <p>Parenteralna primjena - isključivo kod bolesnika koji ne mogu uzimati per os oblike.</p>
L13	<p>Sistemska gljivične infekcije kod imunokompromitovanih pacijenata rezistentnih na terapiju itikonazolom.</p> <p>1. Profilaksia anti-D (Rho) imunizacije kod Rh-negativnih (Rh(D)-) kod Du-pozitivnih žena.</p> <p>Senzibilizacija se javlja nerodno poslije porođaja, ali se može javiti i tokom trudnoće. Osim toga, amniocenteza, eksterno okretanje fetusa u materici sa gljivom nadležu, abdominalna trauma, hemoragija prije porođaja, eksciporna trudnoća, uzročnikom hroničnog hepatitis kao i sportni padovi ili abortus, predstavljaju potencijalno opasne epizode za senzibilizaciju.</p> <p>2. Profilaksia anti-D (Rho) imunizacije kod negativnih Rh(D) osoba poslije nekompatibilne transfuzije Rh-izotimne krvi (D). Ili koncentriata eritrocita.</p>
L14	<p>1. Profilaksia anti-D (Rho) imunizacije kod Rh-negativnih (Rh(D)-) kod Du-pozitivnih žena.</p> <p>Senzibilizacija se javlja nerodno poslije porođaja, ali se može javiti i tokom trudnoće. Osim toga, amniocenteza, eksterno okretanje fetusa u materici sa gljivom nadležu, abdominalna trauma, hemoragija prije porođaja, eksciporna trudnoća, uzročnikom hroničnog hepatitis kao i sportni padovi ili abortus, predstavljaju potencijalno opasne epizode za senzibilizaciju.</p> <p>2. Profilaksia anti-D (Rho) imunizacije kod negativnih Rh(D) osoba poslije nekompatibilne transfuzije Rh-izotimne krvi (D). Ili koncentriata eritrocita.</p>
L15	<p>1. Prevencija CMV bolesti bolesnika rizičnim za razvoj CMV bolesti kod kojih je završena transplantacija solidnog organa bolesnika odojlikih od HIV-infekcije.</p> <p>2. Održavanje liječenja CMV bolesti nakon primarne terapije poslije: stabilizacije bolesti.</p>
L172	<p>Lijek je ndkovan kod djece senije od 12 godina i odraslih za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. liječenje citomegalovirusne (CMV) bolesti i imunokompromitiranih bolesnika. 2. prevenciju CMV bolesti kod bolesnika koji pahu od imunosupresije izazvane lijekovima (na primjer nakon presađivanja organa ili hemioterapije). <p>Po prijedodgu nadležnog konzilijuma Kliničkog centra Cme Gore, odobrava Komisija za lijekove FZO.</p>
L18	<p>HIV infekcija, MKB: B20, B21, B22, B23 i B24.</p> <p>Po prijedodgu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Cme Gore, odobrava Komisija za lijekove FZO.</p>
L181	<p>HIV infekcija, MKB: B20, B21, B22, B23 i B24, za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humanne imunodeficijalne na postdoke antiretrovirne lijekove.</p> <p>Po prijedodgu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Cme Gore, odobrava Komisija za lijekove FZO.</p>
L19	<p>Za ablate od 100mg.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9) teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni) 2. Hepatitis virusa crnoica B (B18.1) hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6) 3. Prevencija HIV infekcije kod bolesnika HbsAg pozitivnih na hemoterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima <p>- svi oblici hronični odojlika jetre izazvani virusom hepatitisa B (HBV) i HbsAg+ i HbsAg- ; hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HbsAg+.</p> <p>Hronična HIV infekcija:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) HbsAg pozitivan u serumu > 6 mjeseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-POR u titru > 10.000 kopija/ml serumu) c) bihemijski povišena aktivnost i transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti <p>Kontinuiranija je preseljivost na hemiodu.</p> <p>Lijek odobrava nadležni konzilijum Kliničkog centra Cme Gore.</p>
L20	<p>Za ablate od 150mg.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HIV infekcija za MKB: B20, B21, B22, B23 i B24. <p>Po prijedodgu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Cme Gore, odobrava Komisija za lijekove FZO.</p>
L22	<p>HIV infekcija, MKB: B20, B21, B22, B23 i B24, za bolesnike koji su rezistentni ili razvijaju neželjene reakcije na standardnu antiretrovirnu terapiju.</p> <p>Po prijedodgu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Cme Gore, odobrava Komisija FZO.</p>
L23	<p>Za održanje bolesnika, kojima je potvrđena difuziona hronična hepatitis C, genotip 1, koji imaju povišen niaz HCV RNA, Potrebna je astinencija od IV, droga i zabuzusa alkohola uzastid 12 mjeseci. Bolesnici koji su završili o drogama moraju imati dokaz da opstaju uju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentovani niaz ispitivanja i rezultati bihemijskih ispitivanja tokom tem nara svake 3 mjeseca.</p> <p>Dužna terapija genotip 1a bez ciroze ili b bez ciroze i b kompenzovanoj cirozi 12 nedjelja, 1a sa kompenzovanoj cirozi 24 nedjelje.</p> <p>Za održanje bolesnika, kojima je potvrđena difuziona hronična hepatitis C, genotip 1, koji imaju povišen niaz HCV RNA, Potrebna je astinencija od IV, droga i zabuzusa alkohola uzastid 12 mjeseci. Bolesnici koji su završili o drogama moraju imati dokaz da opstaju uju najmanje 1 godinu, a dokaz su dokumentovani niaz ispitivanja i rezultati bihemijskih ispitivanja tokom tem nara svake 3 mjeseca. Na prelied Konzilijuma za lijekove, Terapijski protokoli i trajanje liječenja odobrava Komisija fonda za zdravstveno osiguranje.</p> <p>Dužna terapija genotip 1a bez ciroze i b bez ciroze i b kompenzovanoj cirozi 12 nedjelja, 1a sa kompenzovanoj cirozi 24 nedjelje.</p> <p>Prevencija teške bolesti donjeg dijela respiratornog trakta koja zahtijeva hospitalizaciju, a proizvodovana je respiratornim sincicijalnim virusom (RSV) kod djece sa visokim rizikom od pojave RSV bolesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Djeca rođena u 35. nedjelji trudnoće ili ranije i koja su na početku RSV sezone bila mlada od 6 mjeseci; - Djeca mlada od 2 godine koja su u proteklih 6 mjeseci liječena od bronhopulmonarne dispneje; - Djece mlada od 2 godine sa hemodinamijski značajnom kongenitalnom bolešću srca. <p>Po prijedodgu Konzilijuma peplijara i njihila za bolesti djece Kliničkog centra Cme Gore, odobrava KOMISIJA ZA LIJEKOVE KCCG.</p> <p>Primjena isključivo u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.</p>
L26	<p>Vakcinacija se sprovodi u skladu sa Programom obaveznih imunizacija stanovništva protiv odredenih zaraznih bolesti.</p>
L27	<p>Vakcinacija se sprovodi u skladu sa Programom obaveznih imunizacija stanovništva protiv odredenih zaraznih bolesti.</p>
L27	<p>Po prijedodgu onkologa, reumatologa, hematologa, neurologa.</p>
L27	<p>Po prijedodgu onkologa, reumatologa, hematologa, neurologa.</p>
L27	<p>Po prijedodgu hematologa.</p>
L27	<p>1. sarkom kosiiju i mekih tkiva.</p>
L27	<p>2. karcinom testisa (druga linija).</p>
L27	<p>3. agresivni limfom (CE protokoli).</p>
L27	<p>4. karcinom grlica materice (druga linija).</p>
L33	<p>Po prijedodgu onkologa ili hematologa, lijek odobrava nadležni konzilijum Kliničkog centra Cme Gore.</p>
L34	<p>Po prijedodgu onkologa ili hematologa, lijek odobrava nadležni konzilijum Kliničkog centra Cme Gore.</p>
L34	<p>Prva linija u liječenju hronične imunohe leukemije (bivni stadijum B ili C) kod pacijenata za koje kombinovana terapija sa fludarabinom nije odgovarajuća.</p> <p>Po prijedodgu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cme Gore.</p>
L44	<p>Gladiolastna multiforme (MKB: C71) novodijagnostikovani u prvou liniji liječenja kod bolesnika sa pozivnim metastazom statusom MGdIT gena, PS 0 ili 1 (ECOG), kao postoperativna terapija u dozi od 75 mg/m² dnevno, istovremeno sa zračnom terapijom. Po završenom zračnom liječenju nastaviti hemiozolomom u dozi od 150/200 mg/m² dnevno od prvog do petog dana ciklusa koji traje 28 dana, ukupno šest ciklusa. Započinjanje hemide terapije se vrši po uvodu u MRI ujedini 3-4 nedjelja poslije operativnog tečenja, na konzilijumu referentne ustanove, pod uslovom da je PS pacijenta 0 ili 1. Nastavak liječenja kompletna ili djelimična remisija, stabilna bolest.)</p> <p>Po prijedodgu odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest) nakon svake 2 ciklusa terapije.</p>
L45	<p>Po prijedodgu Konzilijuma klinike za onkologiju i radioterapiju.</p>
L46	<p>Po prijedodgu onkologa, reumatologa, hematologa, neurologa ili dermatovenerologa.</p>
L46	<p>Za liječenje bolesnika sa neoperativnim sekundarnim metastaziranim u kombinaciji sa isplatom, a koji radežno nisu primili drugu hemoterapiju.</p> <p>Liječenje lijekom penmetesed dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni sljedeći kriterijumi: a. opise starije ECOG 0-2, b. mnovi trudnoća, AST, ALT < 5x gornje granice uerine vrijednosti, kreatinin < 1.5x gornje granice uerine vrijednosti, nivo neutrofila > 1.5k10⁹/l, nivo trombocita > 100x10⁹/l, Odboravaju se dva ciklusa liječenja lijekom penmetesed, nakon čega je odobrena klinička dijagnostička obrata u cilju ocjene stepena umorsnog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja je moguće isključivo kod pozitivnog umorsnog odgovora na sprovedeno liječenje (kompletna ili djelimična remisija, stabilna bolest).</p> <p>Po prijedodgu Konzilijuma klinike za onkologiju i radioterapiju ili Konzilijuma specijalne bolnice Brezovik, do ukupno 6 ciklusa liječenja.</p>
L48	<p>Leukemija viasastih ćelija.</p> <p>Po prijedodgu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cme Gore.</p>

Šifra	Određivanje
L109	<p>Za kroničnu limfocitnu leukemiju (MLL-B-CL1) razestaviti na prvu liniju terapije. Lijek Fludarabini se daje od postizanja optimalnog odgovora (kompletna ili parcijalna remisija, obično 6 ciklusa), potom prekriti terapiju.</p> <p>Terapija kronične limfocitne leukemije (PLL) B delija kod pacijenata sa očuvanom funkcijom koštanog srži.</p> <p>Prvu liniju terapije ovim lijekom treba započeti samo kod pacijenata sa uznapredovalom bolešću. Rai studijum III/IV (Bneft studijum C), ili Rai studijum VIII (Bneft studijum AB) kada pacijent ima simptome povezane sa bolešću ili dokaz o progresiji bolesti.</p> <p>Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Gornje Gore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. prva linija metastatskog ili uznapredovalog nesektalnog adenokarcinoma pankreasa, 2. prva linija metastatskog limfocitnog karcinoma dojke, u kombinaciji sa cisplatinom, 3. metastatski ili lokalno uznapredovali karcinom mokraćne bešike u kombinaciji sa cisplatinom, 4. Prva terapijska linija kod pacijenata sa metastatskim, lokalno rekurentnim ili metastatski karcinomom dojke, u kombinaciji sa karboplatinom, nakon antitranškina (osim ukoliko nisu klinički kontraindikovani) 5. U terapiji lokalno uznapredovalog ili metastatskog epiglotinog karcinoma orofarinksa, u kombinaciji sa karboplatinom, kod pacijenata sa relapsom bolesti, poslije najmanje šest mjeseci bez ponovnog javljanja bolesti, nakon terapije prve linije na bazi platinne. <p>Liječenje gemtabinom dozvoljeno je ukoliko su ispunjeni kriterijumi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) opšte stanje ECOG 0-1, b) neopostojanje metastaza u CNS-u ili/ili koštanim: c) vrijednost bilirubina <1,5x gornja granica uredne vrijednosti; d) AST, ALT, GG-T < 2xgornja granica urednih vrijednosti; e) kreatinin <1,5x gornja granica urednih vrijednosti; f) vrijednost neutrofila >1,5x10⁹/mm³ g) vrijednost trombocita >10x10⁹/mm³ <p>Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja, nakon čega je neophodna kompletna evaluacija. U slučaju pozitivnog odgovora (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest) može se nastaviti sa daljom terapijom. Evaluaciju je neophodna nakon svake tri ciklusa liječenja. Potrebno je da pacijent ima PS od 0 do 1, da ima zadovoljavajuće hematološke parametre za primjenu, da nema sekundarne depozite u CNS-u.</p> <p>Lijek odobrava Konzilijum onkologa Kliničkog centra Gornje Gore za indikaciju 1, 2, 3, 4, 5! Konzilijum Specijalne bolnice Brezovik za indikaciju 2.</p>
L10	<p>1. metastatski karcinom dojke nakon obavezne prethodne primjene antiestrogena i taksanar, PS 0 ili 1, MKG-650,</p> <p>2. kolorektalni karcinom, MKG-C18, C19, C20, C21,</p> <p>3. postoperativna terapija u slučaju kliničkog stadijuma III (stadijum C po Dukes), isključivo u slučaju komorbida koja ne dozvoljava primjenu standardne adjuvantne terapije sa PS od 0 do 1.</p> <p>Terapija metastatske bolesti, kod neželjenih efekata na hemoterapiju koja sadrži 5FU, PS 0 ili 1.</p> <p>Odobrava se terapija na period od dva mjeseca, nakon čega je suspeksivatski onkolog dužan izvršiti kontrolnu obradu sa ciljem provjere stepena tumorskog odgovora i podnosljivosti terapije. Nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest), uz obaveznu onkologa da izvrši kontrolnu obradu sa ciljem provjere stepena tumorskog odgovora i podnosljivosti terapije nakon svake 3 mjeseca terapije.</p> <p>Lijek odobrava Konzilijum klinike za onkologiju i radioterapiju.</p>
L11/1	<p>1. Nerakovaljani karcinom pluća.</p> <p>2. Karcinom dojke sa metastazama (3, 1, 4, stadijumi), kada se terapija koje uključuje antihercinski i histarne pokazale neuspješnom; ili neadekvatnom.</p> <p>Za indikaciju 1. Lijek odobrava nadležni Konzilijum Kliničkog centra Gornje Gore. Specijalne bolnice Brezovik.</p> <p>Za indikaciju 2. Lijek odobrava Konzilijum za dolju Kliničkog centra Gornje Gore.</p>
L12	<p>1. mikrocielni karcinom pluća</p> <p>2. rezistentni nesemtomatizni karcinom testisa.</p> <p>Lijek odobrava Konzilijum onkologa KCCG i nadležni Konzilijum Specijalne bolnice Brezovik za indikaciju 1;</p> <p>Lijek odobrava Uroško-onkološki konzilijum KCCG za indikaciju 2.</p>
L13	<p>Lijek odobrava nadležni Konzilijum Kliničkog centra Gornje Gore ili Specijalne bolnice Brezovik.</p> <p>Liječenje odličnih bolesnika kod kojih nije moguće transpantarni hematopostesku matičnu ćeliju, a koji boluju od:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mijelodisplastičnog sindroma (MDS), stadijui 2. ili visokog rizika prema međunarodnom prognostičkom numeričkom rangiranju (IPSS), 2. hronične mijelomonocitne leukemije (CMML) sa >10-29% blasta u koštanoj srži bez mijelofiferogenitnog potpomeničja, 3. akutne mijeloidne leukemije (AML) sa 20-30% blasta i istražuje više toza, prema kriterijuij: Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). <p>Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Gornje Gore.</p>
L15	<p>Primarni karcinom jetera (HCC) kod bolesnika sa lokalno omeđenom ili metastatskom bolešću gdje nije bilo moguće primijeniti hiruško niti bilo koje drugo lokalno regionalno liječenje (BCLC C), ili je ovo liječenje bilo neuspješno (BCLC B), a bolesnik su sa očuvanom funkcijom jetera (Child-Pugh A) i u dobrom performans statusu (PS 0-1) (CZ2.0).</p> <p>Po prijedlogu nadležnog konzilijuma klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Gornje Gore.</p>
L16	<p>1. akutna mijeloblastna i akutna limfoblastna leukemija, agresivni NHL, PS 0 ili 1.</p> <p>2. teška terapijska linija za priramo progresivnu multiplu sklerozu sa relapsima i visoko aktivnu sekundarno progresivnu multiplu sklerozu sa relapsima.</p> <p>Za indikaciju 2. nastavak terapije na sekundarnom mlotu zdravstvene zaštite.</p>
L17	<p>1. Karcinom skvamoznih ćelija u predjelu glave i vrata, jednjaka i grkljana materice</p> <p>2. Hobotkov i ne-Hobtkov limfom</p> <p>3. Karcinom testisa (ne seminom i seminom)</p> <p>4. Paljarna mriepuarana terapija malignih pečuranih žila</p> <p>Lijek odobrava nadležni Konzilijum Kliničkog centra Gornje Gore.</p>
L18	<p>Metastatski karcinom kolorektuma i postoperativno u kombinaciji sa 5FU/UV, ukoliko postoje zahvaćeni limfi čvorovi - Dukes C u slučaju PS od 0 do 1, na tri mjeseca, nakon čega je neophodna kompletna evaluacija i procjena tumorskog odgovora na terapiju. Nastavak liječenja je moguć u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest).</p> <p>Lijek odobrava nadležni Konzilijum klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Gornje Gore.</p> <p>Prva linija liječenja agresivnih non-Hodgkin limfoma koji su primarna i/ili prosteo citemerije CD20 pozitivni, u kliničkom stadijumu II-IV ili stadijumu I s povišenim LDH ili velikom tumorskom masom, odobrava se 4 ciklusa liječenja u kombinaciji s hemioterapijom i dozom od 375 mg/m² po ciklusu. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije.</p> <p>Prva linija liječenja bolesnika s neliječnim CD20 pozitivnim indolentnim non-Hodgkin limfomom. Odobrava se primjena osam ciklusa liječenja u dozi od 375 mg/m² po ciklusu.</p> <p>3. Liječenje bolesnika sa indolentnim B-ćeljskim non-Hodgkin limfomom u relapsu odnosu u bolesnika sa hemonazastatnim tipom B-ćeljskog non-Hodgkinog limfoma niskog stepena maligniteta kod kojih je imunohistohemijski i/ili protodom citemerijom dokazano da ćelije na sebi imaju CD20 marker. Odobrava se primjena tri ciklusa liječenja uz obaveznu reevaluaciju učinka nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još tri ciklusa terapije.</p> <p>4. Relapsidni arinūs.</p> <p>4a. Indikacija za primjenu (kao monoterapija u kombinaciji sa lijekom metoteksat ili nekim drugim sintetičkim DMARD), sigurna dijagnoza RA i aktivna bolest DAS28 >= 5,1 ili DAS28 >= 3,2 + 6 oštećenih zglobova (od 44), funkcionalni status- HAQ 0,5-2,5.</p> <p>4b. Prethodna terapija, najmanje dva lijeka iz grupe lijekova koji modifikuju bolest (DMARD) u razdoblju od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba biti lijek metoteksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg nedjeljno i jedan TNF blokator ili lijek biolizirnaib kroz 12 nedjelja.</p> <p>4c. Prije primjene bati na alaternu TBC i određivanje markera hepatitisa B i C.</p> <p>4d. Očekivani odgovor na liječenje nakon 16 nedjelja primjene, ako je započeto s DAS28 >= 5,1, pad DAS28 >= 1,2 u odnosu na početno stanje ili postizanje DAS28 <= 3,2, ako je započeto s DAS28 >= 3,2 + 6 oštećenih zglobova (od 44), pad DAS28 >= 1,2 + 50% manje oštećenih zglobova.</p> <p>4e. Trajanje liječenja, re-ispisocija lijeku riluksimab nakon dvije intruzig. dozari u obzir nakon 24 nedjelje, ukoliko je prisutna rezidualna upalna aktivnost DAS28 >= 3,2 ili je došlo do egzacerbacije RA s porastom DAS28 >= 0,6.</p> <p>4f. Kriterijumi za prekid terapije:</p> <p>a. stabilna klinička remisija u trajanju od 6 mjeseci (a CRP <=1 mg/dl, b. broj bolnih zglobova/28<=1, c. broj oštećenih zglobova/28<=1, d. bolesnikova ošćana (0-10) <=1) pod uslovom da kroz to vrijeme nije bilo makulni epizoda pogoršanja aktivnosti RA, a obavezno se nastavja sintetičkim lijekovima koji mijeraju tkv bolesti (DMARD). I koje je bolesnik uzimao uz obični lijek. U slučaju epizodnog pogoršanja DAS28 za 1,2, neopiodna je re-ispisocija biolostkom lijeku bez obzira na vrijednosti DAS28. Bolosensu, koji se biolostkom terapijom liječa po monoterapijskom načinu, isključen su iz navedenih kriterijuma i nastavljaju biolostko liječenje.</p> <p>b. ozbiljne nuspojave, teška interkurentna infekcija (povremeni/trajni prekid), trudnoća i zozstanak zadanoj učinka.</p> <p>Za indikacije 1, 2, 3, po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Gornje Gore, odobrava KOMISLIJA ZA LIJEKOVE KCCG i Komisija FZO.</p> <p>Za indikaciju 4, po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Gornje Gore,</p>
L19	<p>1. Prva linija liječenja agresivnih non-Hodgkin limfoma koji su primarna i/ili prosteo citemerije CD20 pozitivni, u kliničkom stadijumu II-IV ili stadijumu I s povišenim LDH ili velikom tumorskom masom, odobrava se 4 ciklusa liječenja (1x + 3 s.c.) u kombinaciji s hemioterapijom. U slučaju povoljnog odgovora odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije (1x + 7 s.c.).</p> <p>2. Prva linija liječenja bolesnika s neliječnim CD20 pozitivnim indolentnim non-Hodgkin limfomom. Odobrava se primjena osam ciklusa liječenja u dozi od 375 mg/m² po ciklusu.</p> <p>3. Liječenje bolesnika sa indolentnim B-ćeljskim non-Hodgkin limfomom u relapsu odnosu u bolesnika sa hemonazastatnim tipom B-ćeljskog non-Hodgkinog limfoma niskog stepena maligniteta kod kojih je imunohistohemijski i/ili protodom citemerijom dokazano da ćelije na sebi imaju CD20 receptor. Odobrava se primjena 3 ciklusa liječenja (1x + 2 s.c.) uz obaveznu reevaluaciju efekata nakon trećeg ciklusa terapije. U slučaju povoljnog učinka odobrava se primjena još 3 ciklusa terapije (s.c.).</p> <p>Lijek se primjenjuje u dozi od 1400 mg po ciklusu. Prije početka primjene s.c. injekcija, svi bolesnici uvijek moraju najprije intravenoskom inkuzijom primiti dježu lijeka riluksimab u formulaciji za intravenusku primjenu u 1 ciklusu liječenja.</p> <p>Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Gornje Gore.</p>
L19f	

Šifra	Opis stanja
L20	<p>1. Rani karcinom dojke HER 2+++ (ili CSH+) kao nastavak odvajane terapije sa antihormonalnom terapijom ili u kombinaciji sa taksanom do ukupno 12 mjeseci, kod nodus pozitivnih i nodus negativnih pacijenata sa tumorom većim od 10 mm (u slučaju postojanja kontrastne dođe za antihormonalnu terapiju, testirano se može kombinovati sa neantihormonalnim režimima).</p> <p>a) PS od 0 do 1, b) ETV već od 50%, c) laboratorija, kompletna krvna slika i hepatogram: AST i ALT < 5x gornje granice normalne vrijednosti i bilirubin < 3x gornje granice, d) metastatski karcinom dojke HER 2+++ , PS 0 ili 1, prva linija terapije nakon antihormonalne (adjuvantno) u kombinaciji sa taksanom (paklitaksel ili docetaksel) i ECGG 0-1, e) neopostojanje metastaza na CNS-u, bez opsežnih metastaza na plućima koje izazivaju značajnu simptomatologiju, f) adekvatni hematološki i biokemijski parametri (AST i ALT do 5x gornje granice, bilirubin do 3x gornje granice referentne vrijednosti).</p> <p>Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog umorskog odgovora na sprovedeno liječenje (kompletna remisija ili parcijalna remisija u slučaju izostanka efekta ili kod progresije bolesti terapija se prekida.</p> <p>Po prijedlogu Konzilijuma za dojku.</p>
L21	<p>1. Karcinom kolorektuma, metastatska bolest, nakon hemioterapije na bazi oksaliplatinne i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani KRAS gen (što se određuje u laboratorijama sa validiranim metodama određivanja), PS 0 ili 1, kao monoterapija (nakon neuspjeha terapije na bazi irinotekana i oksaliplatinna i kod onih koji ne podnose irinotekana) ili u kombinaciji sa irinotekanom. Lijek se određuje na 2 mjeseca, nakon čega je neophodna kompletna evaluacija i prognoza umorskog odgovora na terapiju.</p> <p>Kriterijumi za primjenu: a) PS od 0 do 1, b) nepostojanje metastaza u CNS-u, c) nivo bilirubina <1.5 x gornja granica normalne vrijednosti, nivo kreatinina <1.25x gornja granica normalne vrijednosti, nivo granulocita > 1.5x10⁹/L, nivo trombocita >100x10⁹/L, d) Nastavak liječenja moguć je isključivo tokom prve linije hemioterapije, do isteka iste kod pozitivnog umorskog odgovora na sprovedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).</p> <p>2. Panciularni karcinom glave i vrata: a) istovremeno sa radioterapijom i isključivo za vrijeme trajanja iste kod pacijenata sa PS 0 ili 1 u ikakvo uznapredovalom, neoperabilnom plancularnom karcinomu usne duplje i orofarinksa, kod kojih je liječenje započeto radiokacionom hemioterapijom, b) lokalno uznapredovala, neoperabilna bolest, u kombinaciji sa radioterapijom i isključivo za vrijeme trajanja iste, PS 0 ili 1, kod pacijenata kod kojih je kontraindicirano primijene bevacizumaba, c) u kombinaciji sa standardnom hemioterapijom (5FU+capecitabina) prva linija za ekvivalentni plancularni karcinom glave i vrata koji nije poddavan biokognitivni tretman, bez egzacerbacije, PS 0-1. Lijek se određuje na 2 mjeseca, nakon čega je neophodna kompletna evaluacija i prognoza umorskog odgovora na terapiju. Nastavak liječenja moguć je isključivo tokom prve linije hemioterapije do isteka iste kod pozitivnog umorskog odgovora na sprovedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest).</p> <p>U slučaju izostanka efekta ili kod progresije bolesti terapija se prekida.</p> <p>Po prijedlogu nadležnog konzilijuma klinike za onkologiju i radioterapiju, Kliničkog centra Cme Gore, odobrava Komisija FZO.</p> <p>1. Prva linija liječenja metastatskog kolorektalnog karcinoma u kombinaciji sa hemioterapijom i isključivo tokom trajanja iste. Liječenje bevacizumabom se sprovodi tokom trajanja prve linije hemioterapije dok traje pozitivni tumorski odgovor (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest). Kriterijumi za primjenu: a) očekivano preživelje > 12 mjeseci, b) PS ECOG 0-1, c) nepostojanje metastaza u mozgu, d) razmak od 6 mjeseci između hirurškog liječenja primarnog tumora i započinjavanja primjene bevacizumaba, e) razmak od 3 mjeseca između radioterapije primarnog tumora i započinjanja primjene bevacizumaba, f) nivo bilirubina <2x gornja granica normalne vrijednosti, nivo kreatinina <1.5x gornja granica normalne vrijednosti, nivo granulocita > 1.5x10⁹/L, nivo trombocita >100x10⁹/L, kontrola stvaka 2 mjeseca. Lijek se određuje na 2 mjeseca, nakon čega je neophodna kompletna evaluacija i prognoza umorskog odgovora na terapiju. U slučaju izostanka efekta ili kod progresije bolesti terapija se prekida.</p> <p>Po prijedlogu Konzilijuma klinike za onkologiju i radioterapiju. 2. Bevacizumab je, u kombinaciji sa karboplatinom i paklitakselom, indikovano za prvu liniju terapije i isključivo tokom trajanja iste kod odraštih pacijenata sa uznapredovalim epitelijalnim karcinomom jajnika, jajnika ili primarnim peritonealnim karcinomom. Lijek se određuje na 2 mjeseca, nakon čega je neophodna kompletna evaluacija i prognoza umorskog odgovora na terapiju. U slučaju izostanka efekta ili kod progresije bolesti terapija se prekida.</p> <p>Po prijedlogu nadležnog konzilijuma klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cme Gore. Odobrava KOMISIJA ZA LJEČENJE KOJE IMAJEMO FZO.</p>
L22	<p>Za primjenu u kombinaciji sa rastuzumabom docetakselom kod odraslih pacijenata sa HER2 pozitivnim metastatskim ili ikakvo revidirajućim ne resektabilnim karcinomom dojke, koji prethodno nisu primili anti-HER2 terapiju u hemioterapiju za liječenje metastatske bolesti.</p> <p>Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog umorskog odgovora na sprovedeno liječenje (kompletna remisija ili stabilna bolest) uz obaveznu prvu evaluaciju Kliničkog centra nakon tri ciklusa liječenja. Svaka sljedeća evaluacija efekta liječenja se radi nakon sprovedena tri ciklusa liječenja.</p> <p>Po prijedlogu Konzilijuma za dojku Kliničkog centra Cme Gore.</p>
L23	<p>1. Uznapredovale ne resektabilni ili metastatski melanom kod odraslih pacijenata, kao monoterapija PS 0-1 (C13).</p> <p>Održava se primjena na dva ciklusa liječenja, nakon čega je obavezna klinička obrada u cilju određene stepena umorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Nastavak liječenja je moguć isključivo kod pozitivnog umorskog odgovora na sprovedeno liječenje (kompletna ili djelimična remisija, stabilna bolest) koji se primjenjuje nakon svake dva ciklusa liječenja, do progresije bolesti.</p> <p>2. Lokalno uznapredovali ili metastatski nestohistiološki karcinomi pluća (epi, non-small cell lung carcinoma, NSCLC) kod odraslih slij tumori eksprimiraju PD-L1 i koji su prethodno primili najmanje jedan hemioterapijski protokoli. Pacijenti pozitivni na umorske mutacije gena EGFR ili ALK treba takode da primaju i odobrenu terapiju za te mutacije prije nego što prime lijek.</p> <p>Za indicaciju 1, po prijedlogu Konzilijuma za kožu i meka tkiva Kliničkog centra Cme Gore.</p> <p>Za indicaciju 2, po prijedlogu nadležnog konzilijuma klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cme Gore ili Specijalne bolnice za plućne bolesti Brevok.</p>
L24	<p>1. Hirontna mijeloidna leukemija sa pozitivnom Philadelphia (Ph+) homotomomom (bc-abl) pozitivnim kod odraslih pacijenata za koju se transplatacija košne srži ne smatra prvom linijom terapije. Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cme Gore.</p> <p>1. Bolusni u prvih tromjesečju fazni bolusni - 1. Kriterijum za prekid liječenja zbog primarne rezistencije- a) nakon 3 mjeseca liječenja- nije postignut kompletni hematološki odgovor ili Ph+ >95% b) nakon 3 mjeseca liječenja- bc-abl1 >10% ili Ph+ >35% c) nakon 12 mjeseci liječenja- bc-abl1 >1% ili Ph+ >0.2. Kriterijum za prekid liječenja zbog sekundarne rezistencije, zbog jednog ili više od navedenog bilo kada tokom liječenja- a) gubitak kompletnog hematološkog odgovora b) gubitak kompletnog citogenetskog odgovora c) povratak gubitak velikog molekularnog odgovora u dva uzastopna testa, od kojih je u jednom bc-abl1 >=1% d) pojave mutacije 3. Kriterijum za prekid liječenja zbog nuspojava- a) teške nuspojave gradusa 2, ili 4 b) perzistentne nuspojave gradusa 2, koje ne reaguju na terapiju (cikloporija u prva tri mjeseca liječenja ne smatra se razlogom za prekid terapije).</p> <p>2. Bolusni kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanjnoj fazi ili blastičnoj transformaciji- Kriterijum za prekid liječenja- a) nakon 3 mjeseca liječenja nije postignut hematološki odgovor (L>10x10¹²/L ili prisustvo blasta u perifernoj krvi. P. Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cme Gore za početak i nastavak liječenja.</p> <p>2. Za odrasle bolesnike s trontinom mijeloidnom leukemijom kojima je dijagnoza postavljena u ubrzanjnoj fazi ili blastičnoj transformaciji.</p> <p>Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cme Gore.</p>
L25	<p>3. Za liječenje odraslih bolesnika sa Kf (CD117) pozitivnim neoperabilnim i/ili metastatskim malignim gastroenteričnim stromalnim tumorima (GIST). Po prijedlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Cme Gore.</p> <p>U kombinaciji s hormonalnom terapijom za liječenje odraslih bolesnika sa prethodno neliječenom trontinom limfocitnom leukemijom (KLL1) komorbiditetima, zbog kojih kod svih nije adekvatno liječenje zasnovano na punoj dozi fludarabina.</p> <p>Po prijedlogu konzilijuma hematologa Kliničkog Centra Cme Gore, ukupno do najviše 6 ciklusa.</p>
L26	<p>Druga linija liječenja lokalno uznapredovao ili metastatskog karcinoma pluća ne-njihl ćelija s aktivirajućom mutacijom tirozin kinaza receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK). Kriterijumi za primjenu: 1. dokazana ikakvo uznapredoval ili metastatski karcinom pluća ne-njihl ćelija. 2. dokazana EGFR-TK mutacija u ćelijama tumora ili metastaza.</p>
L27	<p>Održava se primjena terapije za dva mjeseca nakon koje slijedi provjera rezulata liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog odgovora na sprovedeno liječenje (kompletna remisija, stabilna bolest) do progresije bolesti, odnosno do ukupno najviše 7 ciklusa liječenja. Po prijedlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Cme Gore ili Konzilijuma za maligna oboljenja pluća Specijalne bolnice Brevok.</p>
L28	<p>1. Druga linija liječenja lokalno uznapredoval ili metastatskog karcinoma pluća ne-njihl ćelija s aktivirajućom mutacijom tirozin kinaza receptora za epidermalni faktor rasta (EGFR-TK). Kriterijumi za uvođenje terapije: a. dokazani ikakvo uznapredovali ili metastatski karcinom pluća ne-njihl ćelija. b. dokazana EGFR-TK mutacija u ćelijama tumora ili metastaza. Održava se primjena terapije za dva mjeseca nakon koje slijedi provjera rezulata liječenja. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog umorskog odgovora, nakon ukupno sprovedenih 7 ciklusa liječenja. Nakon ukupno sprovedenih 7 ciklusa liječenja, klinički dijagnostički oradu u cilju određene stepena umorskog odgovora potrebno je napraviti nakon svake četiri ciklusa liječenja. Po prijedlogu Konzilijuma onkologa Kliničkog centra Cme Gore ili Konzilijuma za maligna oboljenja pluća Specijalne bolnice Brevok.</p>

Šifra	Opisivanje
	Prva linija liječenja metastatskog karcinoma bubrega (svekoloidski podtip), primjenjen kao monoterapija. Kriterijum za uvođenje terapije: a) ECOG 0-1, b) nepostojanje CNS metastaza, c) AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti, d) kreatinina dobe (ili intermedijarne) prognoze, e) kod pacijenata dobe (ili intermedijarne) prognoze. Odobrava se da da ciklusa nakon čega je obavljena kompletna evaluacija tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja. Evaluacija se vrši nakon svaka dva ciklusa terapije. Nastavak liječenja je moguć samo u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest) do ukupno 6 ciklusa terapije. Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cene Gore.
L129	Karcinom dlake - druga linija metastatskog HER2 pozitivnog karcinoma dlake, u kombinaciji sa lijekom kaprecitabom, kod pacijenata sa progresivnom osnove bolesti, prethodno liječenih antiheraklinima i taksanima i lijekom trastuzumab, koji je primjenjen u prvoj liniji liječenja metastatske bolesti. Kriterijum za uvođenje terapije: a) laboratorijske vrijednosti AST i ALT < 5 x gornja granica normalne vrijednosti, ujedna funkcija hematopoetskog sistema (trombociti >100 000, neutrofilii >1500), b) ujedna bubrežna funkcija (kreatinin klirens >30 ml/min), c) ECOG status bolesnika 0-2. Indikuju se 2 ciklusa terapije. Nastavak liječenja je moguć samo u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest) do ukupno 6 ciklusa terapije. Po prijedlogu Konzilijuma za djaku Kliničkog centra Cene Gore.
L130	Druga terapijska linija kod održanih bolesnika sa hroničnom mijeloidnom leukemijom, opornim ili neadevatnim na bar jednu prethodnu terapiju, uključujući imatinib mesilat. Indikuju se 2 ciklusa terapije. Nastavak liječenja je moguć samo u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest) do ukupno 6 ciklusa terapije. Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cene Gore.
L131	Druga linija liječenja održanih bolesnika s HER2 pozitivnim, neoperabilnim lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke, u monoterapiji, koji su prethodno primili trastuzumab i taksan, odvojeno ili u kombinaciji, prije uvođenja njega u terapiju neopornom je. - prethodno primati terapiju za lokalno uznapredovalu ili metastatsku bolest - mali recidiv bolesti tokom ili u toku 6 mjeseci od završetka adjuvativne terapije. Nastavak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na sporedno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija ili stabilna bolest), uz obaveznu prvu procjenu terapijskog efekta liječenja nakon 4 ciklusa liječenja. Svaka sljedeća procjena se radi nakon sporednih 6 ciklusa liječenja. Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cene Gore.
L132	Za liječenje bolesnika sa metastatskim ili neoperabilnim neanatomom kod kojih je dokazane BRAF V600 mutacija, ECOG status 0-2, kod pacijenata dobe (ili intermedijarne) prognoze. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obavljena klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stepena tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja nakon svaka dva ciklusa. Nastavak liječenja je moguć samo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora na sporedno liječenje (kompletna ili djelimična remisija, stabilna bolest), do ukupno najviše 6 ciklusa terapije. Po prijedlogu Konzilijuma za tumore kože, mekih tkiva Kliničkog centra Cene Gore.
L133	Za liječenje bolesnika sa metastatskim ili neoperabilnim neanatomom kod kojih je dokazane BRAF V600 mutacija, ECOG status 0-2, kod pacijenata dobe (ili intermedijarne) prognoze. Odobrava se primjena dva ciklusa liječenja, nakon čega je obavljena klinička i dijagnostička obrada u cilju ocjene stepena tumorskog odgovora i podnošljivosti liječenja nakon svaka dva ciklusa. Nastavak liječenja je moguć samo u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora na sporedno liječenje (kompletna ili djelimična remisija, stabilna bolest), do ukupno najviše 6 ciklusa terapije. Po prijedlogu Konzilijuma za tumore kože, mekih tkiva Kliničkog centra Cene Gore.
L133/1	Za primjenu u kombinaciji sa vemurafenomom za liječenje održanih pacijenata sa neoperabilnim ili metastatskim melanomom sa mutacijom BRAF V6. Po prijedlogu Konzilijuma za tumore kože i mekih tkiva Kliničkog centra Cene Gore.
L134	Hronične mijeloproliferativne bolesti: - hronična granulocitna leukemija MKB: C92.1, - esencijalna trombocitemija MKB: D47.3, - primarna mijelofibroza MKB: C94.5, - policitemia vera MKB: D45. Po prijedlogu hematologa ili onkologa.
L135	Za šifru MKB: C61, karcinom prostate, hormonorefraktan PS 0 ili 1. Evaluaciju radi na dva mjeseca. Po prijedlogu uroonkološkog konzilijuma Kliničkog centra Cene Gore.
L136	Akutna mijeloidna leukemija, podtip akutna promijelocitna leukemija - C92.4. Po prijedlogu hematologa Kliničkog centra Cene Gore.
L136/1	1. Monoterapija održanih pacijenata sa recidivirajućim ili refraktnim limfomom "mantle celija" (MCL). 2. Monoterapija nadevatnih za terapiju održanih pacijenata sa prethodno neliječenom hroničnom limfocitom leukemijom (CLL). 3. Monoterapija ili u kombinaciji sa bendamustinom i rituksimabom (BR) indicovana za terapiju održanih pacijenata sa hroničnom limfocitom leukemijom (CLL) koji su prethodno primili najmanje jednu terapiju. Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cene Gore.
L137	Prva linija hemioterapije metastatskog karcinomom kolona ili rektuma, uz 5FU i folnu kiselinu, ili nakon progresije na prethodne hemioterapijske agense. Neophodna je adekvatna performansa statusa: a) da pacijent nema metastaze na mozgu, b) da su hematološki i biokemijski parametri adekvatni za primjenu hemioterapije (nivo bilirubina manji od 1,5 puta gornja granica normalne vrijednosti, nivo AST i ALT manji od 3 puta gornja granica normalne vrijednosti, nivo kreatinina manji od 1,25 puta gornja granica normalne vrijednosti, nivo granulocita veći od 1,5 x 103/mm ³ , nivo trombocita veći od 100 000/mm ³) PS 0 ili 1. Po prijedlogu neoadjuvantnog konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cene Gore.
L138	Inoperabilni i metastatski adenokarcinom karcinom: MKB: C74.0. Terapija se odobrava na tri mjeseca nakon čega je neophodno uraditi kompletnu evaluaciju. U slučaju pozitivnog tumorskog odgovora, dozvoljen je nastavak terapije. Po prijedlogu Konzilijuma za endokrine tumore Kliničkog centra Cene Gore.
L139	Multipli mijelom. Za bolesnike sa diseminiranim multipnim mijelomom u II ili III liniji liječenja, kod kojih nije postignut terapijski odgovor u prethodnom liječenju, a koji mijesu prethodno liječen bortezomidom. Odobrava se 4 ciklusa liječenja, u slučaju povoljnog efekta, odobrava se primjena još 4 ciklusa terapije ako je vrijeme od posljednjeg završetka terapije sa postignutom remisijom počeka sljedećeg ciklusa terapije zbog relapsa minimum 6 mjeseci. Po prijedlogu Konzilijuma hematologa Kliničkog centra Cene Gore.
L140	1. Karcinom prostate - preduslov indiciravana bolest (PS 0 ili 1), sa visokim rizikom (PSA>20, Gleason score≥8), uz radioterapiju, u trajanju od 12 mjeseci. Kod lokalno uznapredovalog karcinoma prostate, u kombinaciji sa radioterapijom, u trajanju od 12 mjeseci, kod pacijenata sa PS 0 ili 1. 2. Karcinom dojke - medikamentozna kastrolija za karcinom dojke je namijenjena za pacijentkinje starijose dobi do 36 godina života, ukupno trajanje terapije do 36 mjeseca. 3. Endometrioza. 4. Indikacije 1,2. Ijeka odobrava nadležni konzilijum Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cene Gore, a za indikaciju 3. Konzilijum ginekologa Kliničkog centra Cene Gore. Primjena isključivo u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
L141	1. Karcinom prostate sa metastazama (terapija napreda, prije upotrebe obika sa produljenim oslobađanjem) Povoljan efekat terapije je dešeti i više izražen ukoliko pacijent prethodno nije primao ni jednu drugu hormonalnu terapiju. 2. Neplodnost kod žena. Dopunista terapija u kombinaciji sa gonadotropinima (IMG, FSH, hCG) radi izazivanja ovulacije u procesu in vitro oplođenja i embriotransfera (IVF,ET). Za indikaciju 1, ijeka odobrava Uro-onkološki konzilijum Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cene Gore, a za indikaciju 2. Konzilijum ginekologa Kliničkog centra Cene Gore. Primjena isključivo u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
L141/1	1. Karcinom prostate Terapija lokalno uznapredovalog (povjednačna terapija ili istovremena i adjuvantna uz terapiju zračenjem) ili metastatskog karcinoma prostate. Povoljan efekat terapije je dešeti i više izražen ukoliko pacijent prethodno nije primao ni jednu drugu hormonalnu terapiju. 2. Perimenopausalni i postmenopausalni sindromi. 3. Genaletika i ekstragenitalna endometrijoza (stadijum do IV) Duzina trajanja terapije je ograničena na 6 mjeseci. Ne preporučuje se preduzimanje novog terapijskog ciklusa liječenja triptorelonom ili nekim drugim GnRH analogom. 4. Neplodnost kod žena Dodačna terapija u kombinaciji sa gonadotropinima (IMG, FSH, hCG) radi izazivanja ovulacije u procesu in vitro oplođenja i embriotransfera (IVF,ET). 5. Liječenje fibromiona uterusa prije operacije - ako se dovodi u vezu sa anemijom (hemoglobin manji ili jednak 8 g/dl) - kada je neoporan smanjenje veličine fibromiona kako bi se olakšala ili izmjenila hirurška tehnika, endoskopska hirurgija, transvaginarna hirurgija - trajanje liječenja je ograničeno na 3 mjeseca. Za indikaciju 1, ijeka odobrava Uro-onkološki konzilijum Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cene Gore, a za indikaciju 2. Ijeka odobrava Konzilijum pedijatarin instituta za bolesti djece Kliničkog centra Cene Gore, a za indikacije 3, 4, 1,5. Ijeka odobrava Konzilijum ginekologa Kliničkog centra Cene Gore. Primjena isključivo u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
L141/2	1. Karcinom prostate Terapija lokalno uznapredovalog (povjednačna terapija ili istovremena i adjuvantna uz terapiju zračenjem) ili metastatskog karcinoma prostate. Povoljan efekat terapije je dešeti i više izražen ukoliko pacijent prethodno nije primao ni jednu drugu hormonalnu terapiju. 2. Genaletika i ekstragenitalna endometrijoza (stadijum I do IV) Terapija na tri mjeseca da se primjenjuje dize od šest mjeseci. Ne preporučuje se preduzimanje novog terapijskog ciklusa liječenja triptorelonom ili nekim drugim GnRH analogom. Za indikaciju 1, ijeka odobrava Uro-onkološki konzilijum Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cene Gore, a za indikaciju 2. Ijeka odobrava Konzilijum ginekologa Kliničkog centra Cene Gore. Primjena isključivo u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Šifra	Opis stanja
L142	1. Metastatski hormon-zavisan karcinom dojke, do trajanja pozitivnog odgovora na terapiju (CR, PR, SD), MKB - C50. 2. Rani hormon-zavisan karcinom dojke, MKB - C50. Po prijedodgu onkologa.
L143	Kod postmenopauzalnih žena sa estrogen- receptor pozitivnim lokalno uznapredovalim ili metastatskim karcinomom dojke kod relapsa bolesti ili nakon adjuvantne anti-estrogene terapije ili nakon progresije bolesti poslije primjene anti-estrogena. Lijek se odobrava na 3 mjeseca. Nastatak liječenja je moguć samo u slučaju pozitivnog odgovora na terapiju (kompletna ili parcijalna remisija, stabilna bolest) uz evaluaciju svake 3 mjeseca, do ukupno 12 mjeseci.
L144	Uznapredoval, metastatski karcinom prostate, u kombinaciji sa LHRT-terapijom ili onidektomijom u kompletnog androgenskog blokadi; MKB-C61. Lijek odobrava Uro-onkološki konzilijum Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cme Gore.
L144/1	Kastraciono-zestabilni metastatski karcinom prostate, terapija posle progresije na hormoterapiju docetaksinom, kod pacijenata sa PS 0-2 (G61). Po prijedodgu radiološkog konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju Cme Gore.
L145	1. Kod postmenopauzalnih žena sa metastatskim karcinomom dojke i kao adjuvantna terapija hormonski-zavisnog karcinoma dojke kod postmenopauzalnih žena. 2. Kod pacijenata u drugoj liniji terapije metastatskog hormoni-zavisnog karcinoma dojke koji je progredirao na tamoksifen. Odobrava se terapija od tri mjeseca, nakon kojih se radi evaluacija, a nastavak liječenja se odobrava u slučaju pozitivnog tumorskog odgovora CR (kompletna remisija), PR (parcijalna remisija), SD (stabilna bolest). Kriterijumi: a) hormonski zavisna tumor, b) ECOG od 0 do 3, c) pacijentkinja nema metastaze u CNS -u. Lijek odobrava Konzilijum za dobru kliniku za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cme Gore.
L146	1. Adjuvantno hormonsko liječenje postmenopauzalnih bolesnica sa estrogen-receptor pozitivnim ranim karcinomom dojke, nakon 2.-3. godine početnog adjuvantnog liječenja tamoksifonom, do ukupno 5 godina adjuvantnog hormonskog liječenja. 2. Metastatski uznapredoval karcinom dojke poshmenopauzalnih bolesnica hormonski pozitivnih receptora, nakon neuspjeha liječenja lijekom tamoksifen. Kriterijumi za liječenje: a) hormonski zavisna bolest, b) ECOG 0-3, c) nepostojanje CNS metastaza. Kod bolesnica sa metastatskom bolešću odobrava se 6mjesечно liječenje, a po završetku liječenja onkolog je dužan izvršiti dijagnostiku obradu u cilju provjer e stepena tumorskog odgovora. Nastatak liječenja moguć je isključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na provedeno liječenje (kompletna remisija, parcijalna remisija, stabilna bolest). Lijek odobrava Konzilijum za dobru kliniku za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cme Gore.
L147	Metastatski karcinom prostate rezistentan na kastraciju, gdje je bolji napredovao ikom ili nakon hemioterapijskog protokola zasnovanog na docetaksinu. Lijek se primjenjuje u kombinaciji sa prednizonom. Lijek se odobrava nakon neuspjeha androgenske supresije u prethodnom toku liječenja, kao i nakon hemioterapijskog protokola zasnovanog na docetaksinu. Odobravaju se 2 ciklusa liječenja, nakon čega se na osnovu oligoprosjeka odnosa oporavljuje odaberi terapije i podstičivosti liječenja. Liječenje se sprovodi do ukupno 6 ciklusa terapije, a nakon svake 2 ciklusa sprovodi evaluaciju. Progresijom se smatra značajno pogoršanje bolesti zasnovano na procjeni kliničke progresije i najmanje jednog od dva dodatna kriterijuma vrijednosti PSA ili radiološka progresija). Lijek odobrava Uro-onkološki konzilijum Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cme Gore.
L148	1. Hronični hepatitis B: a) Objek forme hroničnog hepatitisa B: HBeAg pozitivan i HBeAg negativan hronični hepatitis B, HBV-DNK (PCR) + b) Prisutna replikacija virusa > 6 meseci; c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrijednosti); d) Histološki aktivna (nekompletna) ili (fuzoz) bolest jetre, hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre. Isključiti bolesti sa kombinacijama za primjenu interferona. Doza: HBeAg pozitivan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j.; 3 puta nedjeljno, 4-6 mjeseci. HBeAg negativan hronični hepatitis B: 5-10 miliona i.j.; 3 puta nedjeljno, 12-24 mjeseci. Za dea: <56 miliona i.j./m ³ 3 puta nedjeljno, 4-6 mjeseci. 2. Hronični hepatitis C: a) Antigena na virus hepatitisa C pozitivna u serumu >6 mjeseci; b) Prisutna replikacija HCV(HCV-RNK-PCR+); c) Biohemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT>2x iznad normalne vrijednosti); d) Histološki dokazana aktivna (nekompletna) ili (fuzoz) bolest jetre, hronični hepatitis i kompenzovana ciroza jetre. Doza: rekombinirani interferon alfa se primjenjuje u dozi od 3 miliona i.j.; 3 puta nedjeljno, 52 nedjelje (za djecu: 5 miliona i.j./m ² 3 puta nedjeljno, 52 nedjelje). 3. Hronična mijeloidna leukemija. 4. Tihloleukemija. 5. Meleznom - stadijum I po AJCC (Breslow index > 1,5 mm, bez zahvaćanja limfnih čvorova i bez zahvaćanja kože, bez detektovanih metastaza poslije hirurije); 6. Održavanje remisije multiplo mijelomom. 7. Uznapredoval karcinom bubrežnih ćelija. 8. Učinkovano liječenje karcinom bubrežnih ćelija. Za indikacije 3, 4, 6, lijek odobrava Konzilijum hematologa Kliničkog centra Cme Gore. Za indikacije 3, 7, lijek odobrava radiološki konzilijum Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cme Gore. Nastatak bolničke terapije na primanom nivou. Terapija se odobrava na 3 mjeseca, nakon čega slijedi klinička evaluacija bolesti. Terapija se nastavlja ukoliko ne postigne značajnu progresiju bolesti, a ukupno do 6 mjeseci terapije.
L149	Multipla skleroza Po prijedodgu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Cme Gore. Nastatak terapije na primanom nivou – abioteka.
L151	1. Hronični hepatitis C kod odrasli bolesnika koji zadovoljavaju sljedeće kriterijume: a) HCV-RNA-PCR pozitivan (najmanje 2 mjeseca prije početka terapije). b) povišene vrijednosti ALT u dva uzastopna mjerenja uz naziv genotipa i histološki dokaz hronične upale ili fibroelastografski naziv (fibrosan) veći od 8 kPa. Kod bolesnika sa normalnim vrijednostima ALT terapija je indikovana kod stadijuma fibroza F<=> od 2 (pod istak (Knodellom indeksi) ili vrijednostima fibrosana većim od 8 kPa. Potrebna je apstinencija od i.v. droga i abuzusa alkohola uzlazni 12 mjeseci. Bolesnici koji su zavisni od droga moraju imati dokaz da apstinuju najmanje 12 mjeseci, a dokaz su dokumentovani nalez, jasnija i rezultati biopskopskih ispitivanja tokom vremena svake 3 mjeseca. Druga terapija pegivirana interferonom i sofosbuvir se primjenjuje kod bolesnika koji do sada nisu bili liječeni pegiviranim interferonom i sofosbuvir u odgovarajućem trajanju i kod non-respodnata i kod relapsa bolesti na kompenzovani interferon. Kod bolesnika kod kojih postoji klinička sumnja na akutni hepatitis C u serumu dva puta u razmaku od 3 mjeseca prije početka terapije. 1. Bolesnici sa genotipom 1 i 4 i vremenom većom od 50000 IU/ml liječe se 48 nedjelje. Provjera vremena je odrediti HCV RNA u serumu dva puta u razmaku od 3 mjeseca prije početka terapije. 2. Bolesnici sa genotipom 1 i 4 i vremenom većom od 600000 IU/ml liječe se 24 nedjelje. Provjera vremena je odrediti HCV RNA u serumu, a ako ne dođe do smanjenja vremena za više od 100x (2 log) IU HCV RNA. Kod bolesnika kod kojih je redukovana vremena za više od 2 log, ali imaju detektabilnu HCV RNA u 12. nedjelji, vrši se provjera HCV RNA-PCR nakon 24 nedjelje terapije i pekada ukoliko je vremena prisutna. 2. Bolesnici sa genotipom 1 i 4 i vremenom manjom od 600000 IU/ml liječe se 24 nedjelje. Provjera vremena nakon 4 nedjelje terapije (RVR) kod bolesnika koji su tada HCV RNA-PCR negativni terapija se sprovodi 24 nedjelje. Ukoliko se ne postigne RVR liječenje se nastavlja dalje kao kod visoke vremena pod takom 1. Bolesnici sa stadijumom fibroza >= od F3 po Istak Knodellu (ili Metavir F4) ili fibrosan veći od 14 kPa liječe se obvezno 48 nedjelja po terapijskom protokolu za visoku viramiju, kao kod genotipa 1 i 4 (pod 1). 3. Bolesnici sa genotipom 2, 3, 5 i 6 liječe se nezavisno od vremena 24 nedjelje. Bolesnici sa stadijumom fibroza >= od F5 po Istak Knodellu (ili Metavir F4) ili fibrosan veći od 14 kPa liječe se obvezno 48 nedjelja po terapijskom protokolu za visoku viramiju, kao kod genotipa 1 i 4 (pod 1). II. Hronični hepatitis B - pegivirantom alfa-2a-HBsAg poz. bez obzira na HBeAg status) uz sljedeće kriterijume- HBV-DNA veći od 2000 IU/ml (10000 kopijani semala), povišena vrijednost ALT u dva uzastopna mjerenja, uz dokaz histološke aktivnosti fibroza >= od F2 (po Istak Knodellom indeksi) ili vrijednosti fibroelastografskog mjerenja (fibrosan) više od 8 kPa. Bolesnici sa vremenom manjom od 2000 IU/ml i normalnim vrijednostima ALT liječe se ukoliko imaju histološki ili fibroelastografski znak uznapredovale fibroze po Istak Knodellu F<=> od 4, odnosno fibrosan veći od 14 kPa. Terapija se primjenjuje kod bolesnika kodak da apstinuju najmanje 12 mjeseci, a dokaz abuzusa alkohola ne mijenja u odgovarajućem trajanju i druge podatke kombinirajuće za primjenu pegivirano interferona. Bolesnici koji su zavisni od droga moraju imati dokaz da apstinuju najmanje 12 mjeseci, a dokaz su dokumentovani nalez, jasnija i rezultati biopskopskih ispitivanja tokom vremena svake 3 mjeseca. Terapija uključuje odnase bolesnika. Liječenje traje 48 nedjelja uz provjeru HBV DNA nakon 24 nedjelje (ukoliko se ne postigne redukcija vremena za 100x od početne vrijednosti terapija se prekida). Po prijedodgu Konzilijuma infektologa Kliničkog centra Cme Gore.
L152	Primarni i redivirantni karcinom "in situ" mekćane dojke. Lijek odobrava Uro-onkološki konzilijum Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Cme Gore. Odobrava se terapija za period od šest mjeseci, a nakon toga se dalje procjena stepena odgovora na terapiju.
L154	Profilaksa akutnog odhanovanja bubrežna nakon transplantacije. Po prijedodgu Urološko-ferološkog konzilijuma Kliničkog centra Cme Gore.
L156	Kod bolesnika sa pogoršanom bubrežnom funkcijom nakon operacije, kod pogorše držane fibroze dokazane na biopsičkom materijalu ili eritrosedografski, sa ciljem usporavanja progresije hronične akutne nefropatije (Z94.0). Lijek odobrava Konzilijum nefrologa Kliničkog centra Cme Gore.

Šifra	Organizacija
	<p>Multipla skleroza - visoko aktivna relapsno remitentna</p> <p>Kriterijum za uvođenje terapije:</p> <p>a) EDSS <=0 b) odsustvo trudnoće c) bolesnik s negativnim antitijelima na JCv ili niskim títrom JCv antitijela (indeks < 0.9) d) bolesnik koji nisu imali odgovor na prvu terapijsku liniju koja modifikuje proizvod tkb bolesti (interferon beta ili glatiramer acetat ili dimetil fumarat), odnosno kada su ispunjeni kriterijum za prekid navodne terapije;</p> <p>- Progresija vrataka relapsna za 1 EDSS tokom 12 mjeseci; - Progresija bez relapsa za 1 EDSS tokom 6 mjeseci; - Tri relapsa tokom 12 mjeseci;</p> <p>Bolest je aktivna uprkos sporednoj prethodnoj terapiji uz: a) >1 nove T2 lezije na MR-u nakon godinu dana liječenja ili b) >=2 relapsa.</p> <p>Po prijedlogu Konzilijuma neurologa kliničkog centra Crne Gore. Obavezno određivanje JCv tira antitijela na teret proizvođača.</p> <p>Napomena: Nastavak terapije na primarnom nivou - zadržava.</p> <p>Teška aktivna forma Chronove bolesti i ulceroznog kolitisa kod pacijenata koji nisu adekvatno reagovali na konventionalnu terapiju, prestali su da reaguju ili ne podnose terapiju lijekovima iz grupe antiagonista faktora alfa tumorske nekroze.</p> <p>Po prijedlogu Konzilijuma gastroenterolozijskog Centra Gore.</p>
L158	<p>1. Za bolesnike sa juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života sa neodgovarajućim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lijekove najmanje tokom šest mjeseci terapije.</p> <p>2. Za liječenje reumatoidnog artritisa i ulceroznog kolitisa kod pacijenata koji nisu adekvatno reagovali na konventionalnu terapiju, prestali su da reaguju ili ne podnose terapiju lijekovima iz grupe antiagonista faktora alfa tumorske nekroze.</p> <p>3. Za liječenje ankirozirajućeg spondilitisa nakon zosterne infekcije na najmanje 2 nesteroidna antiinematika primijenjena u maksimalnoj preporučenoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca ili postojanja kontraindikacije zbog:</p> <p>a) prethodne terapije, najmanje dva lijeka iz grupe lijekova koja mogu modifikovati bolest (LMTB) u periodu od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba da bude lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg nedjeljno (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); b) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); c) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); d) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); e) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); f) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); g) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); h) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); i) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); j) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); k) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); l) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); m) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); n) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); o) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); p) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); q) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); r) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); s) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); t) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); u) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); v) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); w) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); x) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); y) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); z) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi);</p> <p>1. Za bolesnike sa juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života sa neodgovarajućim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lijekove najmanje tokom šest mjeseci terapije.</p> <p>2. Za liječenje reumatoidnog artritisa i ulceroznog kolitisa kod pacijenata koji nisu adekvatno reagovali na konventionalnu terapiju, prestali su da reaguju ili ne podnose terapiju lijekovima iz grupe antiagonista faktora alfa tumorske nekroze.</p> <p>3. Za liječenje ankirozirajućeg spondilitisa nakon zosterne infekcije na najmanje 2 nesteroidna antiinematika primijenjena u maksimalnoj preporučenoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca ili postojanja kontraindikacije zbog:</p> <p>a) prethodne terapije, najmanje dva lijeka iz grupe lijekova koja mogu modifikovati bolest (LMTB) u periodu od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba da bude lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg nedjeljno (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); b) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); c) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); d) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); e) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); f) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); g) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); h) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); i) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); j) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); k) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); l) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); m) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); n) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); o) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); p) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); q) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); r) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); s) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); t) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); u) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); v) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); w) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); x) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); y) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); z) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi);</p>
L160	<p>1. Za bolesnike sa juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života sa neodgovarajućim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lijekove najmanje tokom šest mjeseci terapije.</p> <p>2. Za liječenje reumatoidnog artritisa i ulceroznog kolitisa kod pacijenata koji nisu adekvatno reagovali na konventionalnu terapiju, prestali su da reaguju ili ne podnose terapiju lijekovima iz grupe antiagonista faktora alfa tumorske nekroze.</p> <p>3. Za liječenje ankirozirajućeg spondilitisa nakon zosterne infekcije na najmanje 2 nesteroidna antiinematika primijenjena u maksimalnoj preporučenoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca ili postojanja kontraindikacije zbog:</p> <p>a) prethodne terapije, najmanje dva lijeka iz grupe lijekova koja mogu modifikovati bolest (LMTB) u periodu od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba da bude lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg nedjeljno (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); b) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); c) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); d) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); e) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); f) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); g) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); h) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); i) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); j) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); k) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); l) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); m) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); n) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); o) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); p) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); q) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); r) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); s) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); t) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); u) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); v) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); w) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); x) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); y) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); z) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi);</p>
L161	<p>1. Za bolesnike sa juvenilnim idiopatskim artritisom kod kojih je liječenje započeto prije 18. godine života sa neodgovarajućim odgovorom ili nepodnošljivošću na metotreksat ili druge imunosupresivne lijekove najmanje tokom šest mjeseci terapije.</p> <p>2. Za liječenje reumatoidnog artritisa i ulceroznog kolitisa kod pacijenata koji nisu adekvatno reagovali na konventionalnu terapiju, prestali su da reaguju ili ne podnose terapiju lijekovima iz grupe antiagonista faktora alfa tumorske nekroze.</p> <p>3. Za liječenje ankirozirajućeg spondilitisa nakon zosterne infekcije na najmanje 2 nesteroidna antiinematika primijenjena u maksimalnoj preporučenoj dnevnoj dozi kroz 3 mjeseca ili postojanja kontraindikacije zbog:</p> <p>a) prethodne terapije, najmanje dva lijeka iz grupe lijekova koja mogu modifikovati bolest (LMTB) u periodu od 6 mjeseci od kojih jedan obavezno treba da bude lijek metotreksat primijenjen najmanje kroz 2 mjeseca 20 mg nedjeljno (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); b) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); c) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); d) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); e) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); f) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); g) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); h) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); i) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); j) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); k) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); l) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); m) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); n) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); o) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); p) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); q) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); r) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); s) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); t) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); u) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); v) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); w) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); x) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); y) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi); z) nedjeljnog (ili zbog nepodnošljivosti u mloj dozi);</p>

Šifra	Opisivanje
	Organiziranje
LM601	Skrabiranje trajanja neuropenije i incidencije febrilne neuropenije kod pacijenata liječenih utvrdnom citotoksičnom hemolizacijom zbog maligniteta (sa izuzetkom hronične mijeloidne leukemije i mijelodisplastičnog sindroma), kao za skrabivanje trajanja neuropenije i febrilne klinički posljedica kod pacijenata koji se podvrgavaju mijeloidnoj terapiji poslije koje svi rani transplantacija koštane srži i za koje se smatra da su izloženi povećanom riziku od produžene teške neuropenije. Po prijedlogu lijevaka specijaliste za: - pacijente kojima se prvi put uvodi biološka terapija, - pacijente koji se prevode na terapiju biološki sličnim lijekovima.
LM67	Idiopatska plućna fibroza uzrokovala FVC iznosi između 50% i 80% od očekivane vrijednosti. Kriterijum za prekidanje terapije je: povećanje FVC >=10% u bilo kojem 12-mjesečnom razdoblju. Po prijedlogu konzilijuma pulmonologa Kliničkog centra Crne Gore i Specijalne bolnice Brevozik.
LM68	Lijek je indikovani za liječenje odraslih pacijenata sa: - simptomatskim metastatskim karcinomom bazalnog ćelija, - lokalno uznapredovanim karcinomom bazalnog ćelija koji nije indikovano hirurško liječenje ili radioterapija. Po prijedlogu nadležnog konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog Centra Crne Gore.
LM69	Multipli mijelom, 3. linija liječenja, u kombinaciji s deksametazonom kod odraslih bolesnika koji su prethodno liječeni lijekom bortezomibom. Po prijedlogu konzilijuma hematologa Kliničkog centra Crne Gore.
LM70	Karcinom prostate - metastatski homoni refraktorni, u kombinaciji sa prednizonom, kod bolesnika koji su prethodno liječeni lijekom docetaksinom. Po prijedlogu nadležnog konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog Centra Crne Gore.
LM71	1.Hormon-receptor pozitivni uznapredovali karcinom dojke Za terapiju hormon-receptor pozitivnog, HER2/neu negativnog, uznapredovalog karcinoma dojke, u kombinaciji sa ekskemstomom, kod postmenopauzalnih žena bez simptomatske visceralne bolesti nakon recidiva ili prvog esije primjene metastoidnog inhibitora aromataze. 2. Neuroendokrini tumor pankreasnog potijeka Za terapiju nesekabilnog ili metastatskog, dobro- ili umjereno-diferenciranog neuroendokrinog tumora pankreasnog potijeka kod odraslih osoba sa progresivnom bolešću. 3.Karcinom bubrega Za terapiju bolesnika sa uznapredovanim karcinomom bubrega, kod kojih je bolest progredirala tokom ili poslije VEGF-ciljane terapije. Po prijedlogu nadležnog konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog Centra Crne Gore.
LM72	Spionemagija kod odraslih bolesnika s primarnom mijelofibrozom (hronična idiopatska mijelofibroza) i sekundarna mijelofibroza nakon policitemije vere ili nakon sesanjanje trombocitemije. Kriterijum za primjenu lijeka: Liječenje se bolesnici koji imaju bolni srednjeg i visokog rizika (hematološki prognostički scoring sistem PSS 2.2.3, internimijalni visoki i visoki rizik). Liječenje se obnavlja na 3 mjeseca, nakon čega je obavezna reevalvacija liječenja. Liječenje se prekidava ako nakon 3 mjeseca od početka liječenja nije smanjeno UZC-on dokazano smanjenje šezene i kliničkim pregledom nije došlo do poboljšanja statusa bolesnika od >>20%, po kemotski stabil, odnosno liječenje treba prekinuti ako nakon 6 mjeseci od početka liječenja nije došlo do smanjenja u dizini šezene od 40% (opipljive ekvivaleantno povećanju volumena šezene od 25%) u poređenju sa početnom vrijednošću mjerenja IR-R-on ili CR-on i ako više nema opipljivih podložnijih simptoma povezanih sa bolešću. Reevalvacija liječenja je obavezna svaka 3 mjeseca kliničkim pregledom i objagovisikom odgovorom sa ciljem provjere daljnje šezene.
LM73	Po prijedlogu konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju KCCG. 1. Prva linija liječenja metastatskog karcinoma bubrega svijetlim ćelijama primijenjen kao monoterapija. Kriterijum za primjenu: a) ECOG 0-1, b) Nepsobojanje CNS metastaza c) AST i ALT <5x gornja granica normalne vrijednosti. d) Kreatins kreatinina >= 30 ml/min. Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca nakon kojih se sprvo vodi evaluacija efekata primjenjene terapije. Nastavak liječenja je moguć, uključivo kod pozitivnog tumorskog odgovora na sprvo vodeno liječenje (kompletni ili djelomična remisija ili stabilna bolest) do progresije bolesti. 2. Za liječenje odraslih bolesnika s određeni podtipima uznapredovalog sarkoma mekih tkiva koji su prethodno imali hemoterapiju za metastatsku bolest ili kod kojih je došlo do progresije bolesti u roku od 12 mjeseci nakon (ne) adjuvantne terapije. Liječenje uznapredovalog sarkoma mekih tkiva potrebno je sprvo saći u skladu sa podacima navedenim u Sažetku opisa svojstava lijeka. Po prijedlogu konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju KCCG.
LM74	Karcinom bubrega - lokalno uznapredovali ili metastatski, kao druga linija poslije prethodno neuspješnog liječenja lijekovima-hipohlorama tirozin kinaza. Kriterijum za primjenu: 1. funkcija bubrega - kreatinins kreatinina >30 ml/min; 2. nepsobojanje CNS metastaza; 3. status ECOG 0-2 Odobrava se primjena terapije za 3 mjeseca, nakon kojih se sprvo vodi evaluacija efekata primjenjene terapije. Nastavak liječenja je moguć samo u slučaju postojanja kliničkog odgovora (kompletni odgovor, parcijalna remisija ili stabilna bolest).
LM01	Po prijedlogu nadležnog konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore. 1. Cerebralna paraliza sa spastičnim ili distoničnim utrdnim manifestacijama, uz obavezno psihološko testiranje - IQ (G80), G80.1, G80.2, G80.3, G80.8). 2. Spazmodična distonija, bifazetsozan, hemibedžiji spazam, tortikolis (nekvilarna distonija), grtospasam (G24.1, G24.2, G24.3, G24.4, G24.5, G24.6, G24.9, G24.0, G51.0). 3. Postsploksična distonija škole, tuka i stopala, (G93.8, G93.9, G93.2). Za indikaciju 1, po prijedlogu nadležnog konzilijuma Instituta za bolesti glave. Za indikacije 2 i 3, po prijedlogu konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore. Primjena u zdravstvenu ustanovu koja obavlja zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
LM03	1. Osteoporoza kod pacijenatkinja poslije menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (MKB: M80, M81.0). 2. Osteoporoza kod pacijenatkinja sa patološkim prelomom (MKB: M80). Napomena: lijek se uvodi u terapiju kada je osteoporoza verifikovana: a) DEXA T vrijednosti u L1-4 < -2,5 ili u TotalNeck. b) kontrola na 6 mjeseci, obavezna denzitometrija. Dokazano je smanjenje rizika za pojavu vertikalnih fraktura, dok efikasnost kod fraktura vrata lemnara nije ustanovljena. Po prijedlogu reumatologa i endokrinologa. Kontrola na 6 mjeseci, obavezna denzitometrija. Po prijedlogu reumatologa i endokrinologa.
LM03/1	1. Osteoporoza kod pacijenatkinja poslije menopauze radi primarne i sekundarne prevencije osteoporotičnih fraktura (MKB: M80, M81.0). 2. Osteoporoza kod pacijenatkinja sa patološkim prelomom (MKB: M80). Napomena: lijek se uvodi u terapiju kada je osteoporoza verifikovana: a) DEXA T vrijednosti u L1-4 < -2,5 ili u TotalNeck. b) kontrola na 6 mjeseci, obavezna denzitometrija. Dokazano je smanjenje rizika za pojavu vertikalnih fraktura, dok efikasnost kod fraktura vrata lemnara nije ustanovljena. Po prijedlogu reumatologa i endokrinologa.
LM04	Prevenicija patoloških preloma, komplikacije na kosinama koje zahtijevaju radioterapiju ili operaciju, kod bolesnika s karcinomom dojke i koštanim metastazama. Po prijedlogu onkologa.
LM05	1. Prevencija obteženja skeleta (patološke frakture, koštane komplikacije koje zahtijevaju radioterapiju ili hirurško liječenje) kod pacijenata sa karcinomom dojke ili metastazama u kosinama. 2. Liječenje hiperkalcemije izazvane tumorom sa ili bez metastaza. 3. Prijedlogu konzilijuma onkologa, hematologa ili urologa Kliničkog centra Crne Gore ili nadležnog konzilijuma Specijalne bolnice Brevozik. Primjena najduže do godinu dana, s tim da je neophodna evaluacija nakon svake tri primljenjena ciklusa.
IM05/1	1. Osteoporoza-estetska forma sa DEXA T vrijednosti u L1-4 < -3,5 ili < -3,5 u TotalNeck (potrebno je priložiti snimak osteodenzitometrije), kada nije moguća primjena oralnih bistrorata zbog nemogućnosti efikasne resorpcije. Nemogućnost primjene oralnih bistrorata potvrđuje se mišljenjem gastroenterologa. a) mišljenje o postojanju hroničnog gastritisa, emzirovog gastritisa, ulkurne bolesti, pogoršanja poslijebole bolesti jednjaka, žučnika ili crijeva, uz obavezan nazat ezofagogastroduodenoskopije; b) mišljenje o postojanju sindroma intestinalne malapsorpcije različitog uzroka, a na osnovu gastroenterološke dokumentacije. 2. Osteoporoza sa DEXA T vrijednosti u L1-4 < -2,5 (potrebno je priložiti snimak osteodenzitometrije), uz dokazanu patološku frakturu na nalazu vertebrofonometrije, kod žena u ranoj postmenopauzi. Za indikaciju 2, lijek odobrava konzilijum reumatologa Kliničkog centra Crne Gore. Za indikaciju 1, lijek odobrava konzilijum endokrinologa Kliničkog centra Crne Gore.
IM06	1. Prevencija komplikacija na kosinama (patološki fraktura, kompresija kme, zračenje ili operacija kosilju ili tumorom izazvane hiperkalcemije) kod pacijenata sa uznapredovanim malignitetom koji zahvata kosti. 2. Terapija odraslih pacijenata sa hiperkalcemijom usljed malignih bolesti, ako su ispunjeni uslov: a) metastatske osteolitike promjene dokazane scintigrafijom, RT-G-om ili C-11-om, b) ECOG status 0-2; c) nepsobojanje CNS metastaza; d) očekivano preživljavanje bolesnika duže od 6 mjeseci. e) terapija traje najduže do godinu dana ili do pojave komplikacije koštanih metastaza. Lijek se odobrava na 3 mjeseca, nakon čega je obavezna evaluacija nalaza, koji se ponavljaju svaka 3 mjeseca. Lijek odobrava konzilijum onkologa ili urologa ili hematologa Kliničkog centra Crne Gore ili nadležni konzilijum Specijalne bolnice Brevozik.
IM07	1. Terapija osteoporoza kod žena u postmenopauzi, kod kojih je povećan rizik od pojave fraktura. 2. Terapija osteoporoza kod žena uzdužena sa hormonskom ablacijom kod muškaraca sa karcinomom prostate i povećanim rizikom od pojave fraktura. Za indikaciju 1, po prijedlogu nadležnog konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore. Za indikaciju 2, po prijedlogu nadležnog konzilijuma Klinike za onkologiju i radioterapiju Kliničkog centra Crne Gore.

Šifra	Opis stanja
	Bolovi u mišićima. MKB: G00-C97 koj se ne mogu kontrolirati standardnom terapijom. Za liječenje bronhijalnog, umjerenog jakog do jakog kašneškog daha na tzv. (veći) fiziološki stepencu (C00-C97) (ne smije se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kašneškog daha), i to: - Kao opiod druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku liječenja oralnim morfinom razvili neželjena dejstva koja se teško kontrolisu - Inisu prihvatljiva za bolesnika
IN01	- Kao opiod prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primjenu morfina - Istežuju njegovo trajanje do optimalne doze (morfina, povremene oksipijada, nekompletna mehanika opstrukcija crijeva) Po prijedlogu onkologa Kliničkog centra Crne Gore ili Specijalne bolnice Brezovik, za vertikalnu dijagnozu neoplasma je otpusna lista iz Specijalne bolnice Brezovik ili zdravstvene ustanove sa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
IN02	Za šifre MKB: C00-C97
IN03	Po prijedlogu onkologa Kliničkog centra Crne Gore ili Specijalne bolnice Brezovik, za vertikalnu dijagnozu neoplasma je otpusna lista iz Specijalne bolnice Brezovik ili zdravstvene ustanove sa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
IN05	1. Svrženja, sziropski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20-F29) koji su vezani za kliničke antipsihotike (pod razstrenjima neadekvatan odgovor na dva klinička antipsihotika u roku od 6 mjeseci) 2. Svrženja prve epizode svrženje kod osoba do 36 godine života, samo za pacijente koji ne saraduju u sprovođenju terapije u razj pogoršanja bolesti, nakon prethodne terapije oralnim risperidonom. 3. Pacijenti sa svrženjama koji imaju neželjene efekte na kliničkim deponima koji se ne mogu tolerirati. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
IN06	Lijek propisuje izabran doktor bez mišljenja specijaliste do 3 mjeseca tokom 12 mjeseci; a nastavak terapije na osnovu specijalističkog izvještaja psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
IN07	Lijek propisuje izabran doktor bez mišljenja specijaliste do 3 mjeseca tokom 12 mjeseci; a nastavak terapije na osnovu specijalističkog izvještaja psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa. Lijek propisuje izabran doktor bez mišljenja specijaliste do 2 mjeseca tokom 12 mjeseci; a nastavak terapije na osnovu specijalističkog izvještaja psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa.
IN07/1	Lijek propisuje izabran doktor bez mišljenja specijaliste do 2 mjeseca tokom 12 mjeseci; a nastavak terapije na osnovu specijalističkog izvještaja psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa.
IN07/2	Lijek propisuje izabran doktor bez mišljenja specijaliste do 2 mjeseca tokom 12 mjeseci; a nastavak terapije na osnovu specijalističkog izvještaja psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa.
IN07/3	Lijek propisuje izabran doktor bez mišljenja specijaliste do 2 mjeseca tokom 12 mjeseci; a nastavak terapije na osnovu specijalističkog izvještaja psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa.
IN07/4	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste do 2 mjeseca tokom 12 mjeseci; a nastavak terapije na osnovu specijalističkog izvještaja psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste do 2 mjeseca tokom 12 mjeseci; a nastavak terapije na osnovu specijalističkog izvještaja psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa. Lijek propisuje izabran doktor bez mišljenja specijaliste do 2 mjeseca tokom 12 mjeseci; a nastavak terapije na osnovu specijalističkog izvještaja psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa.
IN09	Aziatimernov bolesti za MKB: F00, G30.
IN10	Po prijedlogu psihijatra, neuropsihijatra ili neurologa. Amiotrofna laterarna skleroza. MKB: G12.2. Po prijedlogu Konzilijuma neurologa Kliničkog centra Crne Gore.
IN11	Za liječenje umjerenog jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem. Po prijedlogu onkologa.
IN12	Samo za bolesnike koji ne mogu uzimati peroralnu terapiju, uz uslov da vrijednosti ALT i AST ne smiju biti veći od 3 puta u odnosu na normalne vrijednosti.
IN13	1. Epilepsija (G40-G41) 2. Bipoarni poremećaji (F31.7) Za indikaciju 1, lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa, kliničkog neurofiziologa-epileptologa, neuropsihijatra, pedijatra-kliničkog neurofiziologa-epileptologa ili dječijeg neurologa, sa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Za indikaciju 2, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
IN14	Epilepsija (G40-G41) Lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa, kliničkog neurofiziologa-epileptologa, neuropsihijatra, pedijatra-kliničkog neurofiziologa-epileptologa ili dječijeg neurologa, zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou.
IN15	Epilepsija (G40-G41) Lijek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa, kliničkog neurofiziologa-epileptologa, neuropsihijatra, pedijatra-kliničkog neurofiziologa-epileptologa ili dječijeg neurologa, zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou.
IN16	Parkinsonova bolest (G20, G21, G22). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra.
IN17	1. Svrženja (F20 - F20.9) drugi psihotični poremećaji (F29, F06.2) sa nezadovoljavajućim odgovorom na dva prethodno primijenjena antipsihotika. 2. Psihotični poremećaji koji se javljaju u okviru Parkinsonove bolesti i drugih oblika parkinsonizma (G21, G22). Za indikaciju 1, po prijedlogu psihijatra ili neuropsihijatra. Za indikaciju 2, po prijedlogu neurologa ili neuropsihijatra.
IN18	1. Svrženja, sziropski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29) 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2) 3. Bipoarni afektivni poremećaji, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipoarni afektivni poremećaji u remisiji (F31.7). Za bolesnike sa rekurentnim obolima bolesnika klasifikuju terapiju (ova antipsihotika) i za bolesnike sa tekućim oboljenjem izabranom primjenom klozapina. Lijek odobrava Konzilijum psihijatra Kliničkog centra Crne Gore ili Specijalne bolnice Dobruša-Kolov.
IN19	Liječenje završeno od oplaća (F11)
IP01	1. Ehinokoka MKB: B67 2. Cistiperkoza MKB: B69
IR01	1. bronhijalna astma, uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima za MKB: J45. 2. hronična opstruktivna bolest pluća za umjerenog teške, teške i veoma teške (II, III i IV stadijum) oblike bolesti za MKB: J44. Po prijedlogu pulmologa, pneumoftiziologa ili pedijatra pulmologa.
IR02	U liječenju hronične opstruktivne bolesti pluća, lijek se uvodi u terapiju sa inhalacionim kortikosteroidima, teškiim pogoršanjima bronhijalne astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP). Preporučuje se primjena lijeka pod medicinskom supervizijom, npr. u bolnici, u izdanim slučajevima, kod teških simptoma bolesti i kada pacijent već ima iskustvo sa primjenom lijeka, a simptomi se ne povećavaju nakon primjene manjih doza bronhodilatacija i/ili kortikosteroida. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pedijatra pulmologa. Po prijedlogu pulmologa, pneumoftiziologa ili pedijatra pulmologa.
IR02	Za liječenje djece s bronhijalnom astmom od 6 mjeseci do navršenih 6 godina, kojima je indikovana hospitalizacija.
IR03	Za šifre MKB: J45, za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme. Po prijedlogu specijaliste pedijatra – pulmologa.
IR03/1	Za šifre MKB: J44, J45 za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme i bolesnika sa hroničnom opstruktivnom plućnom bolesti (HOBP) s FEV1 manje od 50%; i udjelom egzacerbaciona bolesti u ukupnom broju godišnjih egzacerbaciona bolesti. Po prijedlogu specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa na osnovu obavezno urađenog spirometrijskog nalaza.
IR03/2	Za šifre MKB: J45, za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme za liječenje bolesnika sa III i IV stadijumom bronhijalne astme. Po prijedlogu specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa na osnovu obavezno urađenog spirometrijskog nalaza.
IR04	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih umjerenog teške, teške i veoma teške (II, III i IV stadijum) oblike bolesti za MKB: J44. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih umjerenog teške, teške i veoma teške (II, III i IV stadijum) oblike bolesti za MKB: J44. Na prijedlogu pulmologa ili pneumoftiziologa na osnovu obavezno urađenog spirometrijskog nalaza.
IR05	Bronhijalna astma (MKB: J45) Granule. Kao dodatna terapija inhalacionim kortikosteroidima u kombinaciji sa kratkodjeljućim beta-2 agonistima u blagoj ili umjerenog teškoj astmi kod pacijenata kod kojih se ovom kombinacijom ne postize klinička kontrola bolesti, uključujući i napornom uzorkovanju astmi. Samo za djecu do navršenih 6 godina starosti, po preporuci specijaliste pedijatra-pulmologa.
IR06	Bronhijalna astma (MKB: J45) Tablete za zvrženje, imn tablete: Kao dodatna terapija inhalacionim kortikosteroidima u kombinaciji sa kratkodjeljućim beta-2 agonistima u blagoj ili umjerenog teškoj astmi kod pacijenata kod kojih se ovom kombinacijom ne postize klinička kontrola bolesti, uključujući i napornom uzorkovanju astmi. Na prijedlogu pulmologa, pneumoftiziologa ili pedijatra-pulmologa na osnovu obavezno urađenog spirometrijskog nalaza.
IR07	Čistiona fibroza za forisranim vitalnim kapacitetom > 40%. Cistična fibroza za forisranim vitalnim kapacitetom > 40%.
IR08	Na prijedlogu Konzilijuma pedijatra Kliničkog centra Crne Gore ili Specijalne bolnice Brezovik, za vertikalnu dijagnozu neoplasma je otpusna lista iz Specijalne bolnice Brezovik ili zdravstvene ustanove sa tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
IR09	Bronhijalna astma (MKB: J45) Respiratorni distres sindrom kod prijevremeno rođene djece. Na prijedlogu Konzilijuma neonatologa Kliničkog centra Crne Gore.
IR10	Hronična opstruktivna bolest pluća – za tešku i veoma tešku (III i IV stadijum) oblike bolesti (MKB: J44), povezana sa hroničnim bronhitisom i čestim egzacerbacionim epizodama ili više godišnje). Dodatna terapija bronhodilatacionim, inhalacionim kortikosteroidima i dušobrodilatornim antispazmika muskularnim receptorima. Po prijedlogu specijaliste pulmologa ili pneumoftiziologa.
IS01	1. Bakterijski keratitis (H10.0). 2. Bakterijski konjunktivitis (H10.0). 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).
IS01/1	Za refrakturne slučajeve na uobičajenu antiinfekcionu terapiju.

Šifra	Opis stanja
IS01	1. Druga linja liječenja. Za slučajevne refraktorne na uobičajenu antihipotenzivnu terapiju, po preporuci specijalista oftalmologa. Nije opravdano mijenjati terapiju beta blokatora kada se postigao ciljni očni pritisak i zadržalo napredovanje bolesti (stabilno vidno polje) kod primarnog glaukoma otvorenog ugla i sekundarne hipertenzije.
IS02	2. Prva linja liječenja isključivo za: a) primarni glaukom otvorenog ugla s pobačnom vrijednosti očnog pritiska > = od 30 mm Hg zmišenog Goldmannovom applanacijskom metodom, b) hitnog stanja, kao što je akutno stanje glaukoma zatvorenog ugla, c) sekundarni refraktorni glaukom, d) pacijenti kod kojih su beta blokatori kontraindikovan zbog komorbiditnih kardiorespiratornih bolesti, e) uznapredovali stadijum glaukoma (vazne) senilne mabularne degeneracije. Samo za bolesnike sa vidnom oštrinom > 0,2 i mskularnom degeneracijom na oba oka. Odnovava se najviše 6 aplikacija godišnje.
IS03	Liječenje odobrava konzilijum oftalmologa Kliničkog centra Cme Gore.
IV01	Antibioti kod povratne paracetamolom.
IV02	Antibioti kod tevezibne mskularne blokade izazvane tokuruntinom ili vekuruntinom.
IV03	Hiperfosfatemija kod bolesnika s uremijom s nadomnom koji su liječeni dijalizom, kod kojih se i dugim mjerama, koje uključuju dijetu siromašnu fosfatima, dijalizu pomoću rastvora s niskom koncentracijom kalcijuna (1,25 mmol/L) maksimalno mogućom primjenom vezadla sa kalcijumom (kalcijum karbonat), nije postigao zadovoljavajući nivo fosfata u serumu (procjod kalcijuna i fosfata veći od 4,4 mmol/L2), ili u slučaju dokazanih vankšestanih kalcifikata. Po prijelidogu specijaliste nefrologa.
IV04	1. preesfiljivost na bjelendevine mlijeka i sojaproteinija na hranu MKB: K90.4, malapsorpcija zbog intolerancije. 2. sindrom MKB: K90.4, malapsorpcija zbog intolerancije. 3. sindrom kratkog crijeva (urodeni, nakon hiruške resekcije) MKB: K91.2, malapsorpcija poslije hiruškog zahvata. 4. izrazita proteinsko-energijska malnutricija (kvastorki) MKB: E40.0, teška proteinska podhranjenost za MKB: E43.0, nespecificirana teška proteinsko-energijska podhranjenost. 5. cistična fibroza MKB: E845, adonjski dermatitis MKB: L20 Uprizaba kod odgođadi do navršenih 24 mjeseca života, mjesечно 1200 - 2000 g završno od tjelesne mase djeteta i mjeseci života. Po prijelidogu pedijatra Kliničkog centra Cme Gore.
IV06	1. alergija na proteine kravljeg mlijeka. 2. multipla intolerancija hrane.
IV06/1	1. alergija na proteine kravljeg mlijeka. mjesечно 1200-2000 g završno od tjelesne mase djeteta. Po prijelidogu pedijatra Kliničkog centra Cme Gore. 2. multipla intolerancija hrane.
IV06/2	Alergija na proteine kravljeg mlijeka. mjesечно 1200-2000 g završno od tjelesne mase djeteta. Po prijelidogu pedijatra Kliničkog centra Cme Gore. Uopriena kod odgođadi do navršenih 12 mjeseci života mjesечно 1200-2000 g završno od tjelesne mase djeteta. Po prijelidogu pedijatra Kliničkog centra Cme Gore.
IV07	Čeljustja, MKB: K60.0. za djeću od 1 do 5 godina – 4 kg za mjesec dana, za djeću od 5 do 10 godina – 5 kg za mjesec dana, za djeću od 10 do 15 godina – 7 kg za mjesec dana, za starije od 15 godina – 10 kg za mjesec dana. Po prijelidogu gastroenterologa Kliničkog centra Cme Gore.
IV08	Namjerno djeći starosti 1-12 godina sa izlikom od razvoja polihitmanosti i povedenom potrebom za energijom (cistična fibroza, Crohn-ova bolest, hronična isoprijuljica oboljenja, iose napredovanje). Po prijelidogu pedijatra Instituta za bolesti djece KCCG.
IV09	Samo za dijagnoziku karcinoma jetre.
IV10	Kakastija kod bolesnika sa maligntikom. Po prijelidogu hroničnog specijaliste.
IV12	Isključivo za primenu punih enteralne sonde u odasini i djece starije od 12 godina.